



又曰太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者桂枝去芍藥方中加附子湯主之又曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

又曰太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈雍曰仲景云太陽受病上連風



府故治傷寒以風府爲要穴風池次之然風府近腦
戶或疑不敢刺在法又禁灸風池則灸刺皆無禁也
又曰服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法
若形似瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯
又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白
虎加人參湯主之

又曰太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽
也不可發汗宜桂枝二越婢一湯千金云不可發汗
又曰服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗



心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

又曰傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譌語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

見九卷

仲景問曰證象陽旦

陽旦卽桂枝異名

按法治之而增劇厥

逆咽中乾兩脛拘急而譫語師言夜半手足當溫兩
脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮
則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象
桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽
故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘
草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尙微拘急重與
芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其譫語
故知病可愈雍曰此一段問答重解釋前段誤用桂
枝加附子之證按法治之謂令服桂枝湯也以此推

之則證象陽旦者小便不利則用桂枝加附子湯小便數則用甘草乾薑湯芍藥甘草湯惟以小便爲準耳龐氏曰兩脛攣小便數仍汗出爲津液少不可誤行桂枝湯宜補虛退熱用芍藥甘草湯通治

又曰太陽病項背強九九無汗惡風葛根湯主之

又曰太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

云一

用葛根茯苓黃連湯

方未

見疑卽葛根黃芩黃連湯

又曰太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之千金云葛根湯中加半夏半升

又曰太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之

又曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

又曰太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

問曰太陽病論有言至七日以上有言十日已去若



此之類未知傳經與不傳經也雍曰究其意義雖可見又當以脈證辨之且如七日以上自愈者謂六日傳經已遍而無變異也十日已去設有胸滿脇痛者

是傳陽明也其脈浮而無他證者只在太陽不傳故仲景猶用麻黃也所以朱氏言寒邪中人不必皆始於太陽兼有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但據脈與外證治之若過日多脈大浮數按之不足者尙責太陽發汗而愈此卽仲景十日已去脈但浮者服麻黃湯之意也有汗者何如曰詳證於

諸桂枝湯中選用之朱又云不必皆始於太陽者何
如曰雍雖未之見在理應有之須證脈可辨如感寒
頭不甚痛卽非太陽也蓋感病之變異者也如巨陽
先受邪則世俗謂之正傷寒也

仲景曰太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出
而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不
可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也雍曰中風而
脈浮緊是中風見寒脈也故可服若脈微弱則非寒
脈又汗出惡風亦皆中風證故不可服設服之則汗

漏不止筋惕肉瞤而死筋惕肉瞤者以亡陽故也其
詳別見可汗門中

又曰傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證

者大青龍湯發之雍曰傷寒而脈浮緩是傷寒見風

脈也少陰裏證大青龍發表藥故無少陰證者可服

少陰口燥舌乾而渴是也龐氏云當作無太陰證且

仲景於不可發汗證中已言少陰病不可發汗況用

大青龍湯尤爲不可則此用少陰字爲無疑而龐氏

因脈證相似乃云當作太陰證雖龐氏之誤然太陰



傷寒論卷四
病亦不可發汗三陰皆不可服特少陰最爲緊急耳
仲景大青龍湯惟此兩證以其汗出亡陽太暴善醫
者復不敢用往往臨時審證以他藥代之若用桂枝
麻黃各半湯亦好惟是力緩宜多服和解之

又曰傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴
或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主
之

又曰傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已
渴者此寒氣欲解也小青龍湯主之

又曰太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

又曰太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之千金云宜桂枝湯一云麻黃湯

又曰太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之

又曰太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之

又曰太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解
表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞋
劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主
之

又曰太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

又曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹
因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷
者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正
赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足

言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處
乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以
汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗不徹以脈濇
故知之龐氏云宜麻黃湯雍曰龐氏在陽明以古本
差誤仍改本

又曰脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者
不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏
虛須表裏實津液自知便自汗出愈常器之云汗不
出者可與小柴胡湯雍曰若心下悸而煩宜小建中

湯表裏俱虛宜桂枝麻黃各半湯設若用柴胡和解亦宜用柴胡桂枝和其營衛以通津液此證是下後裏虛故仲景待其氣復津液自和而汗出不必更用藥此一證非有證無治其不用藥便是治法也常氏必欲和解之疑其用藥太重故雍以柔劑少殺其力庶幾得中要之能少忍待其自和從仲景不用藥法爲上也

又曰脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之

謂發汗也

假令

尺中遲者不可發汗何以知其然以營氣不足血少

故也雍曰此一證與前證略相似宜小建中湯次則柴胡桂枝湯又不若待其別見證而治之蓋前證是下後證當無別證出故仲景不用藥此證是汗前證須別有證出故不若少待之既知血少不可使用小柴胡湯也

又曰脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯

又曰脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

又曰脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

又曰病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故耳以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯

問曰榮氣旣和何爲自汗出也雍曰平人榮衛之氣常自和也設衛中於風而榮不中於寒是衛有邪氣而榮無邪氣也有邪氣者強無邪氣者弱一強一弱故榮不得與衛氣諧和而獨和則衛氣無所依以慄悍無所依之氣又以邪氣濟之兩氣盈溢谿谷不能容榮深而衛淺故衛氣於皮膚間不得內合於榮而

