

亥 21
3-10<13

孫真人備急千金要方

一三



孫真人千金方卷之四十四

箴

孫真人千金方卷之四十五

箴五

孫真人千金方卷之四十六

箴六

孫真人千金方卷之四十七

箴七

孫真人千金方卷之四十八

箴八

蘇真入千金方卷之四十八

蘇真入千金方卷之四十七

上海涵芬樓影印正統道藏本

蘇真入千金方卷之四十五

蘇真入千金方卷之四十四



孫真人備急千金要方卷之四十四 驚風

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

腸腑方

風癲第五

論針灸方

論曰黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之

岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故今子發為癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初發歲一發不治月一發不治四五一發名



曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癲疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始

歲四

作而引口啼呼

甲乙作喘悸

者候之手陽明太陽

右強者攻其左左強者攻其右血變而止治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者即寫之置其血於執壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者

尾骶也

骨癰疾者頷齒諸輸分肉皆滿而骨倨強直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癰疾者身拳攣急脉大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣下泄不療

脉癰疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡刺之出血不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫氣下泄不療

治癰者病發而狂面皮厚敦敦者死不療



凡癰發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂
及遺糞者難療

癰疾脉搏大滑久自已脉沉小急實死不療
小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成
為癰疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成

歲四

二

為癰故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發
寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰
陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱
厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣

起於足三趾之表集於足下而聚於足心故
陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而
上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集
於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝
上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹
滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃
知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹
滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂
亂則不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行
發為胸仆陽明之厥癰疾欲走呼腹滿不得

卧面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰
腫而熱脇痛髀不可以運太陰之厥腹滿臑
脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥
舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹
脹溼漉不利好卧屈膝陰縮腫胕一作熱

箴四

三

盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之上
寒下熱先刺其項太陽久留之已則火熨項
與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也
上熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之
氣下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留

針反為寒刺寒厥者留針反為熱刺熱厥者
二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者
二刺陰也所謂二陽者二刺陽也
論曰溫病熱入腎中亦為瘕小兒病癰熱盛
亦為瘕凡風瘧暴尸厥及鬼魘不寤皆相似
宜精察之故經言久厥則成癰是以知似也
論曰癰病有五一曰陽癰發時如死人遺溺
有頃乃解二曰陰癰坐初生小時臍瘡未愈
數洗浴因此得之三曰風癰發時眼目相引
牽縱反急強羊鳴食頃方解由執作汗出當



風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癩發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之

治五癩方

銅青

雄黃

空青

東門上雞頭

水銀各一兩

茯苓

猪苓

人參

白芷

白欬

白薇

石長生各二兩



孫真人急千金要方

卷栢

烏扇

各半

硫黃

一兩

右十五味為末以青牛膽和著銅器中於
甑中五斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先
食服三十丸日再夜一

虎睛圓治濕癩掣瘕口眼張大口出白沫或

箴四

四

作聲或死不知人方

千金翼名大鎮心丸
主諸癇所不療者

虎睛

一具酒浸一
宿而炙之

鬼箭羽

露蜂房

二分

獨活

遠志

細辛

貫衆

麝香

白欬

一作
白薇

升麻

白蘇皮

三兩



牛黃

防風

秦艽

防葵

龍齒

黃芩

雄黃

山茱萸

乾地黄

乾薑方

防己

茯苓

鐵精

鬼臼

人參

大黃

銀屑

分各四

茯神

石膏

天雄

分各五

寒水石

分六

蛇蛻皮

尺一

方三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服

十五丸日再稍加至二十五丸神方

凡癰發之候其狀多端口邊白沫動無常者



方要金千急備人真孫

治之方

秦艽

人參

防葵

防風一作風

茯神

牡丹一作丹

甘草

各二兩

鉉丹

一兩

貫衆

一枚

右七味咬咀以水九升煮取三升半分三

歲四

五

服

雄雌圓治風癩失性顛倒欲死五癩驚癇方

雄黃

雌黃

眞珠

各一兩

鉉

二兩令成屑

丹砂

二分

水銀

八分

右六味為末以蜜擣三萬杵丸如胡豆大



先食服二九日二稍加以知為度

古今錄驗云療

五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗狂病狗

者臍臟相引羊鳴雞癲則雞鳴病五癲狂病

續命風引湯治中風癲眩不知人狂言舌腫

出方

麻黃

芎藭

石膏

人參

防風

桂心

甘草

獨活

防己

附子

當歸

杏仁

陳薑

五兩一本
無陳字

各三
各二
各一

三十枚



右十三味㕮咀以酒三升水一斗合煎取
四升分四服日三夜一
紫石散治大人風引小兒驚癇瘈瘲日數十
發醫所不療者方

紫石英

滑石

白石脂

凝水石

赤石脂

石膏

兩各六

甘草

桂心

牡蠣

兩各五

大黃

龍骨

乾薑

兩各四

右十二味治下篩為粗散盛以韋囊懸於
高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升

煮取一升二合大人頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服以意消息

深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

治百二十種風癲癇驚狂發即吐沫不識人

者四月五月宜服之方

歲四

紫石英

芍藥

龍骨

一本用黃芩

青石脂

白鮮皮

麻黃

當歸

甘草

枯薑根

桂心

人參

各二兩

牡蠣

三兩

大黃

五兩

