

重修政和證類本草

重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新
增訂義

成

部

唐

慎微

續

證

類

衛齋校勘
救校勘
草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經白

二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

監實

藏青布
續注

芎藭

薤白

黃連

蒺藜子

防風

續斷

天名精

茜根

旋花

地床子

景天

沙參

石龍菊

王不留行

葉附花
續注

續筋
附

附花

敗蒂
續注

絡石

黃香

蒲黃

漏蘆

決明子

飛廉

蘭草

地膚子

茵陳蒿

白兔藿

薇銜

鬼督郵

地錦扶芳土
連常春藤等
續注

白木香赤木
香木香續注

香蒲

當實

丹參

五味子

忍冬

千歲藥

杜若

徐長卿

雲實

白花藤

鼓石血藤
續注

草旋
客附

白薔薇
根續注

藤是
也

附花

附

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寒婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

蜀州藍葉



福州馬藍



藍實



江陵府吳藍



監實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊見其小疰鬼螫毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉可以

染青生河內平澤陶隱居云此即今染繅音葉碧所用者至

解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒

厚本注云藍實有三種一種圓徑二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫木常名此草為木藍于如陶所引乃是藍其汁

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍不惟為吸惟作碧色而堪染

菰藍為吸惟堪染青其葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑

等種安蜀本圖經云葉皆種之而雅云歲馬藍注今大葉冬

色今所在下濕地有之皆種之而雅云歲馬藍注今大葉冬

藍也疏今為濕者是也開節治經云藍實君味甘能少腫益

耳目利五藏調六腑利開節治經云藍實君味甘能少腫益

行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傳惡瘡細
年不救者及虎狼交瘡行下水得惡汁於器中燒令煙出以膏藥
熏人救中風惡露瘡浸者不中生薑知痛痒差又入諸膏藥
瘡服丁腫霍亂真者惡瘡用又假者不和生薑

圖經曰

實亦若夢子月河內平澤今處二尺有之人家蔬園中作哇種
出嶺南不入藥有大黑藍色五月六月者採實按藍有數種有木藍
馬藍是也有一種藍但可染似碧而不堪作靛即醫方所用者之也
又三州有酒服錢七藍治婦人敗血甚佳又解毒寧心吐血吳藍
二種雖內生如蒿狀名青花白性寒去熱解毒止吐血故井
附之漢趙岐作藍賦其序云方多用以醫藍者或恐是此故井
人皆以種藍汁染絳為菜藍其田彌望黍稷不殖至今近京大種藍
時盛云蓋汁治蟲牙傷咬劉錫傳信方著其法云取大種藍
汁一處入雄黃麝香二物隨意著多少細研投藍汁中外點
交處若入雄黃麝香二物隨意著多少細研投藍汁中外點
劍南張延賞判官忽被其汁咬之極痛昔張員外點
赤色如箸繞項上官忽被其汁咬之極痛昔張員外點
升大肚漸腫錢至上從救者忽相素人應召云可治張相初甚
薦家財又數百千募能不療者忽相素人應召云可治張相初甚

不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕益取如蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別搗藍汁加麝香末更取一蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加如黃和之更取一蛛投之汁而化為水張相及諸人甚異之遂令熟於咬處兩日內悉平愈但交處作小瘡如落如舊又中品著青黛條云從胡周來及太原廬陵南康等染紫碧色者同青黛功等染紫上池沐紫碧色者同青黛功

聖惠方

治小兒中風大熱毒心煩躁用藍汁服

又方

治青藍汁中風大熱毒心煩躁用藍汁服

千金方

治一層上生瘡連年不差以八月藍汁服

又方

治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿割斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也

男女雄雌

又方

熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍黃葛根汁服方寸七日五服

差

又方

治驚癇藍葉一斤搗以水三升絞取汁服一升日二水

千金翼

治急疳蝕鼻口數日欲死取藍

肘後方

治人身體急欲死取藍一把水五升鼠屎兩頭失者

盡二七枚之溫覆取汗升

葛氏方

新被毒箭搗藍青絞汁飲之亦以治瘡中如

又方

中水毒搗藍青汁以少

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死搗藍

又方

藍食杏仁中毒

梅師方

治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭

又方

治上氣咳嗽取汁一升空腹頻服須臾以杏仁研取汁煮

粥食之一兩日將息依

子母秘錄

治小兒赤痢搗青

又方

治小兒丹藍

廣五行記

永微中絳州僧病堂不下食告弟子吾死之後便
 視宵中得一物形似魚而有兩頭通體是肉鱗弟子致器中
 跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作履有一僧以
 殿致器中此蟲遂遠器

中走須臾化為水矣

衍義曰

藍實即大藍實也謂之麥藍非是爾雅所說是解諸
 為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍
 黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉
 藍又非藍也麥藍即堪採汁
 藥翠碧花成長穗細小淡紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛腎風痛溫中內

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺

三月四月採根暴乾得細辛金瘡止痛得壯癆瘵頭風吐

節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒

根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗方多用

道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶

風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連

接七百里唐本注云今出秦州其人間種者形塊大重實多

脂潤山中採者瘦細味苦辛以力月十月種者為佳今云三月

四月虛惡非時也陶不見秦地等第故云惟出歷陽歷陽出

者今不復用臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似芹胡荽蛇牀

葦叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芎藭

神農黃帝岐伯雷公辛無毒烏鵲酸無毒季氏生溫熱寒或

生胡無桃山陰或太山葉香細青黑文赤如藥本冬夏叢生

五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀藥

附論云芎藭臣能治腰膝軟弱半身不遂主胞衣不出治腹

內冷痛同詳子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切腹

斗門方

治偏頭痛用京芎

靈苑方

治婦人經絡下經三箇月驗胎法川芎生為末空

續十全方

治胎忽因倒地忽舉動重促損腹中不安服立

出

又方

風齒敗口臭

御藥院方

真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸為末

作兩科每料入麝腦各一分生犀半兩隔壅加牛黃一分水

飛鐵粉一茶分頭目昏眩加細辛

春秋注云麥麴窮

簡文帝勸醫文

止河魚之腹

衍義曰

芎藭今出川中大塊其裏色白不油色膏之微辛甘

用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云予一死

子舊脈芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死

後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病臨風服芎藭其
父亦一且暴亡皆曰見者此蓋單服耳若單服既久則走散
真氣既使作藥佐使又不義
服中病便已則烏能至此也

靡無味辛溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼瘡云三

蠱久服通神主身中老風頭中久風風眩一名微無一名茫

離芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾

今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇林而香騷人惜以
為警方藥用甚稀唐本注云此有二種一種似芹葉一種如

蛇林香氣相似用亦不殊爾
注香草葉小如菱狀引郭云如菱為之狀

圖經曰具芎藭說文已下

廣志曰帝以藏衣中魏武

管子曰生五沃之土

郭璞贊曰不隕其貴自烈以芳

連黃州澄



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹
 痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩瀉膿血止消渴大
 驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡又服令人不忘一名王
 連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石爲
 之使惡菊花生花
今兩參白鮮畏欬冬勝烏頭解巴豆毒同惡居云巫陽在建平
 縣最勝臨海諸縣者

不佳用之富布裹投去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道

方服食長生唐本注云蜀道者露大節平味極濃苦療渴為

最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今本圖

用宣州九節堅重相擊有聲者為勝臣馬錫等重改蜀本圖

經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者

節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州郴州者佳

兒海蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒主羸瘦氣急宣州絕佳東

陽亦有款州處州者次陳藏器云今出宣州絕佳東

五勞七傷益氣止心腹驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡

齊盜汗天行熱疾猪肚

蒸為丸治小兒疳積

圖經

曰黃連生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荆楚州郡亦

採根用生四月開花黃白色六月結實似芥子色亦黃二月八月

正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採古方以

黃連為治痢之最胡洽方載九蒸湯主丁痢不問冷熱赤白

穀帶林息父下悉重四分附子大者一枚乾薑一兩半

兩半並切先以水五合著銅器中上火三寸煎沸便下若生

土上涕止又水五合著銅器中上火三寸煎沸便下若生

下著土上涕止又水五合著銅器中上火三寸煎沸便下若生

連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同搗

篩白蜜丸如梧子空腹下三十九日再如神其久冷亦人
即煨熟大蒜作九連此方本出李絳兵部手集方嬰瑞用之
効又治目肝方用黃連去膜同於砂盆內所令極細衆手爲
兩白羊子食以煖主藥水吞二七枚連作五劑差但是諸眼
疾及障翳青盲皆主藥水吞二七枚連作五劑差但是諸眼
元者因官治苦死罪四出治之四後數年以病自致死一
崔爲內障所苦夜明逾年後夜數息獨坐時聞階除間悉
率之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者因復明因傳此方於世
此方告訖而設崔依此合服不數月者因復明因傳此方於世
又今醫家洗眼湯以當即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目
甜水煎藥汁乘熱洗以當即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目
花翳等皆可合用之其治之血得熱即行故乘熱洗之凝滯使然
故以行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗之凝滯使然
効不神

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用藥水浸二伏時曬出
於柶木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪

得肉若服至三年不
得食猪肉至三年不

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味咬咀以水七升
煮取五合日三服

又方連乳汁浸點皆中止