


活人慈航



二十二

喘者此中氣大虛也宜參歸鹿茸湯 此多不效

痰症

痰乃津液貯留胸中而生蓋痘毒之火煉其津液上壅氣道
喉中作聲宜清氣化痰不可驟用金石之藥恐傷真氣宜
陳皮半夏茯苓甘草麥冬前胡瓜蒌仁枳殼桔梗杏仁黃
芩痘若起灌之時痰多壅於喉中但助漿之藥少加清氣
化痰之品加味保元湯

人參黃芪當歸白芍棗仁麥冬炙甘草
再加陳皮貝母桔梗更前胡

咳嗽

痘毒之火上衝於肺故氣逆發為咳嗽如初發熱咳嗽者宜
加減雙解散自起脹至成漿時咳嗽者由喉間有痘道路
窄狹痘收自愈不必服藥結靨後咳嗽者血液既竭肺少
津液以潤必用甘涼以滋陰液潤肺宜麥冬沙參玉竹胡
麻生地桔梗甘草天冬冬蜜糯米有風加薄荷前胡荆芥

有寒如麻黃紫蘇杏仁有熱加桑皮骨皮知母

打呃即噦

痘毒內盛毒火上衝於胃故打呃不止其聲响宜竹茹橘皮

湯陳皮半夏麥冬竹茹枳實茯苓甘草人參重加石膏滑石亦有胃陽不足下焦之氣上

胃腑其症唇色淡白聲細宜丁香柿蒂湯丁香柿蒂人參良姜

嘔吐

嘔者有物有聲吐者有物無聲二症皆屬於胃痘初出嘔吐

者火邪犯胃毒氣上騰痘必紅紫宜二陳湯加黃連梔子

按用小柴胡加乾薑竹茹黃連自起脹至收靨嘔吐者是痘集咽喉門吞嚥不利

所致宜甘草桔梗牛子豆根防風荆芥乾葛連喬射干若

傷食嘔吐者吐必腥酸宜平胃散加半夏山查麥牙木香

設吐後精神困倦不思飲食乃胃氣虛也六君子湯加霍

香沙仁

倉水

倉水者因火盛毒壅會厭門也蓋咽門司納飲食一為毒熱所壅則必腫水不易入溢於氣喉故氣噴出而倉作矣
加味甘桔湯
甘草 桔更 射干 牛子 豆根 元參
此症見於七日前者俱屬惡候若七日已後外痘蒸長光潤而作倉者是咽門痘長壅塞道路也至結痂則倉自止治者當於毒盛之時預用清理氣道之藥
桔更甘 草牛子
不使熱毒侵犯此症自無

口噴穢氣

毒火侵炙脾胃故口出臭氣令人難近蓋出痘全賴脾胃以為根本今為毒火侵害則根本受傷不急救之必至脾胃潰爛而成大害宜歸宗湯
口氣臭為下症也
穢氣減庶可望生不食

痘瘡賴氣血以成功氣血藉飲食以生化自起脹瀉漿以至打嘔嘔吐倉水口噴穢氣不食

收靨結痂俱以胃壯為根本故痘中過不食之症須要明辨如大便閉結痘瘡欲紫不食此毒盛血熱也宜涼血解毒湯加黃連黃芩大黃若痘色灰白泄瀉不食此脾氣虛弱也宜七味白朮散行漿時欲食而復畏食此咽門腫痛難以下嚥也宜甘桔湯加味射干設喜飲食過多而惡食不食乃內傷飲食胃有宿滯也宜升消平胃散

汗

衛氣乃護衛皮膚固守津液使不走洩者也痘症見是痘毒之火由裏達表於衛氣腠理疎故汗出矣初見有微汗者星榮衛通暢毒從汗解實良候也但汗為血液太過則陰液必亡須緊防之如起脹後大汗不止未行漿恐不能灌既行漿恐不能靨既靨恐氣血虛脫最為可畏自汗為陽虛宜保元湯加白芍浮小麥盜汗為陰虛宜當歸六黃湯

閉結

出痘二便最喜通暢以痘屬毒火惟通暢然後經絡疎利氣血流通而無壅遏之患一有不通則毒火不能外達必致內攻而生患初出大便閉者宜四順清涼飲白芍當歸生甘大黃小便閉者宜八正散若至成漿時切勿輕用

泄瀉

痘症不喜閉結更忌瀉利初出時瀉尚其開通之功火熱由利而解若瀉甚則是邪氣并於腸胃迫而不升使傳化失常也宜用柴葛湯起脹時泄瀉脣色淡白痘不起不紅赤此冷瀉也宜陳氏木香散如中滿惡食瀉黃酸臭手足心熱面赤痘紅此內毒未全出盡故瀉不止仍用柴葛湯惟成漿時尤為緊要蓋痘瘡至此津液已衰脾胃已弱復加泄瀉毒必倒陷速用鴉片丸日三服夜一服藿豐時不可

停止候靨至足踝上時方生勿服內服補脾凡鴉片丸起
脹灌漿皆可服經曰急則治其標也

痘癢

經曰諸癢為虛又曰火微則癢治者宜分別痘方出而身癢
者此邪氣欲出腠理嚴密其火遊溢往來故不時作癢宜
加味升麻葛根湯灌漿時痘色淡白平塌便澇脣淡懶食
漿清作癢者此脾胃弱氣血虛也宜十全大補湯如穢氣
觸犯而暴癢者外用香藥燒薰之內服千金內托散送毒
外出庶無內攻之患至於將斂而作癢者此膿成毒化榮
衛和暢也不必服藥

痘痛

經曰諸痛為實皆由痘毒之火未能盡解故不時作痛
按升漿時作痛
痘初出痛者因毒未發透也升麻葛根湯痘出稠密而

不可服此

作痛者用四物湯

防風 荆芥 連翹 牛子 紅花 丹皮

若收靨時痛甚悶亂者不

治

失音

音者心之聲也心氣上達於肺而作音肺清則音清肺熱則音啞如痘當灌漿而音啞者此喉中有痘礙於氣道待外痘收靨而內痘自清不必施治若未長漿而音已先啞者此熱毒壅遏肺竅而然也宜桔更甘草射干牛子連翹元參梔子麥冬初熱時音啞用加減雙解散

衄血便血

血屬陰諸經賴以養育瘡資以成功一為毒火薰灼則血隨火動迫而妄行上則為衄血下則為便血痘色紫滯燥熱口渴而衄者此毒火刑金也宜犀角地黄湯靨後餘毒乘脾而衄者此脾虛不能統血而衄也宜七味白朮散外俱

痘瘡 痘痛 失音 衄血便血

智下之下

三十八 痘科下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

用髮灰吹鼻中若火毒熾甚流注大腸大便下血宜四物湯加入黃連黃芩丹皮地榆荆芥設痘色灰白陷下而便血者此脾氣虛弱不能攝血宜歸脾湯若大吐血溺血及七竅出血變在反掌不必服藥

寒戰咬牙

寒戰咬牙者森森若寒振振搖動上下牙尖相磨而鳴也初熱時寒戰咬牙者因火毒留於經絡之中邪正相爭欲出不出所致也宜清熱透毒羌活湯

胆草羌活防風薄荷甘草當歸梔子川芎芍藥

如見點後痘色紫赤大便閉小便澀煩躁口渴者此屬實熱是胃熱則咬牙肺熱則寒戰也宜四物湯加連翹赤芍黃連麥冬石膏木通若灌漿時膿色清稀大便溏小便長身涼不渴唇色白者此屬氣血二虛是氣虛則寒戰血虛則咬牙宜參歸鹿茸湯

倦怠

痘中倦怠因屬中氣不足服補中益氣湯最為安然亦有形神本弱或為食熱所困其現症雖與不足同等但不可專以虛治當於補劑中佐以清熱之品如保元湯加麥冬白芍仁葉花粉葛根元參生地或保元湯加梔子黃芩麥芽山查神曲麥冬陳皮

痢疾

痢疾腹痛裏急後重便下赤白膿血是也毒火與溼熱相搏於大小腸也痘瘡有此症最為難治大約治裏仍要從表治表又要醫裏初熱痢疾腹痛裏急後重便下赤白膿血用敗毒和中散加大黃下其毒滯次只服敗毒和中散加黃芩黃柏調理則痘起痢止若起脹時至瀉漿痢仍不止用保元湯加黃連黃芩陳皮白芷山查收靨時痢疾是餘寒戰咬牙倦怠痢疾



毒下奔二腸宜柴葛湯加黃連黃柏白芍山查陳皮枳殼
麥芽虛者加參芪白朮當歸腹痛甚者可加大黃兼下之
若水瀉而兼膿血者名瀉痢不可下以泄瀉為脾虛也
敗毒和中散加黃芩黃柏乾葛
此症瘡痢疾敗毒和中散本方當減去麥冬

痘後浮腫

痘後表氣虛弱見風太早風邪乘虛而入致使面目虛浮遍
身皆腫者初宜五皮飲加桂枝紫蘇汗之服後面目不浮
惟遍身猶腫者宜五苓平胃散

痘後癰毒

痘後餘毒皆因灌漿之時毒氣太盛未得盡化留藏於經絡
聚而不散輕則發為瘡節重則成癰或在肌肉虛處或發
於關節搖動之際皆不論已潰未潰均以解毒內托散



生芪 防風 荆芥 連翹 當歸
赤芍 銀花 甘草 木通
枯去渣下蠟熔化開貼

外用紅玉膏貼

紫草二兩 紅花二兩 當歸二兩 香
藥三兩 香油八兩 杖火煎藥至

目

目病固多由風熱而起若夫痘毒非常之熱自裏達外氣血
弱則不能逐毒外出火鬱上攻目斯病矣如赤腫疼痛隱

開者以洗肝散

羌活 歸尾 防風 枳子
谷精 薄荷 川芎 甘草

翳膜遮睛

隱症差明者加味龍胆湯

防風 木賊 蒙花 重退 京子
胆草 白芷 菊花 黃連 蒺藜

膏


膏乃脾經之脉絡故經曰六腑之華在唇必津液充足氣血
和暢唇口方能潤紅故出痘之始終以此為貴不然一為
毒火所制則毒熾於中不惟不能紅潤且或赤或紫或焦
裂者治皆不可緩也初宜赤芍梔子霍香防風升麻乾葛
甘草石膏起張後則宜黃連解毒湯

痘後浮腫 痘後癰毒 目下

智下之下

四下

西汁痘科下



北京中医药大学图书馆版权所有

痘後牙疳

痘後生牙疳者乃餘毒未解上攻牙齒而然也初起口臭
腫牙縫出血尚覺疼痛甚則色黑腐爛牙齒脫落穿腮破
頰蝕透鼻唇多致不救見之須急急調治宜清毒涼血
石膏 知母 生地 黃連 當歸 赤芍
大黃 肥子 丹皮 刺芥 連翹 甘草
茶各一水
外敷人中白散
人中白二錢 雄黃五分
冰片四分 硼砂青代足

舌

舌為心苗內通五臟毒熱舉發舌先受之或赤或紫或黑或
腫舒舌弄舌種種不一要皆熱於心而使然也宜清心熱
為主
荆芥 防風 牛子 甘草 桔梗 石膏
升麻 犀角 桑冬 板子 黃連

咽喉

咽喉者飲食之道喉者呼吸之門乃最緊要之處若痘毒不能
發越於外火毒壅塞膈間上衝咽喉則或腫痛或啞啞而

不能呼吸飲食難入速用加味甘桔湯

甘草桔更連高射干枝子元麥冬

或利咽解毒湯

桔更甘草豆根牛子元參蔓豆防風麥冬

外吹

黃連黃柏薄荷各分雄黃火消青代各二分半外牛欄砂

朱沙各一分為細末每吹少許入咽

夾疹 卽麻

痘已見形其中又有顆粒細密如麻子者此夾疹也因出痘時恰遇天行時疫感受其氣一時并發不須治痘當先治疹以升麻葛根湯加荆芥防風蚘退牛子犀角連喬疹散而痘自起

夾痘

痘乃血之餘也因毒火鬱遏作傷於陰血血熱相搏故浮遊

之火散在皮膚之間與痘相夾而出片片如雲頭突起謂之夾痘以荆防敗毒散若七日見此謂之發痘乃血熱不

解故也用黃連解毒湯

按此恐藥太重可以加減而用黃連元參連喬生地赤芍

痘後牙疳 舌咽喉 夾疹症勢

智下之下

四十二記痘科下



夾痧

痧亦疹類但形如粟米尖員白硬內含清水為異此亦熱毒所發往往夾痘而出宜於疎散用荆防敗毒散

水痘

水痘發於脾肺二經由溼熱而成也初起與大痘相似面赤

脣紅眼光如水咳嗽噴嚏垂涕稠黏身熱二三日而始出

其形尖員而大內含清水易脹易靨不作膿漿初起荆防

敗毒散次服導赤散加味

生地 木通 甘草 連翹 黃連 麥冬 滑石 茯苓

男子年長出痘

男子自十六歲後皆謂年長嗜慾情開元精走泄又遇痘毒

之火衝熾則真陰虧損水虛不能制火故每至行漿之際

口渴心煩鼻衄咽痛不能成膿結痂者有之治者不可妄

用寒涼五六日前只宜參麥清補湯

生芪 人參 生地 當歸 白芍 麥冬 甘草 花粉 前胡 桔梗



牛子紅花山查川芎

黃芩從葉天士法更佳

至七八日如膿漿不行急宜攻漿以參歸

鹿茸湯內調雞冠血酒但得漿行庶可無慮

婦女出痘行經

女子出痘或遇經行須問其是期非期如期而出者則毒熱隨血解去不須施治其症自愈若非期而至者此毒火內擾於胞中致血妄行以涼血解毒湯若過期不止乃毒熱乘入血室以四物解毒湯加元參甘草當歸生地白芍川芎黃連黃芩絞子黃柏若行經時去血過多此氣血虛弱不能統攝也急用十全大補湯若稍緩痘漿不行則無救矣

孕婦出痘

孕婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則氣血因之而傷又安望其起脹灌漿結痂耶故遇孕婦出痘始終以安胎為主用

如聖飲加減

當歸陳皮白朮腹皮黃芩砂仁甘草知母黑豆

水痘男子年長出痘

智下之下

四十二 痘記痘科下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

初發熱加升麻葛根連翹 不起發加牛子赤
麥冬花粉知母 四動者四物湯加黃芩黃連 脾虛食
少毒發不出者千金內托散去肉桂加重參芪 身熱有
外邪者參蘇飲加木香

痘出過產

孕婦當痘正出之際忽然過產俟產育後無他恙者只宜大

補氣血十全大補湯若腹中微痛此惡露未盡宜黑神散

當歸川芎熟地青皮香附蒲黃肉桂乾姜
按蒲黃改用桃仁紅花

產後出痘

婦人產後氣血已傷又遇出痘則氣血之供用難給不能領
戴其毒惟宜大補氣血以十全大補湯切不可妄用寒涼
之劑致傷生發之機也

按醫宗雜症治法藥方皆集古見驗之法度

