

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷二十三

後陰部

鶴口疽門主論

尾間發門主論

醫癰門主論

附方

瘰癧瘡門主論

附方

痔瘡門主論

附方

痔漏門主論

附方



南京中医药大学图书馆藏

臟毒門主論 附方

腸風門主論 附方

寒火瘡門主論

脫肛門主論 附方

臟頭風門主論 附方

風疔門主論 附方

股陽疽門主論

股陰疽門主論

騎馬癰門主論 附方



坐馬癱門主論

上馬癱門主論

下馬癱門主論

涌泉疽門主論

穿襠疽門主論

懸癱門主論

附方



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷二十三

廣東省城雙門底王山樓藏

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

後陰部

自尾閭穀道起至臀股止一切痔漏瘡疽皆彙於此
部中以便檢閱參治

增錢之栢東陽
男 棍燹用和 全校



鸛口疽門主論

靈樞曰發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治

三十日死矣

鬼遺方云涌泉疽腫起發太陰

太陰尻尾前是也

如伏鼠

十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白色可

治

陳實功曰此乃三陰虧損督脉之經濁氣濕痰流結而成其患發在尾間之穴高骨尖上初起形似魚胞久則突如鸛嘴朝寒暮熱日輕夜重潰後稀膿

出而無禁又或鮮血出而不停凡發此者壯年

可老者可危

正宗

汪省之曰初起滋陰除濕已成和氣養榮已潰滋腎

保元久而成漏宜琥珀蠟礮丸先天大造丸兼服

理例

澄曰鸛口疽老弱難斂易於成漏

卷之八



南京中医药大学图书馆版权所有

易醫大全
卷二十三
尾間發
三
顧氏秘書

不請於師
入曰或謂全鼠爛骨
恐其誤也
王肯堂曰鼠間發全鼠爛骨
鼠間發上篇

尾間發



尾間發門主論

玉肯堂曰尾間發生於尾間穴乃督脉所主最痛


忍更難得膿

準繩

又曰病候生尾腠骨處結毒如桃李之大紅赤脈痛不能行動

申斗垣曰得之奔走勞傷或久坐血凝氣滯者易得得之酒色過度忍精強戰督脉虧損者破必成漏難以收功

啟玄



醫癰



醫癰門主論

王肯堂曰腫高根淺爲醫癰腫平根深爲醫疽俱屬足太陽膀胱經濕熱所致

準繩

薛立齋曰醫乃膀胱經部分也居小腹之後此陰事之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主

陳實功曰醫癰生於小腹之後位遠僻與氣亦罕到血亦少來凡生此者濕熱流結凝滯而成此症必

須托毒外發庶不內攻初起毒從五臟蘊積
必有頭紅腫墜重如石內必口乾發熱治當通利
積熱外以膏貼金黃散敷四圍拔出瘀膿血內煎
補托自愈若誤用敗毒寒劑外敷涼藥冰凝氣血
毒氣不得外泄反致內攻如瘡頭軟陷無膿根脚
平散不痛口乾煩躁譫語喘氣麓恍惚不寧者
俱爲不治但此症多從毒積五臟自內至表者十
有八九風寒暑熱自外至裏者百中一二倘旣出
而復入裏者終爲死候

正宗

申斗垣曰醫疽乃太陽膀胱經多血少氣生於承扶
穴最痛宜托之生於實處者易治近大小便處者

難治 啓玄

馮賢瞻曰癰發於腎乃膀胱之濕毒蒸熱或稟賦陰

虛此地最難高聳潰膿大宜托裏爲要 錦囊

朱丹溪曰醫癰生於腎上膀下近大腿處由濕熱相
侵氣血凝聚鬱毒而成形如大盤腫濶盈尺上覆
其腰下遮其膀此爲陰中之陰務須宣熱拔毒大
補氣血培養腎胃滋補根源如此瘰血易聚而膿



易作毒易出而熱可宜不然經年累月腫仍如故
疼痛日深是以中年之後猶慮患此一見虛弱便
與滋補可保終吉若妄以清涼敗毒內服外敷則
氣血得寒益凝多致不救

醫癰門主方

醫癰

五爪龍草連根搗汁酒攪服日進四五次膿從大
便出未成者立消已成膿者以揸敷上立消

洗醫癰潰後並治股瘡

苦參

金銀花

白芷

當歸

黑皮硝 各等分

絹包砂銚內煎濃汁先薰後洗

消醫癰

金銀花 四兩

甘草節 一兩

燉膏每日空心酒服

揸留煎湯薰洗



坐板瘡

