

胎產新書



女科祕要卷四目

原經水不調

經水不調症

過期經行症

一月經再行症

數月行經症

經期或前或後症

行經腰腹作痛症

經後腹痛症



南京中醫藥大學圖書館版權所有

經水過多症

驗經色症

浮腫症

原經水不行

經閉不行症

石瘕症

腸覃症

治崩漏次第

崩漏症



南京中医药大学图书馆版权所有

原赤白帶

赤白帶症

白淫症

白濁症

開鬱二陳湯

地骨皮湯

芎歸湯

加減八物湯

桃仁四物湯

歸宮丸

血氣露丸

和四時藥

十刃精

三補丸

蒼莎丸

蒼莎導痰丸

烏雞丸

四物連附湯



調經湯

金匱丸

加減補中益氣湯

四製烏附丸

增減八物柴胡湯

柏子仁丸

四物涼膈散

澤蘭湯

溫經湯

桂枝桃仁湯

加味四物湯

十灰散

地黃湯

加味四物湯

補中益氣湯

鹿角霜丸

芩連芷柏丸

補宮丸



南京中医药大学图书馆版权所有

加味二陳湯

分清飲

女科祕要卷四

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂

原經水不調

一由脾胃虛損經曰二陽之病發於心脾夫二陽者陽明胃經也主納水穀長養氣血灌漑腑臟流行經絡乃水穀之海氣血之升唯憂愁思慮傷心心氣受傷脾氣失養鬱而不通腐化不行胃雖能受而謂長養灌漑者安在哉故脾胃虛弱飲食少思血氣耗衰斯有血枯經閉之症蓋血少色必淡或過期始行或數月一行矣



一由衝任損傷氣以順之血以濡之故氣行則血行氣
滯則血逆大抵婦人情多執拘偏僻忿怒妬忌多傷肝
氣肝爲血海衝任之脈衝任失守血氣妄行或女子未
及二七天癸之期而男強與之合或月事適未盡而男
與合縱慾不已皆致衝任內損血氣不固或爲崩或爲
漏有一月再行有未及期先行諸症

一由脂痰凝滯肥盛之婦腸胃多痰壅滯經絡或閉經
帶下以上三症皆不能孕育

經水不調症

形瘦多痰多鬱血虛氣熱宜四物湯合開鬱二陳湯加赤芍黃芩黃連薑爲引

開鬱二陳湯

蒼朮

香附

川芎

各一錢

青皮

莪朮

檳榔

各七分

木香

五分

薑引

形瘦多痰且熱此衝任受傷宜四物湯加人參知母麥冬甘草薑棗引并服地黃丸空心白湯下

衝任傷損腎虛血少枯閉誤服辛熱煖子宮藥致經不

調衝任伏火宜四物湯加赤芍知母木通黃柏甘草食

前服兼服三補丸

三補丸

黃芩

黃柏

各等分
俱酒炒

蜜丸白湯下

性急多怒而妬氣血俱熱必有鬱症宜四物湯加柴胡

酒炒黃芩黃連

酒炒

香附

童便製

空心服

肥盛腸胃多痰壅滯經絡閉血帶下

地骨皮湯

地骨皮

當歸

川芎

知母

麥冬

錢各一

甘草

五分

空心服

形瘦經不調素無他症此血熱也宜四物湯加黃芩黃

連知母酒炒黃柏

各等分

甘草

五分

空心服兼三補丸

過期經行症

情性溫和有痰此氣血兩虛宜八物湯合青皮湯加香

附兼服蒼莎丸

蒼莎丸

香附亦名莎草根

蒼朮

米汁浸炒二兩

香附

童便浸炒三兩

條芩

酒炒一兩

爲末神麴糊

丸白湯下

形瘦素無他症此血氣不足宜十全大補湯

形瘦食少此脾胃虛弱血氣衰少宜異功散合芎歸湯
加人參白朮茯苓甘草陳皮薑棗引食前服兼地黃丸
芎歸湯

川芎

歸身

香附

枳壳

炒各一錢五分

滑石

二錢
薑引

肥胖飲食過多此溼痰壅滯軀脂逼迫宜六君子湯合
芎歸湯加香附薑棗引空心服

一
月經再行症

性躁多氣傷肝而動衝任之脈宜四物湯加人參柴胡

黃芩黃連甘草空心服兼用知母黃柏爲丸滾湯下
性躁多氣傷肝而動衝任之脈誤服辛熱藥致經再行
可照上服藥更服三補丸

數月行經症

形盛多痰氣虛宜六君子湯合蒼莎丸加川芎當歸枳
壳食前服蒼莎導痰丸亦在食前兼服

蒼莎導痰丸

蒼朮

香附

枳壳

陳皮

茯苓

各一

兩五
錢 膽星

甘草 各一

爲末薑汁和神麴爲丸

淡薑湯下

形瘦脾胃弱氣血虛宜十全大補湯

經期或前或後症

脾胃虛弱氣血不足宜從虛治服加減八物湯兼烏雞

丸

加減八物湯

人參 三錢

白朮

茯苓

炙草

各五錢

白芍

歸身

陳皮

香附

丹皮

各一錢

食前服

烏雞丸

專治脾胃虛弱衝任傷損氣血不足經候不調凡無子者服之神效

此酒不知出處只用無灰陳米酒亦可

白毛烏骨雞

未斂雄雞者一只約重一斤以梗米喂養七日勿令食蟲蟻以繩縊死乾

搗去其毛酒洗淨內雞不用納生地熟地天冬麥冬各二兩於雞肚內以好鰾魚酒十碗熬爛即出

肚內藥將雞用桑柴火連骨焙乾仍以前生地等藥酒又浸又焙至雞骨肉枯為末

人參

五錢 茯苓

酒洗 故紙

炒 砂仁

歸身

白朮

川芎

丹參

茯苓

杜仲

鹽水

炒 炙甘草

各一兩

香附

醋浸四兩

為末入上雞骨肉末和

勻酒麵糊丸空心酒下或米湯下五十丸

行經腰腹作痛症

氣滯血實人瘦有火宜桃仁四物湯加條芩黃連

桃仁四物湯

歸尾

赤芍

川芎

生地

香附

錢

丹皮

紅花

元胡

錢各一

桃仁

十一粒

服研入

錢

錢

錢

空心服

氣滯血實人肥多痰宜桃仁四物湯加枳殼蒼朮半夏

經後腹痛症

此虛中有滯宜八物湯加木香香附青皮薑棗引食前

服

經水多少症

此条不盡然
宜以脉症爲
憑

形瘦經少此氣血弱宜四物湯加人參香附甘草薑棗
引

肥胖經少此痰凝經隧宜二陳湯合芎歸湯薑棗引

經來多不問肥瘦皆屬熱宜四物湯加黃芩黃連知母
黃柏甘草薑爲引兼服三補丸

驗經色症

經水色紫者熱也宜四物連附湯

四物連附湯

歸尾

赤芍

香附

各二錢
黃連

丹皮