

百代医宗

+

顾问(以姓氏笔划为序)

于生龙 马继兴 王雪苔 王绵之 邓铁涛 田景福 龙致贤
朱杰 刘渡舟 李辅仁 李明富 李任先 余瀛鳌 张瑞祥
张灿岬 施杞 祝谌予 高辉远 唐绍明 唐由之 顾廷龙
盛国荣 董建华 傅世垣 焦树德 裴沛然

编选：薛清录 傅景华 赵璐 刘国正 毕俊英 李世勤 徐金香
巴恩荣 魏菊仙

印制：蒋放年

刻太醫院須行内外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古養論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少之氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法
上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌
五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣
十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧

五運主病切要

六氣爲病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天干臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法

用藥根身稍三法

五味用法

五入五走

五多五傷

養煉鹿角霜膠法

辯用硝黃巴豆悞人論

治十腫水氣病根毒藥

丙集卷之三

風論 該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論 夏論

附注夏論

濕論

燥論 火論

六鬱論

痰論

咳嗽論 哮論

喘論

丁集卷之四

瘡論 痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論 水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論 癥瘕論

虛損論

虧瘵論

怔忡論 癲狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論 枝結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論 翻胃膈噎論

頭痛論 腹痛論

腰痛論 腸痛論

腰痛論

腸痛論

腳氣論 痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論 便濁遺精論

新增漏濁論

三消論

已集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論 嘈雜論

痞滿論

眩暉論 惡心論

惡寒論

發熱論 諸氣論

傷食論附傷酒方

關格論 紺核論

癟風論

丹溪活套云

心痛胃脘痛論

梅核論

腸風臟毒論

脫肛論

與集卷之七

耳論

鼻論

牙齒論

面論

眼科所用藥性

目論

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法

點眼藥訣

各臟所屬宜用某方并附詩歌

咽喉論

目疾証候

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

痃痃論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血水分論

產後脈法病機要畧

謹接伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癰陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛塗亭秘書

頸項強痛論

口舌唇三論

丹溪活套

流注論

赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌 小兒科論

五癟論

諸瘡論

黃疸論方 遺尿尿濁二論

語遲牙遲行遲總論

膾耳論

癬疾論

附小兒五疳病源妙方

附錢仲陽小兒諸疳論

諸蟲論

蠱毒論

鼻病論

大小便閉論

桃生論

吐瀉論

腹脹論

啼論

解顱論

脫囊論

脫肛論

瘤論

美舌論

鼈背論

癸集卷之十

痘疹論

疹論

外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症

方論

痘疽瘡瘍論 乳硬乳瘡論

痔漏論

瘻論

疔瘡論

楊梅瘻論

背發腦發鬢發此發四總論

赤癰論

膿瘡論

鎖喉瘡論

赤癰瘡論

纏脣瘡論

骨槽風瘡論

五疳論

喉閉瘡論

火殞瘡論

火赤瘡論

魚脊瘡論

陰觸瘡論

漏睛瘡論

鴉踏瘡論

紅絲瘡論

附錄太醫院頒行内外諸科方論百代醫宗卷之十

太醫院醫官 金谿 省吾 淳紳 著述
振吾 張文英 參訂

金陵 少泉 李潮 刻行

痘疹論

夫小兒痘疹之症最爲酷疾須臾先生猶反掌間耳曰胎毒藏於命門遇歲火太過熱毒流行之年則痘毒因之而發也一發則出於心肝脾肺四臟而腎無害邪者爲吉若初發便作腰痛見紫黑點者最爲不祥是毒氣鬱於腎經而不發越故耳錢氏有白祥丸天下之法然活者鮮十無一雖二矣大抵痘疹之症多歸重脾肺二經脾主肌肉而肺主皮毛故遍身發爲班爛其症最宜發越不宜鬱滯宜紅活凸綻不宜紫黑陷伏瘡出之后醫者當察色詳症以辨表裏虛實施藥切宜斟酌其有吐瀉不能食者爲表虛不吐瀉能食爲裏實灰色階頂多汗爲表虛紅

綻無凸汗爲表實諸痛爲實諸痒爲虛外快內痛爲內實外虛外痛內快爲內虛外實裏實而補則結滯毒表實復用表實之藥則潰爛不結痂矣表虛者瘡易出而難醫表實者瘡難出而易收裏實則出快而輕裏虛則發遲而重表實裏虛則陷伏倒醫裏實表虛則發慢收遲故治之法三日以前未見紅點者必用升麻湯參蘇飲之類以發其表務令微汗爲度若未汗如表猶未解者須畧見紅點隱約於肌肉之間而升散開發之劑尚未可除凡見出遲發慢者根窠欠紅活者須當用心調攝不可忽畧視爲小事目古人用藥寒熱不同如陳文中用木香散異功散薑附丁桂峻熱之藥其與內經病機不合或用之當者亦可取效若劉張之輩悉用芩連大苦寒涼之劑以解痘毒良有以也所謂陳氏畧用熱藥是從治之法權也劉張多用涼藥是正治之法常也二者亦不可偏廢然皆不外乎人參白朮黃芪紫草芎歸茯苓芍藥等爲補氣補血之劑大抵痘疹之症既傷寒相似發熱煩燥面白赤唇紅身痛頭疼

乍寒乍熱嘯噴而欠喘嗽痰涎始發之時有曰傷風傷寒而得有曰
氣傳來而得有曰傷食嘔吐而得有曰跌撲驚恐蓄血而得此動之屬
火與天運相感而發或有目竄驚搐如風之狀或口舌咽乾肚腹疼痛
煩燥狂悶昏眩或自汗或下利或發熱或不發熱其症晁爰卒不可辯
必須於耳冷骯冷臉冷爲驗耳益瘡疹屬陽腎臟無症耳與骯皆屬於
腎故腎部獨冷又不若視其耳后有紅脈赤縷則爲真痘矣更驗之真
不可不知治療之法首尾俱不可妄下解毒和中安表而已益毒發
於表苟若妄下則榮衛益虧重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間而入
變症爰端且毒根於裏苟若妄下則內氣益虛毒不能出由是土不勝
水变黑歸腎身體振寒其耳與骯返熱眼合肚脹其瘡黑陷十無一生
所以汗下二說古人深戒謂其痘疹與傷寒相若而其治法實異傷寒
從表入裏痘疹從裏出外解肌之法葛根升麻紫蘇之類可也其或氣
實煩燥熱熾大便閉結當以犀角地黃湯人參敗毒散又或紫草飲浸

服亦能利之大便不通者少與之大黃尤宜仔細小便赤澀者分利水道使熱氣有所滲泄凡熱不可驟遏宜輕解之若無熱則瘡又不能發矣又曰始出之前宜開和解之門既出之后當塞走泄之路發熱之初紅點未見之前非微汗則表不解乃痘疹未出表熱壅塞之時也非微下則裏不可解在紅點未見裏熱壅盛之際也若正出未收之時妄汗則成班爛妄下則成陷伏故瘡之所發各隨五臟肝臟所起發爲水泡色青而小肺臟所起發爲膿泡色白而大心臟所起發爲班色赤血之泡脾臟所起發爲疹色黃小班瘡惟有腎則變黑青紫乾而且陷矣前所云瘡疹屬陽本無腎症腎之在下不受穢氣陽之瓦火也陰之瓦水也火受水之所制豈不危乎所云古人深戒汗下之法何也以其致謹之意若屬實熱者非汗非下則熱毒何由而泄但要辯明表裏寒熱虛實看微甚而用治豈有不汗不下之理哉但貴乎得宜耳又言首尾俱不可下首之不可下者必痘疹已顯有表症而無裏症尾不可下者必

無內症大便不結之故也又云無熱則痘又不能起發此言不好深信見其托痘補藥漸見乾枯陷伏幾至危殆用涼藥解之隨后起發者且多矣回熱藥而發者是一時之功恐有后日之患縱有虛症亦不可妄服此理之必然也但胎毒之氣必假元氣以行之且元氣有厚薄胎毒有淺深氣之厚者則毒易行而表上必熱故爲實症氣之薄者則毒難行反爲裏攻此元氣不能外固以致表上必寒故爲虛症痘色灰白項陷不起或皮薄成塌或如小泡起不碍手此虛症也痘色紅紫皮厚而硬齊湧掀發或連肉紅色或有黑點此實症也表實者身體壯熱面赤唇紫頭痛身痛眼黃鼻塞或流清涕毛焦膚燥手足極熱脈浮數而實大裏實者大便秘小便赤澀吐利而渴口氣熱而咽乾舌燥咳嗽喘促驚悸譖妄腹脹不食胸膈痞滿上下失血脈沉實而數表虛者惡寒或寒熱往來面白怠惰嗜卧自汗惡風手足厥冷脈浮細而虛裏虛者二便清利吐瀉不渴食物不化口鼻氣冷不欲飲食昏睡脈沉細而

遲醫者當審虛實用藥未有不中病情者也蓋痘以發熱三日放標三日起脹三日貫膿三日收齷三日共一十五日而成痘症之常數也如痘之輕者不拘常數痘症之重者則出常數之外固不可以爲例耳王節齷曰痘是胎毒古人治法只宜解毒凡見痘出太密者毒氣盛也須無內症亦宜解毒此治痘之大法也丹溪曰痘疹必分氣虛血虛氣虛者以人參白朮黃芪加解毒之藥血虛者以四物湯加解毒之藥須炒黃芩黃連黃柏爲主丹不必用疑也復曰春木氣生藥宜生發夏火虛炎尤當解暑秋金浮燥藥宜涼平水歸冬旺溫藥爲主其紅赤熱之太過淡白寒之不及紅潤光澤於斯爲美項堅碍指氣血俱至根窠紅活不治自生根窩淡白補血爲貴黑陷焦枯爲凶兆紅紫淡白主半吉血凝氣滯痘必出而項根紅氣虛血熱痘發見而項紅根白紫黑倒伏毒內剥而終不可療紅陷鬱瘡血分熱而庶乎可醫白兼黑者是氣血之枯焦灰帶紫者毒內攻決死於治咬牙顫掉寒熱之兩途嘔吐瀉利虛

實之二致大小便閉爲熱毒之内攻心腹脹脹急補虛爲貴至君根毒
頂陷痘名茱萸圓頂平頭痘曰棋子茱萸則大補其虛棋子則保元爲
主須云發熱三日仍有順逆陷之三症全在發熱之初看其熱勢微甚
微者固不必藥甚者當解則以汗當汗則下使毒氣得以發泄
其后不能爲害亦不可執古入深戒汗下之法所以云非汗則表不解
非下則裏不鮮但藥味之輕重隨病勢之微甚耳發熱之時或發驚搐
者或吐瀉不甚者皆不爲害東垣曰如痘症少且痘瘡未發乃與升麻
湯三五錢乘熱服之俟其身表溫和痘症已顯然后止藥丹溪曰但覺
身熱症與傷寒疑似未明之間可進柴蘇飲熱甚者可進升麻葛根湯
最爲穩當叔曰發熱之初未見紅點必須表汗發散爲主要在身熱盡
退爲佳發熱三日又有逆症存焉發熱之時頸面紅如胭脂者或各處
有紅塊者遍身遂見紫黑斑者晝紫黑而破裂者皆爲不治之症發熱
三日又有險症存焉發熱之時壯盛異烈不進飲食發狂語譁煩燥者

其症必重急用葛根升麻湯。葛根湯內症甚者四順飲下之。發
熱身痛頭痛者與麻黃湯表汗爲主。發熱腰痛腹痛者四順飲太樂胡
湯承氣湯下之。發熱聲遂變常者宜用清肺飲。發熱嘔吐瀉利不止口
不渴身與手足俱冷不進飲食者宜用連中湯。發熱增寒壯熱。真氣虛者
湧咳嗽痰涎此傷風傷寒所致用參蘇飲調紫草膏服之甚者麻黃湯
表之發熱。觴搖甚不止者紅綿散調灰砂一元散。痰涎壅盛昏悶不省
人事者薄荷湯下抱龍丸只二三次不宜多進。發熱吐瀉不止身熱口
渴者四苓散加黃連淡竹葉平土之發熱腹痛脹者。真氣與外邪相搏
欲出而不得出宜用參蘇飲加砂仁陳皮去參令進之甚者下之。熱感
吐衄面赤瘡黑及一切失血之症急用犀角地黃湯大凡痘科裸症皆
由毒氣蓄伏欲出不能出也故發熱之初房用表裏宜熱服厚蓋取汗
必要熱退身涼爲妙。內症者宜下之以泄其毒表裏之症俱重者則
一汗一下此是預防之大忌。度也放標三日看其順逆症標色。見輕