

内科多选题选编

上海第一医学院

《内科多选题选编组》

《内科多选题选编》

编译者《内科多选题选编组》

总 审 朱宝荣

责任校对 张坚 王仁忠

印 刷 南漕印刷厂印刷

前 言

本书选自斯密思 (SMITH LH, JR) 和温加定 (WYNGAARDEN JB) 所著的“普通内科学复习——自我检查手册”一书, 该书在编著中得到了美国 DUKE 大学医学中心和加州大学 (旧金山) 各有关科室提供的资料, 曾从事美国内科学会工作的施菊克 (STRECKER) 也提供了丰富的经验, 该书的写作则是以世界医学名著希氏内科学为依据的, 所以具有较高的可靠性和正确性。

全书共分11部分, 依次为传染病、临床免疫和风湿病、神经系统疾病、呼吸系统疾病、心血管疾病、肾脏疾病、胃肠道疾病、血液和肿瘤疾病、内分泌疾病和糖尿病、遗传和代谢性疾病以及皮肤病。每部分均有各种类型多选题如A型、B型、C型、D型, 和K型题。

选择法是当前国内外盛行的一种考试方法, 它既可为检查人员提供现成试题, 又可为拟新试题作参考, 同时也可作为学生复习, 有助于独立思考、融汇贯通, 因此本书酷似一种工具书, 适用于医学院校师生以及临床医生参考使用。

华山医院内科教研室付主任 朱宝荣

1983年7月

目 录

前 言

第1部分：传染病	1 ~ 22
第2部分：临床免疫和风湿病	23 ~ 33
第3部分：神经系统疾病	34 ~ 51
第4部分：呼吸系统疾病	52 ~ 62
第5部分：心血管疾病	63 ~ 87
第6部分：肾脏疾病	88 ~ 96
第7部分：胃肠道疾病	97 ~ 119
第8部分：血液和肿瘤疾病	120 ~ 135
第9部分：内分泌疾病和糖尿病	136 ~ 162
第10部分：遗传和代谢性疾病	163 ~ 175
第11部分：皮肤病	176 ~ 182

第一部分 传 染 病

说明：从题1到题58，每题选一最佳答案

题1. 下列表现除何者外是由班氏丝虫病引起的

- A. 阴囊水肿
- B. 淋巴结炎
- C. 慢性淋巴结病
- D. 附睾炎
- E. 乳糜尿

题2. 以下除何者外都是彻底扑灭天花的重要因素

- A. 不存在动物宿主
- B. 由于接种牛痘，提高了“牛群免疫”水平
- C. 一旦发现病例，尽可能迅速给接触者接种牛痘
- D. 一旦发现病例，尽可能迅速给家属接种牛痘免疫球蛋白
- E. 迅速利用流动的公共卫生工作队来检查和控制流行区

题3. 女，23岁，妊娠初期无意中接触过一名儿童，以后发现该儿童患有风疹，立即采血作血凝集素抑制滴度（HAI）试验，结果为阴性。现在你应该

- A. 尽力劝她作治疗性流产
- B. 若这位母亲愿意，可进行流产
- C. 给予风疹疫苗和r球蛋白
- D. 给予人血清免疫球蛋白
- E. 等2~3周，再重复HAI滴定

题4. 下列关于万古霉素的叙述哪一项是正确的

- A. 只应肌肉注射
- B. 它对革兰阴性菌无作用
- C. 它对厌氧菌无作用
- D. 它可引起周围神经病变
- E. 有肾功能衰竭的病人应避免使用

题5. 下列细菌除何种外都可以在蜂窝组织炎的组织中产生气体

- A. 厌氧杆菌属
- B. 大肠杆菌
- C. 中间链球菌（*peptostreptococcus intermedius*）
- D. 绿脓杆菌
- E. 产气荚膜杆菌

题6. 在肾透析室工作的护士，手指被沾有透析病人血液的针头刺伤。该病人在9个月前末次检查时乙型肝炎表面抗原（HBs Ag）阳性。你应首先做下列哪一项

- A. 给予乙型肝炎免疫球蛋白（H-BIG），并在一个月内重复一次

- B. 给予人r球蛋白,并在一个月內重复一次
- C. 测定病人的HBsAg和“e”抗原
- D. 测定护士HBsAg和“e”抗原
- E. 测定病人和护士二者的HBsAg和HBsAg抗体

题7. 以下关于加利福尼亚脑炎病毒的叙述何者是正确的

- A. 在洛矶山脉东面尚未发现该病毒
- B. 一般传染15~20岁的年轻人
- C. 在疾病早期可从血液和脑脊液发现该病毒
- D. 该病死亡率不到5%,无长期的运动或感觉后遗症
- E. 由壁蚤传播此病

题8. 男、46岁、有酒癖,六天前在打架时被打倒在地,从那时起他发现一侧鼻孔有稀薄液体流出,因出现脑膜炎症状而入院。脑脊液检查发现:糖30mg/100ml,蛋白质96mg/100ml,细胞2,250个/mm³,其中中性粒细胞97%。革兰染色未见微生物。对此病人下列何者是早期最好的治疗

- A. 青霉素G水剂24万μ/d,静脉注射
- B. 青霉素G水剂24万μ/d,加氯霉素4g/d,静脉注射
- C. 氨苄青霉素12g/d加氯霉素4g/d,静脉注射
- D. 氨苄青霉素12g/d,静脉注射,加异烟肼和乙胺丁醇直到获得进一步实验室报告

- E. 新霉素10g/d加庆大霉素5mg/kg/d,静脉注射

题9. 10个月的婴儿,因高热12小时被送到急诊室。检查时呈中毒和危重病状。右面颊部有一个兰红色蜂窝织炎区。早期最好的抗生素治疗是

- A. 新青霉素I
- B. 水剂青霉素G
- C. 氨苄青霉素加氯霉素
- D. 四环素
- E. 先锋霉素加氯林肯霉素

题10. 农民、67岁,在场地上工作时被碎木片深深地刺穿小腿,8小时后到达急诊室。他不记得以前是否接受过任何免疫接种,也不曾当过兵。9年前对青霉素曾有过严重的荨麻疹反应。创口干净,仅微量出血。小腿X片上未发现异物。最好的处理是

- A. 仔细用探针探查伤口,局部使用过氧化物和给以一个疗程的破伤风类毒素和四环素

- B. 用破伤风抗毒素,仔细用探针探查伤口,局部使用过氧化物、用破伤风类毒素和四环素

- C. 手术探查伤口,用破伤风类毒素,青霉素脱敏后继以青霉素治疗

- D. 用破伤风抗毒素,手术探查伤口,用破伤风类毒素,青霉素脱敏后继以青霉素治疗

- E. 用破伤风抗毒素,手术探查伤口,用破伤风类毒素和四环素作化学性预防

题11. 飞机驾驶员,28岁,因淋病于2周前静脉注射水剂青霉素G48万μ,同时加用丙磺舒,症状消失。但近3天又出现轻度排尿困难和尿道分泌物,分泌物革兰染色显示有大量多形核白细胞和极少的革兰染色阳性球菌。什么是最好的处理

- A. 重复同样的疗程, 将尿拭子送实验室以检查对青霉素的抗药性
- B. 停止现在的治疗, 将尿拭子送实验室以检查对青霉素的抗药性
- C. 送实验室作尿培养, 并口服四环素0.5g, 4次/d, 共7天
- D. 送实验室作尿培养, 并口服氨苄青霉素0.5g, 4次/d, 共10天
- E. 肌肉注射壮观霉素 (spectinomycin)

题12. 有葡萄球菌性主动脉瓣心内膜炎的31岁海洛因成瘾者静脉注射新青霉素I, 每6小时4g, 连续19天, 此时出现发热, 嗜酸性细胞增多, 肉眼血尿和血清肌酐从1.6mg/100ml上升到2.3mg/100ml。最好的处理是

- A. 停用新青霉素I, 进行观察
- B. 停用新青霉素I开始用苯唑青霉素并进行观察
- C. 停用新青霉素I, 开始用先锋霉素I并进行观察
- D. 停用新青霉素I, 开始用万古霉素并作肾活组织检查
- E. 继续用新青霉素I, 并作肾活组织检查

题13. 男, 7岁, 有中度不适、发热、喉痛、结膜炎和颈淋巴腺病。无颈强直、畏光、头痛或皮疹。7天前全家在北方度假时, 他母亲从小孩头上抓到过一个吃饱血的蜱虱。下列何者是你应该做的

- A. 给以氯霉素500mg, 口服, 4次/d, 连续7天
- B. 给以四环素250mg, 口服, 4次/d, 连续7天
- C. 作3血次培养
- D. 作腰穿
- E. 按上呼吸道感染给小孩治疗, 并随访

题14. 曼氏裂体吸虫引起的肝脏疾病最常见的表现是

- A. 轻度黄疸
- B. 呕血
- C. 脑病和扑翼样震颤
- D. 血尿
- E. 蜘蛛痣

题15. 以下除何者外都是旋毛虫病的表现

- A. 眶周水肿和裂片出血
- B. 低白蛋白血症和正常的红细胞沉降率
- C. 胃肠不适
- D. 心肌炎、脑膜炎和脑炎
- E. Casoni试验阳性

题16. 男, 68岁, 因尿道狭窄而排尿困难, 曾有3次大肠杆菌尿道感染, 每次用头孢霉素扑灭。选择性尿道扩张后3天出现发热、白细胞增多、背痛和主动脉关闭不全的杂音。对这个病人下列何种抗生素治疗可能是最适合的

- A. 氨苄青霉素
- B. 头孢霉素
- C. 头孢霉素加庆大霉素
- D. 氨苄青霉素加庆大霉素
- E. 乙氧萘胺青霉素加庆大霉素

题17. 下列细菌除何者外都可能被Amikacin抑制

- A. 脆弱厌氧杆菌

- B. 泄殖腔肠杆菌
- C. 醋酸钙失运动菌 (*Acinetobacter calcoeticus*)
- D. 亲水性产气单胞菌
- E. rettgi变形杆菌

题18. 红霉素可抑制下列大部分菌株, 除外

- A. 金黄色葡萄球菌 (凝固酶—阳性)
- B. 肺炎链球菌
- C. 肺炎支原体
- D. 鹦鹉衣菌
- E. 梅毒螺旋体

题19. 服庆喜妥英的病人都出现下列各种副作用, 除外

- A. 急性或慢性肺炎
- B. 多发性神经病变
- C. 溶血性贫血 (在葡萄糖—6—磷酸脱氢酶缺乏的病人中)
- D. 胆汁郁积性肝炎
- E. 再生障碍性贫血

题20. 下列抗生素中何者很少可能引起贫血

- A. 青霉素
- B. 强力霉素
- C. 磺胺嘧啶
- D. SMZco
- E. 氯霉素

题21. 下列关于兔热病 (*tularemia*) 的叙述何者是正确的

- A. 主要发生在夏季
- B. 用琼脂不能培养出致病微生物
- C. 引起组织内肉芽肿
- D. 累及皮肤、淋巴结、血液, 而不累及肺
- E. 应该用大剂量氨苄青霉素治疗

题22. 教员, 56岁, 患何杰金病, 出现头痛、发热、畏光、嗜眠和颈僵直。腰穿结果如下

压力	220mmH ₂ O
蛋白	116mg/100ml
葡萄糖	21mg/100ml (血清葡萄糖93mg/100ml)
白细胞	2,105/mm ³
多核细胞	68%
单核细胞	32%
革兰染色	有小的革兰阳性杆菌

可给予下列何种治疗

- A. 氯霉素4g, 1次/d, 静脉滴注
- B. 氨苄青霉素4g, 1次/d, 静脉滴注
- C. 氨苄青霉素12g, 1次/d, 静脉滴注
- D. 磺胺嘧啶4g, 1次/d, 口服

E. 先锋霉素12g, 1次/d, 静脉滴注

题23. 以下除何者外都和念珠菌感染有关

A. 慢性肉芽肿性疾病

D. 终末期胃癌

B. 高血钙

E. 高营养疗法

C. 麻醉剂成瘾

题24~25

一条狗毫无原因地突然向郊外送邮件的邮差袭击, 并咬伤了他腿部的2处皮肤。狗被捕后2小时变得平静并完全正常。狗的主人坚持称狗无病, 要求立即释放它, 邮差的家属担心狂犬病而要求杀死狗。

题24. 你将提出下列何种建议

A. 杀死狗并焚化尸体

B. 杀死狗并将头送到实验室去作狂犬病检查

C. 将狗的血清标本送到实验室去作狂犬病检查, 并将狗关起来观察1个月

D. 将狗关起来观察10天, 若无病发生, 就将狗放了

E. 以上都不是

题25. 上面提到的邮差应该作的治疗是

A. 局部清洗并用苯甲羟胺(benzalkonium)擦洗伤口

B. 治疗如A, 若末次破伤风类毒素注射已逾5年则需加用破伤风类毒素

C. 用狂犬病抗血清浸润伤口周围的皮肤

D. 用鸭胚疫苗(DEV)作充分的狂犬病免疫治疗23次

E. 同时用C和D

题26. 对下列各种细菌引起的感染, 除何者外都可用对流免疫电泳(CIE)作为辅助性诊断试验

A. 肺炎链球菌

D. 淋病双球菌

B. 乙型流感嗜血杆菌

E. K₁大肠杆菌

C. 脑膜炎双球菌

题27. 以下关于志贺菌痢疾的叙述何者是正确的

A. 潜伏期36~72小时

B. 近10年来在美国已相当罕见

C. 粪便中出现很多单核白细胞

D. 通常引起结肠和小肠炎症

E. 用抗生素治疗可能会延长带菌状态

题28. 以下药物除何者外对治疗中度氮质血症病人的感染都是有效的

A. 强力霉素

D. 氯霉素

B. 利福平

E. 二性霉素B

C. 四环素

题29. 以下何种线虫可引起最大多数美国人感染

A. 粪类圆线虫

D. 蛲虫

B. 人蛔虫

E. 毛鞭虫

C. 美洲钩虫

题30. 四环素可引起下列病变, 除了

A. 神经肌肉阻滞

D. 婴儿脑脊液压力升高

B. 急性肝脂肪变性

E. 儿童发育不良和牙釉质变色

C. 光敏感性皮炎

题31. 在人类中, 棘球蚴最可能见之于

A. 脑

D. 肌肉

B. 肺

E. 肝

C. 脾

题32. 蛲虫病可引起下述各种并发症, 除了

A. 阑尾炎

D. 肝炎

B. 外阴炎

E. 坐骨直肠脓肿

C. 前列腺炎

题33. 以下除何者外是鞭虫病(鞭虫感染)的并发症

A. 血样腹泻

B. 轻度嗜酸性细胞增多

C. 由于幼虫移行经过肺而出现的呼吸系统症状

D. 直肠脱垂

E. 贫血

题34. 甲苯咪唑是治疗下述各种线虫所引起的感染的第一线药物, 除了

A. 美洲钩虫

D. 蛲虫

B. 毛鞭虫

E. 人蛔虫

C. 粪类圆线虫

题35. 来自西非的一名病人, 有搔痒红斑性丘疹、皮下小结、穿透性角膜炎和角膜瘢痕该病人最可能患有下列何种疾病

A. 砂眼和疥疮

B. 蟠尾丝虫病

C. Loa, Loa感染

D. 麦地那龙线虫病(豚鼠蠕虫感染)

E. 血吸虫病

题36. 热带脓性肌炎通常是由下列何种细菌感染引起的

A. 金黄色葡萄球菌

B. 需氧和厌氧混合菌丛

C. 弱恶丝虫属(*Dirofilaria tenuis*)

D. 假单胞菌属(*Pseudomonas Pseudomallei*)

E. 以上都不是

题37. *Yersinia enterocolitica*常和以下各项有关, 除外

A. 关节炎

D. 血性腹泻

B. 菌血症

E. 腹痛

C. 骨髓炎

题38. 弓蛔虫病(脏游走性内幼虫病)和以下各项有关, 除外

- A. 发热和肝肿大伴触痛
- B. 眼内炎, 有时与视网膜肿瘤相似
- C. 嗜酸性细胞计数升高($>50\%$)
- D. 与猫或狗接触
- E. 肠梗阻或肠套迭

题39. 患有继发性梅毒的38岁同性恋男子, 在急诊室用苄星青霉素240万 μ 肌注治疗。6小时后主诉全身严重疼痛、寒战和头痛。检查时呈病态, 有高热和寒战。下列何者是最适合的处理

- A. 进重点护理室并准备治疗休克或支气管痉挛
- B. 进普通病房观察
- C. 住入普通病房, 肌注苯海拉明, 口服阿司匹林并观察
- D. 立即静注甲基强的松龙1g, 加先锋霉素I和庆大霉素, 并观察
- E. 给阿司匹林, 如果症状在6小时内不消退, 嘱来急诊室

题40. 农民右拇指背部出现一个1cm大小的无菌性丘疹。2周后, 丘疹溃破并流出少量脓液。同时, 出现一连6个类似的皮损成串地延伸到前臂。无全身症状。其中一个丘疹经活组织检查证明为皮肤肉芽肿反应和同质二形的霉菌, 后者有分支的、分离的、附有菌丝的分生孢子。你认为应该用下列何种药物治疗

- A. 碘化钾饱和液2ml, 口服, 4次/d
- B. 静注二性霉素B, 总剂量2g
- C. 5-氟胞嘧啶100mg/kg/d, 口服, 连续3周
- D. Miconazole 1g, 静注, 1次/d
- E. 磺胺嘧啶1g, 口服, 4次/d

题41. 一位处于缓解期的何杰金病患者, 出现轻度头痛和嗜睡, 二个多月来慢慢加重。上周出现低热、精神错乱和嗜睡而住院。腰穿显示脑脊液(CSF)为:

压力	230mmH ₂ O
蛋白	97mg/100ml
葡萄糖	26mg/100ml (血糖70mg/100ml)
白细胞	105/mm ³ (中性41%, 淋巴59%)
革兰染色	阴性

该病人最可能的病原体是

- A. 白色念珠菌
- B. 新型隐球菌
- C. 伊氏放线菌
- D. 荚膜组织胞浆菌
- E. 星形诺卡氏菌

题42. 以下关于引起破伤风的病原菌的叙述何者是正确的

- A. 这是一种不运动的、形成孢子的、革兰阳性杆菌
- B. 只能被青霉素, 红霉素和氯林可霉素抑制
- C. 由于外毒素(破伤风菌溶血素)而引起。引起重症破伤

- D. 患过破伤风的病人不产生有效的免疫
E. 它释放一种作用于运动终板的外毒素, 引起肌肉痉挛
- 题43. 黄热病不引起下列何种表现
A. 开始好转1~2周后又复发
B. 出血
C. 白蛋白尿
D. 肝细胞内出现Councilman小体
E. 相对性心动过缓
- 题44. 以下有关病毒性主动脉炎的叙述何者是正确的
A. 引起主动脉弓特征性钙化
B. 是夹层动脉瘤的原因之一
C. 它的发生不是先天性梅毒的结果
D. 大约75%的病例伴有神经梅毒
E. 能引起主动脉狭窄
- 题45. 对布氏杆菌病最好的治疗药物是
A. 四环素
B. 链霉素
C. 四环素加链霉素
D. SMZco
E. 以上都不是
- 题46. 以下关于鼠疫的叙述何者是正确的
A. 在美国, 它通常发生在东南部
B. 在严重病例中, 常引起中性白细胞减少
C. 由虱子从鼠传染给人
D. 大剂量青霉素是首选的治疗药物
E. 常引起播散性血管内凝血
- 题47. 葡萄球菌可引起以下所有疾病, 除了
A. 烫伤性皮肤综合征
B. 小肠结肠炎
C. 疖
D. 坏疽性深脓疱
E. 腮腺炎
- 题48. 以下除何者外都是风湿热的主要表现
A. 心脏炎
B. 多发性关节炎
C. 舞蹈病
D. 皮下结节
E. 结节性红斑
- 题49. 立克次体病常有以下各种表现, 除了
A. 头痛
B. 低血压
C. 白细胞增多
D. 小血管播散性灶性感染
E. 精神状态改变
- 题50. 以下所有药物对治疗厌氧菌感染可能都有效, 除了
A. 青霉素VK
B. 灭滴灵
C. 强力霉素
D. Amikacin
E. 强力霉素

C. 甲氧唑吩头孢菌素

F. 羧唑吩青霉素

题51. 以下除何者外都和支气管扩张症有关

A. 囊性纤维化

D. 低丙种球蛋白血症

B. Kartagener综合征

E. 支气管肺炎

C. α_1 -抗胰蛋白酶缺乏

题52. 二性霉素B能引起以下各种副作用, 除了

A. 低钾血症

D. 神肌精肉阻滞

B. 寒战、头痛

E. 肾小管性酸中毒

C. 贫血

题53. 坏疽性深脓疱是以下何者感染的一种表现

A. 产气假单胞菌

D. A型溶血性链球菌

B. 炭疽杆菌

E. 产气荚膜杆菌

C. 丹毒丝菌

题54. 以下除何者外都可引起视网膜异常

A. 结核杆菌

D. 鼠弓形体

B. 卡氏 囊虫

E. 荚膜组织胞浆菌

C. 白色念珠菌

55. 治疗Legionnaires病首选药物是

A. 四环素

D. 红霉素

B. 利福平

F. 链霉素

C. 氯霉素

题56. 与脑膜炎双球菌菌血症病人有密切接触的家属, 在知道细菌药敏之前, 以下何者是首选的预防方法

A. 二甲胺 四环素250mg, 口服, 4次/d, 连续7天

B. 磺胺嘧啶1.0, 口服, 2次/d, 连续2天

C. 青霉素V250mg, 口服, 4次/d, 连续7天

D. 利福平600mg, 口服, 2次/d, 连续2天

E. 多价的脑膜炎双球菌疫苗

题57. 以下何者对评定神经梅毒病人的治疗效果最合适

A. CSF (脑脊液) 细胞计数和VDRL效价

B. CSF细胞计数、蛋白和VDRL效价

C. CSF细胞计数、葡萄糖和蛋白

D. CSF荧光密螺旋体抗体吸收 (FTA-ABS) 效

E. 血清FTA-ABS效价和CSF、VDRL效价

题58. 男, 69岁, 心绞痛病人, 1年前住院用普鲁卡因青霉素G120万单位, 2次/d, 连续1个月以治疗肺脓肿。现在发现有典型的梅毒性主动脉炎的X线表现, 梅毒血清学试验 (VDRL) 阳性 (1:4), 血清FTA-ABS阳性。脑脊液VDRL试验阴性, CSF细胞计数为1个淋巴细胞/mm³, CSF蛋白质为52mg/100ml。你将采取以下何种治疗

- A. 先锋霉素I 1g, 静脉注射, q8h, 连续10天
- B. 水剂青霉素G, 每天100万单位, 连续10天
- C. 四环素0.5g, 口服, 4次/d, 连续14天
- D. 作血清和CSF梅毒螺旋体固定试验
- E. 不采取进一步行动

说明: 从题59到题124, 有一个或多个答案是正确的, 用以下字母表示

1、2、3 正确	选 A
1、3 正确	选 B
2、4 正确	选 C
只有 4 正确	选 D
都正确	选 E

题59. 下列有关带状疱疹性水痘的叙述何者是正确的

- 1. 与患带状疱疹病人接触过的易感儿童大约有50%的机会发生水痘
- 2. 在接触过水痘的易感儿童中, 第二次发作的发生率超过80%
- 3. 不明显的(亚临床的)水痘感染是常见的
- 4. 高达1/3的患水痘的成人有肺炎的证据

题60. 肠病毒可引起

- 1. 疱疹性咽峡炎
- 2. 心包炎和心肌炎
- 3. 胸膜痛
- 4. 口蹄疫

题61. 活的减毒腮腺炎病毒疫苗

- 1. 在湿疹儿童中禁用
- 2. 对90%以上的接种者有保护作用
- 3. 与麻疹和风疹疫苗联用时, 应在9~12月的年龄时使用
- 4. 可诱发不会传染的、不典型的感染

题62. 肺炎球菌的荚膜多糖

- 1. 能从肺炎球菌性脑膜炎患者的血、尿和脑脊液中检出
- 2. 对肺炎球菌具有毒性
- 3. 是形成80种以上不同肺炎球菌种类的基础
- 4. 在严重的肺炎球菌性疾病病例中可引起发热、毒血症和休克

题63. 下列关于毛霉菌病的叙述何者是正确的

- 1. 它最常累及患有糖尿病, 癌症和尿毒症之类严重疾病的病人
- 2. 它可引起中小动脉血栓形成
- 3. 它能引起临床上与曲霉性支气管炎肺炎不易鉴别的肺部病变
- 4. 在鼻脑型中, 单用二性霉素B治疗常可见效

题64. 33岁、患有糖尿病的男子, 有二尖瓣狭窄。在进行下列何种操作时可不必用抗生素来预防感染性心内膜炎

- 1. 在注射胰岛素的部位作脓肿切开和引流
- 2. 心导管检查

3. 膀胱镜检查无症状性菌尿

4. 光学纤维支气管镜检查

题65. 肠病毒

1. 最可能在冬末和春季引起临床感染

2. 引起儿童感冒和细支气管炎

3. 对幼鼠都是感染性的

4. 可引起急性出血性结膜炎

题66. 7岁儿童在医院中死于脑膜球菌性脑膜炎。谁该接受化学性预防

1. 该儿童的父母亲

2. 该儿童学校中的同班同学

3. 该儿童的兄弟姐妹

4. 医院中护理过该儿童的护士和住院医师

题67. 破伤风的表现包括

1. 血压极高和突然心动过缓

2. 高热, 伴出汗而丢失大量盐和水

3. 室上性心动过速

4. 血管收缩

题68. 东方马属脑炎病毒

1. 是美国东部夏季虫传病毒性脑炎最常见的原因

2. 死亡率约为50%

3. 存活者常产生长期的神经损害

4. 是由A型虫传病毒引起的。除了蚊子、马和人以外还能从许多种野禽中找到A

型虫传病毒

题69. 引起的脑炎的虫传病毒

1. 能引起中枢体温调节机制严重紊乱

2. 是由蚊子传播的

3. 是由壁虱传播的

4. 常常引起白细胞减少

题70. 肺炎支原体肺炎

1. 常伴有头痛

2. 最常发生于冬季

3. 常伴有咽炎, 有时伴有大泡性鼓膜炎

4. 通常可引起双侧性浸润

题71. Colorado壁虱热

1. 常有持续1周的双相病程

3. 常引起明显的白细胞减少

2. 有3~7天的潜伏期

4. 用四环素治疗最好

题72. 下列有关皮下白喉的叙述何者是正确的

1. 该病由接触传染

2. 白喉性心肌炎或神经病变是偶见的并发症

3. 该病常发生于热带不发达国家的贫穷儿童中

4. 应该用静脉内注射抗毒素来治疗

题73. 男, 25岁, 医学生, 在一次A型流感流行时住院, 主诉发热、咳嗽、胸痛。1周前有低热伴头痛, 似乎已恢复, 接着就发现突然发生现在的症状。这些症状的原因可能包括以下哪些

1. 金黄色葡萄球菌

3. 肺炎链球菌

2. 绿脓杆菌

4. 卡氏肺囊虫

题74. 肺星形诺卡氏菌感染

1. 是肺泡蛋白沉积时一种相当常见的并发症

2. 可能和皮肤和脑的脓肿相关

3. 应该用大剂量磺胺嘧啶治疗

4. 常是一种自限性疾病

题75. 如果有下列情况, 感染性心内膜炎病人的预后很差

1. 血循环中免疫复合物效价很高

3. 肾梗塞引起的内眼血尿

2. 伴有心力衰竭的主动脉瓣病变

4. 修补过的瓣膜上有感染

题76. 从主诉有间歇性喘息和气急的病人少量粘痰标本中反复发现烟曲霉菌。下列何者可能是正确的

1. 血清中有烟曲霉的沉淀素

2. 对流免疫电泳可显示血和痰中有烟曲霉素抗原

3. 外周血中嗜酸细胞增多

4. 应该给病人静脉注射二性霉素B一个疗程

题77. 由大肠杆菌引起的脑膜炎

1. 通常是由带有K100抗原的菌株引起的

2. 常并发脑室炎

3. 最常见于1~5岁

4. 死亡率约50%

题78. 下列疾病中何者常可在粪中发现多形核白细胞

1. 葡萄球菌小肠结肠炎

3. 志贺氏菌痢

2. 溃疡性结肠炎

4. 旅行者腹泻

题79. 下列药物中何者对治疗恶性疟疾有效

1. 奎宁

3. 磺胺嘧啶

2. 乙胺嘧啶

4. 氯奎

题80. 预防或治疗病毒性感染有效的抗病毒药包括

1. 疱疹净

3. 金刚烷胺

2. 阿拉伯糖腺嘌呤

4. 缩氨基硫脲

题81. 真菌包括下列哪些

1. 伊氏放线菌

3. 星形诺卡氏菌

2. 申克孢子丝菌

4. 白色念珠菌

题82. 二期梅毒未经治疗而恢复的病人大约有

1. 30%的机会形成三期梅毒
2. 25%的机会再发, 具有二期梅毒复发的表现
3. 10%的机会形成心血管梅毒
4. 7%的机会形成神经梅毒

题83. 猫抓病

1. 是美国儿童和青少年中慢性局部淋巴结炎最常见的原因
2. 可引起淋巴结肿大, 但不化脓
3. 通常是由外表完全健康的猫传播的
4. 在大约50%的病例中伴有脾肿大

题84. 下列何种淋病双球菌感染是无症状的

1. 10~20%尿道感染的男性
2. 大部分咽部感染的病人
3. 大部分直肠感染的病人
4. 大部分淋球菌盆腔炎症性疾病的妇女

题85. Weil—Felix反应

1. 是立克次体病的特异性反应
2. 是一种典型的凝集反应
3. 得病3周后转为阳性
4. 偶然在钩端螺旋体或变形杆菌感染的病人中出现假阳性结果

题86. 下列哪些疾病的表现容易和立克次体感染的表现相混淆

1. 伤寒发热
2. 脑型疟疾
3. 脑膜炎双球菌血症
4. 麻疹

题87. 由旋转病毒 (rotavirus) 引起的急性胃肠炎

1. 通常在冬季发生
2. 在4岁以后不常见
3. 有1~4天的潜伏期
4. 通常可使粪中出现白细胞

题88. Legionnaires病

1. 在不很健康的人群中, 其死亡率为5%
2. 在免疫受抑制的宿主中更常见
3. 常引起腹泻
4. 是由在琼脂上不会生长的、需要复杂营养的厌氧菌引起的

题89. 已知感染下列何种微生物会引起布氏杆菌凝集试验的假阳性

1. 霍乱弧菌
2. 野兔热布鲁氏杆菌 (巴斯德菌属)
3. *Yersinia enterocolitica*
4. 伤寒杆菌

题90. 肺炎杆菌性肺炎

1. 是由一种在正常口咽部菌群中也可发现的细菌引起的
2. 通常仅累及肺的一叶
3. 通常可引起肺组织坏死