

醫學秘奧三



胃癰

素問云人病胃脘癰當候胃脉，沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃口不行故胃爲癰其發寒熱如瘡身皮甲錯或嗽



或嘔或吐膿血熱聚胃脘留結為癰須要知戒

連翹升麻湯

沉香另

乳香另

生甘草

青木香

各錢

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通各七分五分

大黃

飯上蒸三兩

射香

二分

右作十劑每劑以粗藥水煎去渣入五香細末溫服以利為度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍

射干

黃芩

大黃

炒熟各二分

水煎去渣入蜜再煎溫服

心肝癰

心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心主行血氣血熱傷于經絡此是惡毒之



症不可不審也當用定痛敗毒散如不散用內托

流氣飲

定痛敗毒散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

茯苓

防風

白芷

香附

白芍

羌活

人參

前胡

姜三片棗一枚燈心甘莖煎服

內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

白芍

當歸

防風

烏藥

白芷


川芎

姜三棗一食前服

腹痛加沒藥玄胡索



血疳瘡



四〇〇

夫血疳者臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少風毒閉塞腠理發于肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身行處成瘡損傷皮肉痒痛難存治法先服當歸連喬散並服清肌滲濕湯并搽十神散

清肌滲濕湯

歸鬚 酒洗

白芷

甘草

升麻

蒼朮

白朮

土炒

川芎

白芍

酒炒

山梔

酒炒

連喬

黃連

酒炒

黃柏

鹽酒拌炒

知母

同上

木通

青皮

木瓜

澤瀉

茯苓

苦參

酒炒

枳殼

柴胡

石菖蒲

煎服治法亦同紫疥

此症蜂窠發于胸乳間乃心火熱盛須用依前疎導心火之藥稍治之遲則熱必攻心必然死矣

煎藥

人參

黃芪

白朮

茯苓

甘草

金銀花

連翹

生地

白芍

山梔

黃芩

天花粉

桔梗

防風

青皮

乾葛

麥冬

鼠粘子

冬天加官桂

夏天加黃柏


雨天加澤瀉

先貼膏藥

後用摻藥方具于前

先用猪蹄湯

九發



此症發爲肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽
三焦疽小腸癰右驗其人所膜依據此候審定癰
疽淺深其病從何臟腑發先曾食何乳石又驗其
氣血虛實穿潰出外者可治發于內者則傷膜流
膿大便出者必難治若以藥會膿大便出者則藥
味入于經絡引出無害當參詳而療之
參芪內托散具前愈後一年之外不許遠行及行
房事若不知戒終至于死

圍藥同前

臍癰



此症生于臍內因食冷物油膩之物積聚于氣海之間聚結成癰若不速治卽內潰臍內出膿四圍堅硬或出此血水者卽難治也無此卽生

用內托散加

猪苓

澤瀉

歸鬚

黃柏

車前子

知母

膿盡多加

白朮

黃芪

熟地


山藥

多服蠟礬丸

如未潰破按之有膿將治腸肚癰行藥從大便中出甚妙方亦同

痛加乳香

小腸癰



此症因膀胱有熱畜毒不流結成此毒以致臍中
堅硬結核小便疼痛日夜下利無度治方于後

用服敗毒散加

猪苓

澤瀉

木通

燈草

甘草梢

瞿麥

又用連根葱十根搗爛盒臍上多服金花丸
用前腸癰肚癰之法治之



卽盤腸癰

用腕疽後方



此毒因閃胸而得之用獨活散

此卽治腕疽藥

羌活 獨活 烏藥 茯苓 荆芥 當歸

川芎 桔梗 白朮 黃芪 升麻 貝母

枳殼 知母 黃柏 人參

再用前肚癰之法治之

會膿在大便中出法開后

大黃 三錢 姜黃 二錢 赤石脂 二錢 穿山甲 炮五分

白芷 一錢 髮灰 一錢 巴豆 不去油一粒臨服和藥內研細

右為末老酒早辰空心調服

行利十餘次用薄粥補之如瀉不止飲新汲井水

三酒盃其瀉立止須要服參芪膏大補之

