

秀和堂

文瞻



醫宗全鑑卷四

卷五 辨少陽病脈證全篇

卷六 辨太陰病脈證全篇

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註少陽全篇目錄

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

黃連湯

大柴胡湯

柴胡加芒消湯

報時歌



王朴集

清江寒館

全藏目錄



御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病脈證并治全篇

少陽主春其氣半在地外半在地中人身之氣亦如之故主半表半裏也半表者謂在外之太陽也半裏者謂在內之太陰也邪入其間陰陽相移寒熱交作邪正相持進退互拒此際汗吐下三法俱在所禁故立小柴胡湯和解法加減施治然小柴胡加減法中又有口不渴身有微熱者加桂枝以取汗及下後胸膈滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又有柴胡

證具而反下之心下滿而頭痛者此爲結胸也大陷胸湯  
主之及柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱  
鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之更有木柴胡證醫  
以丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加杏  
消湯下之等法是仲景亦有汗下之法惟在臨證詳察因  
病施治不可執一也

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

註少陽者膽經也其脈起於目銳皆從耳後入耳中挾咽出  
頸領中邪傷其經故口苦咽乾目眩也口苦者熱蒸膽氣  
上溢也咽乾者耗其津液也目眩者熱薰眼發黑也此

揭中風傷寒邪傳少陽之總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者卽具此證之謂也

集林瀾曰論中言少陽病胸脇痛耳聾往來寒熱心煩喜嘔  
詒胸脇痞癆半表半裏之證詳矣此何以曰口苦咽乾目眩  
也大抵病於經絡者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病  
則又必有此證也

沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主膽其脈循脇  
絡於耳故胸脇痛而耳聾仲景另出手眼以補口苦咽乾  
目眩之裏證乃括少陽風傷衛寒傷榮風寒兩傷而言也  
吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主之若從火化

火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也

魏荔彤曰膽府與少陽經爲表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界爲言又曰經中所謂不必悉具者指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指爲少陽病成者

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

少陽卽首條口苦咽乾目眩之謂也中風謂此少陽病是

從中風之邪傳來也。少陽之脈起目銳眎從耳後入耳中。

其支者會缺盆下胸中循脇表邪傳其經故目赤耳聾胸

中滿而煩也然此乃少陽半表半裏之胸滿而煩非太陽

證具之邪陷胸滿而煩者比故不可吐下若吐下則虛其

中神志虛怯則悸而驚也此揭中風邪傳少陽之大綱也。

集註程知曰少陽惟宜和解若吐之則傷其陽而悸下之則虛

其陰而驚

汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行吐下之法成

註謂吐則傷氣氣虛者悸下則亡血血虛者驚不知驚悸

皆主於心誤吐且下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也

沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其邪已下拘循  
脇吐之徒傷胸中之氣使邪內併逼迫神明則悸而驚也  
魏荔彤曰此條論仲景不出方小柴胡條中有心煩心下  
悸之證想可無事他求也汗吐下三法既不可行則當和  
解之小柴胡爲少陽對證之藥斯用之必決耳

傷寒峩弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讞語  
此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註不曰少陽傷寒而曰傷寒畧言之也謂此少陽有上

寒之邪傳來也峩弦細少陽之傳來也不言峩此言峩  
者補言之也頭痛發熱無汗傷寒之證也又兼見口苦嘔

故不可發汗若發汗則益傷其津而助其熱必發讞語既  
發讞語則是轉屬胃矣若其人津液素充旨能自和則或  
可愈否則津乾熱結胃不能和不但讞語且更煩而悸矣  
此揭傷寒邪傳少陽之大綱也

集註王肯堂曰凡頭痛發熱俱爲在表惟此頭痛發熱爲少陽  
者何也以其脈弦細故知邪入少陽之界也

喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉其  
旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宜於發汗者尚不可汗則傷  
風之不可汗更不待言矣傷風之胸滿而煩似可吐下者

尚不可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣脈弦細者  
邪欲入裏其在胃之津液已爲熱耗重復發汗而驅其津  
液外出安得不譫語乎

王琥曰誤發其汗譫語者奪其津液而胃乾故言亂也此  
少陽之邪已極屬胃胃和則愈者言當用藥以下胃中之  
熱而使之和平也胃不和不但譫語更加煩擾忪悸此言  
胃熱上犯於心故藏神不自寧也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜  
嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小  
便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

註

此承上三條互詳其證以明其治也。傷寒中風三四日見口苦、咽乾、目眩之證與弦細之脈知邪已傳少陽矣。若兼見耳聾、目赤、胸滿而煩者則知是從中風傳來也。若兼見頭痛、發熱、無汗者則知是從傷寒傳來也。今五六日更見往來寒熱、胸脇苦滿、默默不欲飲食、心煩喜嘔則知是中風傷寒兼見俱有之證也。少陽之邪進可傳太陰之裏退可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外井於表半表不解則作寒內井於裏半裏不和則作熱或表或裏無常故往來寒熱不定也。少陽之脈下胸循脇邪湊其經故胸脇苦滿也。少陽邪近乎陰故默默也。少陽木邪病則妨

土故不飲飲食也。邪在胸腹火無從泄上逼於心故心煩  
也。邪欲入裏裏氣外拒故嘔嘔則木氣舒故喜之也。此皆  
柴胡應有之證也。其餘諸證時或有之總宜以小柴胡湯  
主之各隨見證以加減治之可耳然既分中風傷寒之傳  
而不分其治者何也蓋以太陽有營衛之分故風寒之辨  
空嚴及傳陽明少陽則無營衛之分且其邪皆化熱故同  
歸一致也。

集成無己曰邪在表裏之間謂之半表半裏傷寒中風者是  
註或傷寒或中風非傷寒再中風中風復傷寒也五六日邪  
自表傳裏之時邪在表則寒在裏則熱今在半表半裏之

間未有定處故往未寒熱也邪在表心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今言胸脇苦滿亦是在表裏之間也邪在表呻吟不安邪在裏則內煩經云陽入之陰則靜默默由邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏不能食不欲食者未至於必不能食故亦爲在表裏之間也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩而喜嘔者邪在表方傳裏也邪初入裏未有定處所傳不一故有或見之證也

方有執曰五六日大約言也往來寒熱者邪入驅殼之裏藏府之外兩界之隙地所謂半表半裏乃少陽所主之部

位也。故入而併於陰則寒出而併於陽則熱。出入無常。故  
寒熱間作也。太陽一經有營衛之不同。所以風寒異治。陽  
明切近太陽。營衛之道在通風寒之辨尚嚴。少陽一經越  
陽明去太陽遠矣。風寒無異治。經以傷寒中風五大日往  
來寒熱交互爲文者。發明風寒至此同歸於一致也。

小柴胡湯方

柴胡半觔

黃芩三兩

人參三兩

半夏半升

甘草三兩

生薑三兩

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

○加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加桔梗實一枚

若渴去半夏加人參合前成四兩半桔梗根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫服微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

方解 邪傳太陽陽明曰汗曰吐曰下邪傳少陽惟宜和解汗叶