

臨證指南匯編卷四



臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸疽

哮

喘

呃

疽



臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九仝

華旦玉堂

積聚

木犯土
虛中夾
滯

葛

嗔怒強食肝木犯土腹滿突如有形緩則泯然無跡

氣下鳴響皆木火餘威乃瘕疝之屬攻伐消導必變腹

滿以虛中挾滯最難速功近日痛瀉恐延秋痢

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍



廣皮

煨益智仁

又下午倦甚。暮夜痛發。陽微陰濁。乃踞。用溫通陽明法。

人參

吳萸

半夏

姜汁

茯苓

炒白芍

又照前方去白芍。加川棟牡蠣。

脾胃傷
氣分結
痞

白_{四十}瘧邪久留。結聚血分。成形。仲景有緩攻通絡方法可。

宗但瘧母必在脇下。以少陽厥陰表裡為病。今脉弦大。面色黃滯。腹大青筋皆露。頸脉震動。純是脾胃受傷。積聚內起。氣分受病。痞滿勢成。與瘧母邪結血分。又屬兩途。經年病久。正氣已怯。觀東垣五積。必踈補兩施。蓋繩。



攻為宜。

生於木

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

姜渣

水法丸

氣滯濕
熱

馬三

病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕鬱而

成熱六腑滯濁為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每

取丸劑緩攻當倣之

川連

蘆薈

箬葉
上炙

雞肫皮

不落水去垢
新瓦上炙脆

煨木香

小青皮

萊菔子

南山杏

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱食
滯

陳十

濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱



當進和衷忌口勿勞不致變病。

黃芩

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮

雞肫皮

水泛丸

痰癰脉絡

吳三

右脇有形高突按之無痛此屬癰瘡非若氣聚

難以推求然病久僅阻在脉須佐針刺宣通正在伏天宜商

真蛤粉

白芥子

瓜蒌皮

黑梔皮

半夏

鬱金

橘紅

姜皮

血絡凝滯

曹

着而不移是為陰邪聚絡診脉弦緩難以五積肥氣

攻治大肯以辛溫入血絡治之



當歸鬚

延胡

官桂

橘核

韭

王

三驕射馳驅。寒暑勞形。皆令陽氣受傷。三年來右

形高微突。初病脹痛無形。久則形堅以梗。是初爲氣結
在經。久則血傷八絡。蓋經絡系於臟腑外廓。猶堪勉強
支撐。但氣鈍血滯。日漸瘀痺。而延癥瘕。怒勞努力。氣血
交亂。病必旋發。故寒溫消剋。理氣逐血。總之未能講究
絡病工夫。考仲景於勞傷血痺諸法。其通絡方法。每取
虫蟻迅速飛走諸靈。俾飛者升。走者降。血無凝著。氣可
宣通。與攻積除堅。徒入臟腑者有間。錄法備參未議。

蟪蛄出

鹿虫

當歸鬚



川芎

生香附

煨木香

生牡蠣

夏枯草

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢

某

伏梁病在絡。曰後當血凝之慮。脉數左大是其

厚朴

一錢

青皮

八分

當歸

一錢

鬱金

一錢

益母草

三錢

茯苓

一錢

澤瀉

一錢

某

脉數堅。伏梁病在絡。宜氣血分滯

桃仁

三錢

鬱金

一錢

芫薺子

一錢

枳實

七分

厚朴

一錢

茯苓

一錢

通草

五分

自難經分出積者陰氣也。五臟所生。聚者陽氣也。六

腑所成。後巢氏病源另立癥瘕之名。以不動者爲癥。



動者爲痕。究之亦卽難經積聚之意也。前賢有聚者就其肩膜結聚之處以脉經所過部分屬脾者爲陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者爲陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。着而不移是爲陰。邪聚絡。大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜不移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰邪者。自必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽以施其辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入絡。輒仗蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙。於



古人書引伸觸類而得。若夫會肫之去執。帶介合之
豁疑。痰不過爲先生用古處也。案中積症。第見
不能盡備。然宋時諸賢。於五積九積治法。載在
者頗多。大畧消補兼施。并以所惡者攻。所喜者
業醫者自當知之。稔也。
姚亦陶



痞

咳熱
明

宋

前議辛潤下氣以治肺痺謂上焦不行則下脘不
古稱痞悶都屬氣分之鬱也兩番大便胸次稍舒而未
為全爽此豈有形之滯乃氣鬱必熱陳腐粘凝膠聚故
脘腹熱氣下注隱然微痛法當用仲景梔子豉湯解其
陳腐鬱熱暮卧另進白金丸一錢蓋熱必生痰氣阻痰
滯一湯一丸以有形無形之各異也

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢



北京中醫藥大學圖書館版權所有

熱邪裡結

孫 寒熱由四末以擾胃非藥從口入以擾胃邪熱津液

互膠成痰氣不展舒。阻痺腕中。治法不但攻病前

藥欲認藥氣盡病自退避三舍耳。

人參

川連鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

某

脈不清神煩倦中痞惡心乃熱邪裡結進瀉心法

炒半夏

黃芩

黃連

乾姜

枳實

杏仁

劉

熱氣痞結非因食滯胃汁消燼舌乾便難苦辛開氣

酸苦泄熱是治法矣



川連

生薑

人參

枳實

橘紅

烏梅

生白芍

氣閉化
顧

氣閉久則氣結不飢不食不大便

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又

氣結必化熱乃無形之病故徒補無益

鮮省頭草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何七

煩勞之人衛氣少固霧露雨濕傷其流行清肅瘡瘍

外洞腕脇反痺乃經脉為病無關腑臟

釣藤

生白蒺

鬱金

白蔻仁



桑葉

橘紅

又氣室熱鬱。仍治上可以通痺。

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

熱邪入厥陰

周

寒熱嘔吐疏重自利。是暑濕熱外因。因噎怒動肝邪。

氣入於厥陰。胸滿腹脹消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參甘加枳實白芍。

伊

因驚而得邪。遂入肝。故厥後熱。神識昏狂。視得面青。

舌白微嘔渴飲。胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。

宗仲景以瀉心湯為法。



北京中医药大学图书馆版权所有

川連

半夏

乾姜

黃芩

人參

枳實

暑濕
邪夾

尤

面垢油亮目眦黃頭脹如束胸脘痞悶此暑濕熱氣

內伏因勞倦正氣泄越而發既非暴受風寒發散取汗

徒傷陽氣按脉形濡濡者是表症凡傷寒必究六經伏

氣須明三焦論症參脉壯年向非有餘之質當以勞倦

傷伏邪例診治

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

薤仁

竹葉

又

胸痞自利狀如結胸夫食滯在胃而胸中清氣悉為



濕濁阻遏。與食滯兩途。此清解三焦却邪湯藥兼進條

和丸消導。

淡黃芩

川連

淡乾姜

厚朴

醋炒

鬱金

白蔻仁

滑石

送保和丸三錢

暑邪阻氣

炎

胸痞不饑。熱不止。舌白而濕。此暑邪未盡。仍清氣分。

淡黃芩

知母

橘紅

鹽水

滑石

桔梗

枳殼汁

鬱金汁

某四惡寒泄瀉悉減。胸脘仍悶。餘暑未盡。胃氣未甦。故耳。

大麥仁

錢四

佩蘭葉

錢三

新會皮

半夏

錢一

金斛

錢一

茯苓

錢三

