

婦人良方

婦人良方卷之十四

薛氏醫按

臨川陳自明編

吳郡薛

已註

新

都

段道政校

妊娠中風方論第一

論曰四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若
從其鄉來者長養萬物否則名爲虛邪賊害萬物體
虛口之客於皮膚則頑痺不仁入於筋脉則攣急痼
癖若兼濕熱則弛縱痿軟若入臟腑氣隨所傷經絡
而爲諸病妊娠中之必須早治庶免墮胎之患

愚按病機機要云風本爲熱熱勝則風動宜以靜

勝其燥是亦養血也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多着四肢則脉浮惡寒拘急不仁中臟者多着九竅則唇緩失音耳聾鼻塞目瞽便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中風之要法妊婦患之亦當以此施治而佐以安胎之藥仍參三卷首論主治

防風散

治妊娠中風卒倒口噤肢強或痰氣上升

防風

桑寄生

葛根

各五分

家菊花

細辛

防已

秦艽

當歸

桂心

茯苓

甘草

羚羊

銹名

右水煎入竹瀝半合服

白朮酒治妊娠中風口噤不語

白朮

一兩

獨活

一兩

黑豆

一合

右酒煎四分服灌之得汗即愈

補遺治妊娠中風排風湯續命湯參蘇湯

加羌活

引風

湯皆可選用

方見第三卷中風類

妊娠風癰方論第二

論曰：妊娠體虛受風而傷足，太陽經遇風寒相搏，則口噤背強。甚則腰反張，名之曰瘈。須臾自醒，良久復作。又名子癇。子冒當察其因而治之。

愚按：前症若心肝風熱，用釣藤湯。肝脾血虛，加味逍遙散。肝脾鬱怒，加味歸脾湯。氣逆痰滯，紫蘇飲。肝火風熱，釣藤散。脾鬱痰滯，二陳薑汁竹瀝。若兼症相雜，當參照子煩門。

附治驗

一妊婦出汗，口噤腰背反張。時作時止。此怒動肝火也。用加味逍遙散漸愈。又用釣藤散而止。更以

四君加釣藤山梔柴胡而安

一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散漸愈更用釣藤散治痊又用歸脾湯而安

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子癇風瘳

羚羊角

鎔

獨活

酸棗仁

炒

五加皮

薏苡仁

炒

防風

當歸

酒浸

川芎

茯神

去木

杏仁

去皮尖
各五分

木香

甘草

炙各
二分

右薑水煎

附方

釣藤湯

方見十二卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

釣藤散

方見四卷第四論

二陳湯

方見二十四卷第五論

四君子湯

方見二十四卷第六論

妊娠痙癰方論第三

新附

痙謂痙者筋脉急而縮也癰者筋脉緩而伸也一縮

一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘈瘲也此症多屬風蓋風主搖動路龍吉云心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則爲瘈瘲也治法若因風熱用釣藤湯加柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風痰上湧加竹瀝南星半夏若風邪急搐加金蝎殭蠶麝損氣血用八珍湯加釣藤山梔爲主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝氣絕也皆不治

附治驗

方藥

一妊婦四肢不能伸服祛風燥濕之劑遺屎痰甚

四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩
爲主佐以釣藤湯而安後因怒前症復作小便下
血寒熱少寐飲食少思用釣藤散加山梔柴胡而
血止用加味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯
加芍藥釣藤飲食進而漸安

八珍湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

姪鬼胎方論第四

夫人臟腑調和則血氣充實精神健旺若榮衛虛損
精神衰弱妖魅之類乘之亦如懷妊之狀故曰鬼胎

愚按前症因七情脾肺虧損氣血虛弱行失常道
衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若
見經候不調就行調補庶無是症治法以補元氣
爲主而佐以雄黃丸之類行散之若脾經鬱結氣
逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用
六君芎歸培養之肝火血耗者用加味逍遙散滋
抑之肝脾鬱怒者用加味歸脾逍遙二藥兼服腎
肝虛弱者用六味地黃丸

附治驗

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎
症之藥不應余診視之曰面青脉瀉寒熱往來肝
經血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此營
怒傷脾肝之症非胎也不信仍用治胎散之類不
驗余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑諸症稍
愈彼欲速效別服通經丸一服下血昏憤自汗惡
寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮薑二劑漸愈
又用十全大補湯五十餘劑而安

雄黃丸

治鬼胎瘀血腹滿

雄黃

鬼臼 去毛

莽草

丹砂細研

巴豆去油

獾肝炙黃各半兩

蜥蜴一枚炙黃

蜈蚣一條炙黃

右爲末蜜丸桐子大每服二丸空心溫酒下日三服或下如蛇蟲之類其病乃除

治鬼胎及血氣痛不可忍

斑猫去頭足翅製

延胡索炒各等分

右爲末以溫酒調下半錢以下穢物爲度

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠傷寒方論第五

夫時令嚴寒體虛所傷即成傷寒輕者洒淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日而愈重者頭疼體痛寒熱交作久而不愈者多致傷胎也

愚按前症爲害匪輕當審經絡表裡而治之不可輕忽

加減四物湯

治妊婦腹痛或月事不調胎氣不安

產後血塊或亡血過多或惡露不下

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

各一兩

右每服四五錢水煎日二三服下血加艾葉阿膠
虛熱口乾加杜蘅根麥門冬惡血腹痛加當歸芍
藥血崩血淋加熟地蒲黃因熱生風加川芎柴胡
頭昏項強加柴胡黃芩大便秘結加大黃桃仁嘔
吐惡心加白朮人參虛煩不眠加竹葉人參煩躁
大渴加知母石膏水停吐逆加猪苓茯苓虛煩傷
寒加人參柴胡防風

阿膠散

治時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠

炙

白朮

炒

桑寄生

人參

白茯苓

右爲末等分每服一錢用糯米飲調下日三服

煎胡湯

治傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏

一錢

煎胡

甜竹茹

梔子

炒

黃芩

炒

大青

知母

各五分

右用葱白水煎服

蘇木湯

治傷寒時行洒淅寒振或兼噤者

赤芍藥

橘紅

黃芩炒

黃連

甘草

蘇木

各五分

右用水煎服汗出即瘥如胎不安兼服阿膠湯

黃龍湯 治經婦寒熱頭疼嘿嘿不食脇痛嘔痰及

產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來勞復

熱不解散

柴胡二錢

黃芩炒

人參

甘草各一錢

右用水煎服

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒身熱拘急口乾

柴胡

二錢

甘草

一錢

石膏

三錢

右用薑水煎服氣虛加人參

枳實散

治傷寒四日至六日腹脹少食腰疼體重

枳實

炒三錢

陳皮

一錢

麥門冬

一錢半

右用生薑葱白水煎服

旋覆花湯

治傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花

赤芍藥

甘草

各五分

前胡

石膏

各一錢

白朮

人參

麻黃

去根節

黃芩

各三分

右用薑水煎服