

保嬰撮要卷十二續集

薛氏醫按

吳郡薛已著

江都吳中珩校

疔瘡一

諸瘡惟疔毒爲甚而殺人亦速古云疔有十三種種各不同內三十六疔滿其數卽不可救亦有不滿其數而灰者乃毒氣走散故也若痘毒染人發於頭面或遍身者又非此類在小兒多因乳母食有毒之物或兒卒中飲食之毒或感四時不正之氣皆能致之其瘡多生頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡

或痛或痒或麻木不仁外症寒熱嘔吐惡心肢體拘急大要當分邪之在表在裡急用隔蒜灸法并解毒之劑若不省人事牙關緊閉急以奪命丹爲未熟酒調灌如食生冷之物或用涼水淋洗則輕者難愈重者不治其生於兩足者多有紅絲至臍生於兩手者多有紅絲至心生於唇口之內者多有紅絲入喉急用針挑出惡血以泄其毒可保無虞其在偏僻之處藥難導達者惟灸法有回生之功若投峻厲之劑是促其危矣小兒肌肉脆嫩且不能言痛否灸法須將蒜切薄片著肉一面略剝少空灼艾燃蒜先置大人

臂上試其冷熱得宜然後移著瘡上又別灼艾如前
法試之以待相易勿令間歇

毗陵金文治子將週歲唇上患疔余用活命飲母子
並服更欲隔蒜灸彼不從見腫勢益盛勉灸數壯余
誠以多灸爲佳又爲人所阻而止頭面益腫乃復灸
五十餘壯腫勢漸消時與乳母服活命飲瘡出黃水
翌日潰而得生

一小兒三歲手患紫疔二顆寒熱作痛用仙方活命
飲半盃而愈數日後手臂俱腫乃用隔蒜灸服前藥
而愈

一小兒足患之嘔吐腹脹二日不食欲用護心散診氣口脉大審其大便所出皆酸穢余曰此飲食停滯耳非瘡毒內攻也若用護心等劑則誤矣急投保和丸二服及隔蒜灸而愈其時同患是症用護心敗毒之劑者俱致不救

一小兒面上患之寒熱癰瘡此熱極而肝火動也用荆防敗毒散及隔蒜灸瘡止熱退更服異功散加升麻柴胡桔梗而

一小兒患於胸外敷寒涼內服敗毒更欲嘔不食面色痿黃右關脉浮數按之微細此脾胃復傷所致也

急用隔蒜灸服異功散倍加白朮半夏翌日又服活命飲而愈

一小兒患前症服敗毒之藥作嘔不食余謂胃氣復傷不信另服護心散嘔甚神思沉困手足並冷脉微細如無急用五味異功散加乾薑二服嘔止食進去薑又四服而愈夫護心散皆寒涼之藥乃宋人爲服丹砂蓄熱發疽者而設胃氣有傷卽當溫補多因此藥停於胸膈惟覺陰冷作嘔沉困者世人皆謂毒氣攻心而遂槩用之其鮮有不敗事者矣

一小兒手背患此敷服皆寒涼之劑腹脹痰喘瀉糞

穢臭余謂脾胃復傷而飲食停滯也不信仍服治瘡之藥而歿

一小兒臂患之色赤腫起恪用化毒丹鐵箍散腫處頓平肉色白陷再日色黯痰喘氣促余謂瘡毒反入於內也辭不治果歿

飛龍奪命丹治瘡毒發背腦疽等症

真蟾酥

乾者酒化

輕粉

枯白礬

寒水石

銅碌

乳香

沒藥

麝香

朱砂

各六錢

蝸牛

四十箇另研如無亦可

右各爲末入蟾酥蝸牛或加酒少許糊丸棗豆

每服一二丸溫酒或葱湯下重者外用隔蒜灸法

荊防敗毒散卽人參敗毒散加荊芥防風方見流江

仙方活命飲方見熱毒瘡瘍

保和丸方見發熱不止

五味異功散方見敗毒之藥

時毒二頭面赤腫

小兒時毒因感四時不正之氣致鼻面耳項或咽喉
赤腫寒熱頭痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞狀如傷寒
五七日間亦能殺人脉浮數者邪在表脉沉瀼者邪

在裡在表用葛根牛蒡子湯在裏用梔子仁湯表裡俱病者犀角升麻湯甚則宜砭及用通氣散宣泄其毒旬日自消若不消而欲作膿者用托裏消毒散欲收斂者用托裡散若咽腫不能言頭腫不能食者必灰

一小兒患此三日二便調和用葛根牛蒡子湯漫腫悉退惟頰間赤腫欲作膿用活命飲二服外用代針膏而膿出再用托裏消毒散而愈

一小兒腫赤焮痛此欲作膿也用托裏消毒散二劑膿成針之腫痛頓減又二劑漸愈却以柴胡梔子散

加白芷升麻與母服之而愈

一小兒腫爛作痛藥不能下咽先用通氣散連作噎却用犀角升麻湯乳食稍進腫痛漸消仍服數劑而膿血漸少母服加味逍遙散而愈

一小兒患之咽喉作痛二便自調用葛根牛蒡子湯三劑甘桔湯四劑腫痛漸愈診乳母左關脉弦數用加味逍遙散母子並服而消

一小兒患之赤腫作渴外敷內服皆寒涼之藥余欲洗去敷藥急用發散表邪開通腠理之劑不信仍用前藥遂至不救

通氣散治時毒炊痛咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索

猪牙皂角

川芎各一錢

藜蘆五分

羊躑躅花三分

右為細末用紙撚蘸少許絛鼻內取嚏為効

甘桔湯治肺經壅熱胸隔不利咽喉腫痛痰涎壅盛

方見時毒

犀角升麻湯治風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角錢二

升麻

防風

羌活

川芎

白芷各五分

黃芩

甘草各一錢

白附子四分

右每服三五錢

梔子仁湯治時毒腫痛大便秘結

鬱金

枳殼麥炒

升麻

山梔仁

牛蒡子

研碎炒

大黃

等分炒

右爲細末每服二三錢蜜水調服

葛根牛蒡子湯治時毒腫痛消毒解熱

葛根

管仲

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半生半炒研碎各等分

右每服三五錢水煎

柴胡梔子散方見脇瘕

托裡消毒散

代針膏

托裡散

仙方活命飲

四方並見熱毒瘡瘍

加味逍遙散

方見發熱不止

流注

三

小兒流注乃氣流而注血滯而凝元氣不足之症也或因閃跌墮傷或因肝火氣逆或因六淫內侵或因脾虛食積或因稟賦所致結於四肢節體患於胸腹腰髖或結塊或漫腫或作痛悉用葱熨之法洎固元

氣爲主閃跌者和血定痛丸肝火者九味蘆薈丸食
積者四味肥兒丸藥能對症未成自消已成自潰若
膿成不潰者元氣虛也先補而針之庶使毒氣不致
內攻氣血不致脫陷若膿出而反痛者氣血虛也用
八珍湯作嘔少食者胃氣虛也用四君子湯欲嘔不
食或腹作脹者脾氣虛也用六君子湯口噤搐搦者
氣血虛極而變症也十全大補湯內熱晡熱陰血虛
也四物參芪白朮表熱惡寒陽氣虛也十全大補湯
熱來復去或晝見夜伏晝伏夜發者虛熱也當大補
元氣若色赤腫起而膿稠者尚可治不赤硬而膿清

或脉洪大寒熱發渴及不受補者皆不可治

楊鴻臚子年十二左脇下患此服流氣飲十宣散之類元氣益虛年餘不斂左尺脉數而無力左關脉弦而短此肝經之症因稟腎水不足不能滋養肝木血燥火熾而然耳用六味地黃丸以滋腎水九味蘆薈丸以清肝火而愈

一小兒九歲患此久不收斂或咳嗽或寒熱皆服清氣化痰之藥前症益甚至夜作喘口開徹夜不寐手足竝冷藥餌到口卽嘔余謂悉因脾氣虛甚所致先以人參白朮各五錢炮薑五分以米湯煎之時灌數

起次日能服一盃次日又服一劑諸症漸愈至十餘劑後朝用補中益氣湯夕用異功散而愈

李通府子十六歲腰患之三年不愈色黯下陷余曰此腎經症也宜用六味丸滋化源以生腎水更用如聖餅外散寒邪以接陽氣不信別用雜藥元氣益虛七惡蜂起始信余言仍用前藥而愈

陳州守子閃右臂腕腫痛用流氣等藥發熱惡寒飲食少思口舌乾燥腫痛愈熾形氣益疲余以助胃壯氣爲王佐以外治之法而愈

黃地宮子腿患之腫痛發熱以濕毒治之虛症悉至

余謂此元氣虛弱外邪乘之也用十全大補湯如聖餅而愈

一小兒臂肘腫硬用流氣次肉色不變飲食少思余曰此肝脾虛症也用六君桔梗薄桂茯苓半夏及如聖餅而消

一小兒腿腕間患此已半載腫硬色白形氣俱虛余不用五味異功散加當歸三十餘劑却佐以八珍湯二十餘劑更用葱熨法腫勢漸消中間一塊仍腫此欲作膿也當補其血氣遂用托裡散爲主異功散爲佐仍用葱熨法月計針出稠膿仍用前二藥及豆豉

餅三月餘而愈

一小兒腿患之腫硬色白惡寒懶食此脾胃陽氣虛而不能成膿也非敷貼敗毒所能療遂用托裡散及葱熨法月餘患處脹痛發熱膿成針之膿出而安仍用托裡散肢體漸健因飲食內傷泄瀉忽口噤目閉自汗手冷此脾胃虛寒之惡症也以異功散內用人參一兩乾薑一錢半灌之盡劑而甦又以托裡散內用人參五錢數劑始能動履却用托裡散大補湯葱熨法豆豉餅半載而愈

一小兒十五歲早喪天真日晡發熱遍身作痛或四