

幼科證治準繩集之四

心部二

金壇王肯堂序泰甫輯

痘瘡

上

源流

錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月卽穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汞粉下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒藏中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲

作之時熱動五藏則五藏之證先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮頰赤燥咳嗽噴嚏此五藏證但見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤顴頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五藏毒若出歸一證肝水痘肺膿痘心爲癰脾爲疹腎雖無證其候惡者瘡變倒點性黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也 東垣曰癰疹始出之證必先見面燥顛赤目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏是稍冷多睡睡驚並瘡疹

證或生膿泡大癰或生小紅癰或生癰疹此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上諸證太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癰證皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生化之源非五行也非水亦非火此天地之異

血海始淨一日二日精勝其血則爲男子三日四日

五日血脉已旺精不勝血則爲女子乃二物相搏長  
先身生謂之 又謂之精其子在 十月之間隨

母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑渴  
皆隨母血兒躋百長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月  
降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復  
歸命門胞中僻於一隅隱伏而不發直至兒因內傷  
乳食濕熱之氣下陷合於腎中二火交攻榮氣不從  
逆於肉理惡血乃發諸癥疹皆由於腎水其瘍後聚  
肉理歸於陽明故三番癰始顯之證皆足太陽主膀  
胱胱丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱

化爲膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也 萬氏曰痘疹之原有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者靡有定論將謂穢毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病邪何以自少至老但作一度厥後再無傳染也蓋父母於子一體而分精血之毒已畜於陽施陰化之始固不待誕生之頃孽其血而後有 ■也况男子惜其氣以養其精女子耗其氣以養其血 ■失所養卽貽他日之患子之受於父母者雖殊其爲毒則一也

豈有男子淫火起於氣爲陽毒而易治女子淫火起於血爲陰毒而難治之理邪至於天行正病亦有其時但觀夫年之所加及有四時不正之氣卽知有是正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或累而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉痘爲胎毒昭昭矣其間或疎而輕或密而重或重變輕或輕變重變化叵測是又有說也疎而輕者始終如一密而重者變恆百出或因父母相傳而然或因疫癘染而然或因鬼疰相著而然杳冥恍惚出於聞見

慮之所不及此與智者道之癡人前不必說夢也何  
者蓋痘疹之毒父母原自有之雖常作過一番而臟  
腑經絡皮毛肌肉骨髓之間餘毒猶有存者一旦分  
形化氣注之於子其毒亦隨之洩矣所以子之瘡痏  
多肖親也加之調攝失宜放恣無忌其毒益甚瘡痏  
之候沉困危篤者未必非父母之所致也凡子之侏  
儒跛躄必肖於親况疹痘之毒乎且人受天地之氣  
以生天地之氣變人之氣亦變或遇遷正失守淫勝  
鬱復之紀德令乖常害竒迭見自然厲氣傳染證候  
相似所以輕則俱輕重則俱重若有主之者是則疫

癘之所爲也故人之癘疾而死者精靈不散游兎往來隨氣而行常以其氣生於平人而爲之疾如療癩之傳染然形質龐厚福澤悠遠者不能相及苟體虛福薄之人陰陽舛亂之歲則膏肓之堅臺駘之祟互相染著反復變化術不能禁工不能治也此非鬼疰之害乎夫治此三者當奈何曰必爲之豫解其毒乎其氣遷其處庶乎可免矣按痘疹之發顯是天行時氣壘市村落互相傳染輕則俱輕重則俱重雖有異於衆者十之一二而已豈可槩謂胎毒哉然疫癘終身不染者比比皆是而痘疹無一入得免疫一

染之後不能保其不再染而痘瘡一發不再發則胎  
毒之說又何可盡廢乎至謂淫火穢血古亦有之而  
何獨無痘疹之患欲以破胎毒之說則又不然天下  
之無而忽有者多矣草有名虞美人者虞美人項王  
寵姬也爲項王死世哀之爲之歌對草倚聲悽慟而  
草輒搖草無情識也方其未有楚則寵姬亦無况有  
草耶一切衆生妄顛倒而成三界女之又何疑乎

痘疹

預防

萬痘瘡之病皆由父母胎毒畜於命門之中命門者

右腎相火也爲人身生化之本故毒藏焉如遇冬人溫和陽氣暴洩人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒迺發發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬溫卽當預防宜服解毒之藥如辰砂散三豆湯代天宣化丸皆可用也頻頻與之使瘡疹之毒輕減自然易出易收無陷伏鬱遏留連之患 其辰砂散三豆湯代天宣化丸以解時行疫癘之毒則可或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱之時別臟形證發見者並宜兼而治之不可徒恃解毒而竟忘其本也如脾素弱者宜以養脾爲重解

毒欠之養脾丸服三云之二解毒三之一如因父母奉  
養過厚精血畜毒素多胎病者宜二毒併解以通源  
解毒湯代天宣化丸相間服之 丹溪云痘初出  
時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少  
重者令輕以絲瓜近蒂參寸連皮子燒灰存性爲末  
沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

三豆湯

赤小豆

小甘草

參兩  
生剉

黑大豆

菉豆

各壹升生

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升

如無用長流水代之煮

豆熟爲度去甘草將豆曬乾又入汁再浸再曬汁盡爲度逐日取豆水煮任意食之

代天宣化丸

卽韓氏五瘟丹加減也

人中黃

屬土甲巳年爲君

黃芩

屬金乙未年爲君

黃柏

屬水丙辛年爲君

紫蘇葉

梔子仁

屬木丁壬年爲君

黃連

屬火癸丑年爲君

苦參

屬水丙午年爲君

荆芥穗

佐

防風

去蘆佐

連翹

酒洗佐

山豆根

佐

牛蒡子

酒淘炒佐

紫蘇葉

佐

先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣爲君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三於冬至日修合候未取雪水煮升麻和竹瀝調神

麵爲丸外用辰砂雄黃爲衣每服竹葉湯下  
製人中黃法取甘草大者不拘多少用新竹一節  
納甘草於中仍緊塞無節空處放屎缸中浸七七  
日取出曬乾聽用

溯源解毒湯

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

連翹

黃連

生甘草

陳皮

木通

各等分

右剉細加淡竹葉拾片水一盞煎半盞去渣溫服

無時

養脾丸

人參

白术

當歸

川芎

各壹錢半

木香

青皮

黃連

陳皮

各壹錢

砂仁

山楂肉

神麴

炒各

麥芽

伍分炒各

右爲細末水調神麴糊丸如麻子大每服三五十丸陳倉米飲下

消瘟丹

未曾出痘及臨出者宜擇療病日預服

辰砂

研爲極細末水飛過週歲以下伍陸分一歲以上者服壹錢

絲瓜

近蒂者參寸燒存性爲末亦如前數

右用蜜調下或將鴿子及鳩煮熟以辰砂搽上令兒服之亦可屢試有驗

祕傳保嬰丹

真紫草

去蘆酒洗勿犯鐵器

纏豆藤

燒灰存性各肆

二味爲君

升麻

取新者鹽水炒引

荆芥穗

下不使侵肺氣

川防風

及又去蘆

真天竹穗

去梗

牛蒡子

炒各貳兩

四味爲臣

蟾酥

自取勿用赤眼者

真牛黃

三味各貳錢

分一

大朱砂

麻黃紫草荔枝殼煮過就將其湯飛研取淨末參錢

甘草梢

去皮貳兩和

四味爲佐

亦小豆

黑小豆

綠豆

各肆拾玖粒炒勿  
令焦三味爲使

右各取細末和勻另用紫草參兩入水參碗煎去  
查熬成膏半碗入生砂糖半碗和劑爲丸如芡實  
大另用飛過朱砂爲衣未出痘之先濃煎甘草湯  
每服小兒磨一丸大人二丸如已發熱之時生薑  
湯磨服厚蓋取汗多者可少少者可無大有神効  
袁氏痘前治法凡欲治痘須在未發之先預識其證  
而分別用藥重者可輕輕者必愈但未痘而愈則醫  
者無功故多不肯盡心及其旣發又無及矣仁者須  
以救生保嬰爲心寧我無功不可使嬰兒失命備陳

十八證治法於後

孩兒未痘之先感冒風邪身中火烙頭痛自汗咳嗽  
不已傷寒未愈而痘隨出焉痘家謂之猿猴跳鎖傷  
寒之後元氣虛漓須滋陰補血解熱疎風有滋陰三  
寶散可服

滋陰三寶散

當歸

黃耆

生地

白茯苓

芍藥

川芎

橘紅

甘草

防風

玄參

麥門冬二味  
加倍