

證因脈治目錄

卷三

腫脹

黃疸

三消

不得卧

痿症

筋攣

痺症

痿軟

症因脉治卷之三

雲間秦昌遇景明甫纂著

從孫 之楨皇士重輯 男 堂周明甫

及門 陳 仁弘九甫

全較

唐 鏐舒霞甫

雯紋石甫

同學 顧昌朝珮聲甫

施 霖葆文甫叅訂

施 霖字瞻甫

鎬象三甫

腫脹摠論

秦子曰。腫症在表者多。脹症在表者少。腫症腫於遍身。現於皮膚。在外不在內。脹症脹於心腹。卽內經所

謂心腹滿。旦食不能暮食也。是以其症當分。其治當別。然經絡同者。症形治法亦無不同。例如外感之腫。與外感之脹。二者固自各異。至內傷五臟之腫。與內傷五臟之脹。則形症治法大抵相似。今分列前後。以脩互相參考。

○外感腫症

風寒腫

濕熱腫
寒濕腫
燥火腫

黃汗腫

○風寒腫

風寒身腫之症。惡寒身熱。身首皆腫。風勝多汗。寒勝無汗。此外感風寒。卽金匱風水。皮水。從太陽經主治之症也。

風寒身腫之因。表氣素虛。肺氣素熱。表氣虛則外邪易入。肺氣熱則皮毛易開。寒襲於肌表。鬱而不散。則發熱身腫之症作矣。

風寒身腫之脉。多見浮大。或見浮數。或見浮緊。浮緩爲風。浮緊爲寒。浮數爲熱。

風寒身腫之治。浮緩散風。浮緊散寒。仲景防己黃芪湯。治風者也。甘草麻黃湯。杏子湯。散寒者也。越婢湯。桂枝芍藥湯。和榮衛者也。大腹皮散。木香丸等。和裏氣者也。若風入肺經。兼喘咳。瀉白散加防風。寒入肺經。而發熱喘咳者。瀉白散加麻黃。

防已黃芪湯

防已 黃芪 甘草 白朮

右用七錢加姜棗煎服以綿被回腰微汗爲度潔

古用此湯調五苓散

金匱甘草麻黃湯

甘草 麻黃

全杏子湯

麻黃 杏子 甘草

越婢湯

麻黃 石膏 生姜 大棗 甘草

桂枝芍藥湯

桂枝 白芍藥 甘草

大腹皮散

青皮 桑皮 枳榔 川芎 羌活 大腹皮

防已

木香丸

木香 五錢 枳榔 五錢 二味同研水爲丸

朱砂 五分 爲衣

瀉白散

桑白皮 地骨皮 甘草

風加防風 寒加羌活麻黃

○寒濕腫

寒濕身腫之症。身重身痛。足脛冷。胸滿悶。遍身腫。此寒濕腫之症也。

寒濕身腫之因。或時令陰雨。天氣寒冷。或居處陰濕。陰寒之氣。襲于肌表。或因汗出遇水。水寒所傷。則寒濕腫之症成矣。

寒濕身腫之脉。脉多沉小。或見沉遲。或見沉濡。

寒濕身腫之治。惡寒身痛。先宜溫經散濕。冬月麻黃桂枝湯。餘月羌獨敗毒散。濕氣壅滯者。勝濕湯。肺

經傷濕。喘咳水腫。導水茯苓湯。

麻黃桂枝湯

麻黃 桂枝 白芍藥 甘草

羌獨敗毒散 見後濕熱痿

羌活勝濕湯 見後濕熱腫

導水茯苓湯 原文治遍身腫。喘滿倚息。不能轉身。
飲食不下。小便溺出如割而少。如黑豆汁。

麥冬 澤瀉 白朮 紫蘇 陳皮 赤茯苓

柴胡 枳榔 木瓜 砂仁 木香 桑白皮

大腹皮

○濕熱腫

濕熱身腫之症。身熱目黃。小便赤澀。胸腹脹悶。四肢黃腫。口渴心煩。此濕熱作腫。卽陽水腫之症也。

濕熱身腫之因。或濕熱行令。襲人肌表。或先傷於濕。濕氣久留。鬱而成熱。則濕熱腫症作矣。

濕熱身腫之脉。脉多洪數。或見沉滑。或見促結。或見實大。濕熱太甚。脉反沉伏。

濕熱身腫之治。宜清金利水。金清則小便利。而濕熱除。清肺飲合四苓散。二便俱閉。八正散。下部腫。二妙丸。濕熱在表者。羌活勝濕湯。

清肺飲

骨皮 桔梗 甘草 黃芩 桑白皮

四苓散 卽五苓散去桂枝

八正散 見後濕熱腹脹

二妙丸 見後濕熱痿

羌活勝濕湯 治濕熱在表宜汗之症

防風 羌活 柴胡 白芷 川芎 蒼朮

黃芩

○燥火腫

燥火身腫之症。喘促氣急。兩脇刺痛。身面浮腫。煩躁

不得卧。唇口乾燥。小便赤澀。卽河澗燥傷肺氣。節
齋先喘後腫之症也。

燥火身腫之因。時值燥令。燥火刑金。絕水之源。肺氣
焦滿。清化不行。小水不利。氣道閉塞。而燥火腫症
作矣。

燥火身腫之脉。或見浮數。燥傷於表。或見沉數。燥傷
於裏。或見躁疾。燥傷於血。或見洪數。燥傷於氣。

燥火身腫之治。若時令秋燥。竹葉白虎湯。燥傷於血。
清涼飲子。有咳嗽。石羔瀉白散。

竹葉石羔湯

竹葉 石羔 桔梗 木通 薄荷 甘草

咳嗽加桑白皮地骨皮

清涼飲子

黃芩 黃連 薄荷 玄參 當歸 芍藥

甘草 山梔 牡丹皮

石羔瀉白散

石羔 知母 桔梗 甘草 桑白皮 地骨皮

○黃汗腫

黃汗身腫之症。身熱胸滿。四肢黃腫而渴。狀如風水。汗出沾衣。色如栢汁。久不愈。必致癰膿。又有不惡

風。小便利。若上焦寒。口多涎。身冷腫痛。狀如周痺。胸中窒。不能食。又有兩脛不冷。反發熱。名歷節。食已汗出。常見盜汗。汗出不涼。反發熱。久久必甲錯。生惡瘡。身瞶瞶。胸中痛。劇者不能食。身疼重煩躁。小便不利。皆黃汗腫症也。

黃汗身腫之因。以汗出入水。水邪內侵。或汗出當風。汗與水皆寒濕之氣。內結鬱久。則成熱成黃。而黃汗腫之症作矣。

黃汗身腫之脈。其脈自沉。或多沉遲。陽症陰脈。故用桂枝。

黃汗身腫之治。金匱以身腫發熱。汗出而渴。狀如風
脚。用黃芪芍藥桂酒湯。兩脰不冷。反發熱。名歷
節。食已汗出。暮盜汗。汗出反發熱者。用桂枝加黃
芪湯。

黃芪芍藥桂酒湯

黃芪 桂枝 白芍藥

右三味以苦酒煮如怕煩心以美酒易苦酒

桂枝加黃芪湯

桂枝 芍藥 生姜 黃芪 大棗 生甘草

楨按金匱治黃汗症。一曰身體痛。發熱汗出而渴。

汗出色如蘖汁。脉自沉者。黃芪芍藥桂酒湯。一曰黃汗之症。兩脛自冷。假令反發熱。此風寒歷於肢節而痛。名曰歷節。又食已。胃火勞動而汗出。暮夜則營分有虛熱而盜汗。然既汗出。則宜身涼。今因水邪內結不散。故反發熱。熱久汗多。則皮膚之陰血爲熱所爍。爲汗所耗。久久必甲錯。若再熱。營氣熱。肘必生惡瘡。若身重。汗出輒輕。旋又復重。則汗雖出發熱不減。身重不除。久久內氣必虛。肌肉瞶瞶而動。內虛中氣不得運。則胸中痛。元氣上下不貫。則腰上有汗。下無汗。腰臑弛痛。如有物在皮膚

中而不和順。劇者不能食。疼痛煩躁。小便不利。桂枝加黃芪湯。按前一症。以汗出不固。水邪入營。鬱而發熱。熱甚則發黃而渴。故以桂枝和營。以苦酒引入血分。散其水寒。則熱自退。脉不沉矣。但衛虛不宜多汗。故用黃芪之力實衛耳。後一症。卽桂枝原方。加生姜大棗甘草。又飲熱粥以助胃得汗。其加黃芪實表固衛者何故。蓋治脉浮發熱。汗多熱不退之症。不得不用桂枝。以其多汗盜汗。又不得不用黃芪。此症因水寒之邪。盤結不散。汗雖出而熱不減。正所云汗出而邪不出者。故仲景於桂枝

散表方中。重加黃芪。佐以大棗甘草生姜。和其胃氣。同功衛外。使其邪出而汗不出也。仲景以黃汗列之水氣門。不入黃疸症中。宇泰又以黃汗爲黃疸之首。而水腫門畧註一條。此亦互相發明之意。然又有分別。汗出染衣。遍身無腫。乃黃疸症中黃汗。卽準繩所云黃汗也。黃汗染衣。發熱脛冷。卽仲景黃芪芍藥桂酒湯。所治之黃汗也。黃汗染衣。若脛不冷。反發熱。卽仲景桂枝加黃芪湯所治之歷節也。二症有腫不腫之分。故有水腫黃疸之別。水寒之邪。內結脈沉。當同傷寒例。太陽發熱多汗之