

亥21

9-1<2.

證方目錄

虛證

四方

裏實證

十九方

表寒裏熱證 三方

表熱裏寒證 一方

麻黃杏仁甘草石膏湯
桂枝二越婢一湯

通脈四逆湯

青龍

甘草乳姜

芍藥甘草附子湯

芍藥甘草

小建中

梔子厚朴

梔子乳姜

梔子香豉

梔子甘草香豉

梔子生薑香豉

瓜蒂散

抵當湯

凡

梔核承氣

大陷胸湯

小陷胸湯

大黃連瀉心

附子瀉心

十棗

大承氣

小承氣

調胃承

氣諸湯

麻仁凡

醫學摘粹

謝啓華拜題

傷寒十六證類方



裏虛證

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾燥煩吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯其腳卽伸問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讞語師言夜半手足當溫兩腳當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也

厥逆咽中乾煩燥陽明內結讖語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當溫脛尚微拘急重與甘草芍藥湯爾乃脛伸以承氣湯微瀉則止其讖語故知病可愈發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先用小建中湯嘔家不可與建中湯以甜故也傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

按以上諸證或誤汗傷陽或誤汗傷陰或汗後陰陽並傷或木尅土而中氣被傷均可謂之虛證也故以

裏虛證統之

甘草乾薑湯

甘草

四錢

乾薑

二錢

水煎服

按發汗重亡其陽裏實變而為裏虛故用

甘草培土而補中乾薑溫胃而降逆也

芍藥甘草湯

芍藥

四錢

甘草

四錢

水煎服

按汗出傷陰木燥筋縮故用甘草舒筋而

緩急芍藥清風而潤燥也

醫

卷二

傷寒十六證類方

二



芍藥甘草附子湯

芍藥 三錢

甘草

三錢

附子

一錢

水煎服

按汗泄血中溫氣木鬱而陽陷故用芍藥

清風而斂營血甘草培土而榮木氣附子煖水以補

溫氣也

小建中湯

芍藥

六錢

桂枝

三錢

甘草

二錢

生薑

三錢

膠飴

大棗

四枚

水煎服

按肝膽合邪風火鬱發中氣被賊勢難延



緩故用膠飴甘棗補脾精而緩急痛薑桂芍藥達木
鬱而清風火也

裏實證

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚樸湯主之

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯

主之 發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

懊懣者梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之

若嘔者梔子生薑豉湯主之 凡用梔子湯病人舊微

溘者不可與之 陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而

喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤

反讖語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中

空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣飢不

能食但頭汗出者梔子豉湯主之 下利後更煩按之

心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯 病如桂枝證頭不

痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息此

爲胸中有寒也當吐之宜瓜蒂散 諸亡血家不可與

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩
飢不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散 太陽病
不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者
尚未可攻當先解外外解已但小腹急結者乃可攻之
宜桃核承氣湯 太陽病六七日表證猶存脈微而沉
反不結胸其人如狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便
自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在腹裏
故也抵當湯主之 太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便
不利者爲無血也小便自利其人如狂血證諦也抵當

湯主之 陽明病其人喜忘者必有蓄血所以然者必有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之 病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也宜抵當湯若脈不解而下利不止必協熱而便膿血也 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸 太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫

反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣
煩燥心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸
湯主之 傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按
之石鞭者大陷胸湯主之 太陽病重發汗而復下之
不大便五六日舌上燥而渴日晡時小有潮熱從心下
至少腹硬滿而痛不可近者大陷胸湯主之 傷寒十
餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無
大熱者此謂水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯
主之 傷寒五六日嘔而發熱者柴胡證具而以他藥

下之柴胡證仍在者復與柴胡此雖已下之不爲逆必
蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲
結胸也大陷胸湯主之 結胸者項亦強如柔痙狀下
之則和宜大陷胸丸 小結胸病正在心下按之則痛
脈浮滑者小陷胸湯主之 傷寒大下後復發汗心下
痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解方可攻
痞宜大黃黃連瀉心湯 脈浮而緊而復下之緊反入
裏則作痞按之自濡但氣痞耳心下痞按之濡其脈關
上浮者大黃黃連瀉心湯主之心下痞而復惡寒汗出



者附子瀉心湯主之 太陽中風下利嘔逆表解者乃
可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引
脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十
棗湯主之 二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱熱
汗出大便難而讖語者下之則愈宜大承氣湯 得病
二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖
能食與小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初
頭鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須小便利屎定鞭乃

可攻之宜大承氣湯 傷寒若吐若下後不解不大便
五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見
鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直
視脈弦者生濇者死微者但發熱讖語耳大承氣湯主
之若一服利止後服 汗出讖語者以有燥屎在胃中
此爲風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂
以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯 陽明病下
之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭
後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯 陽明病

識語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也宜大承氣湯下之若能食者但鞭耳 病人小便不利太

便乍難乍易時有微熱喘冒不得臥者有燥屎也宜大

承氣湯 病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時

者此有燥屎故使不大便也 大下後六七日不大便

煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故

也宜大承氣湯 陽明少陽合病必下利其脈不負者

順也負者失也互相尅賊名爲負也脈滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯 發汗不解腹滿痛者急下

之宜大承氣湯 陽明病發熱汗多者急下之宜大承

氣湯 傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證

大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

少

陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

少陰病自利清水色純青心下必痛目乾燥者急下之

宜大承氣湯 少陰病六七日腹脹不大便者急下之

宜大承氣湯 陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必

重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

濇然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若
腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下
太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者
與小承氣湯和之愈 陽明病潮熱大便微鞭者可與
大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥
屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有
燥屎乃可攻之若不轉失氣此但初頭鞭後必溏攻之
必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必
大便復鞭而少也以小承氣和之不轉失氣者慎不可

攻也 陽明病讖語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主

之因與承氣一升腹中轉失氣更服一升若不轉失氣

勿更與之明日不大便脈反微濇者裏虛也爲難治不

可更與承氣湯也 下利讖語者有燥屎也宜小承氣

湯 太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但

陽脈微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下

之宜調胃承氣湯 發汗後惡寒者虛故也不惡寒反

惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯 傷寒若胃氣

不和讖語者少與調胃承氣湯 太陽病三日發汗不

