

全幼對症錄（對症用藥賦）二


图书在版编目 (CIP) 数据

全幼对症录/ (明) 刘汉儒著.-北京: 中医古籍出版社,
2002.7

ISBN 7-80174-022-X

I. 全… II. 刘… III. 中医儿科学-中国-明代
IV. R272

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第072701号



補肺散

又名阿膠散治肺虛咳嗽氣急肺無津液

阿膠

兩半
炒香
分
炒香
馬兜莢
一錢
一錢
炙

杏仁

七箇
去皮
糯米
一兩

右為末每服一二錢水一盞煎六分食後溫服

亨蘆丸

治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰身熱喘促

甜亨蘆

去土於銚中
禹帝累炒
黑牽牛
炒熟
分
碎杏仁
湯去皮
尖双仁

右為末研入杏膏拌勻取蒸陳棗肉和再搗為劑丸為
麻子大每服五丸至七丸淡姜湯下乳食後或夜服量
大小加減服之

膽星散

膽星

五錢

青黛

玄

三錢

甜硝

二錢

甘草末

一錢

辰砂

三錢

右爲末每服量兒大小用生姜湯調下

一方

玄胡索五錢 姜黃五錢 甘草一錢 天花粉四錢

右爲細末每服一錢量兒大小加減用淡盞湯調下食

前服

積

論附癥痞

論曰食者人之本飲食五味雖能養生亦能害生是以僻語云棄口物多終作積小兒但知飲食不知飽足或食飽傷脾或無外濕也或不避寒暑以致而成積也夫積者有

五積六聚七癥八癰痞癰癰瘡瘍皆總名為積也經云積者
五臟所生以此難治聚者六腑所成以此易治隨其陰陽
氣血四時感得則知何臟腑受積以何藥觸除或磨或取
或針或灸勿傷脾胃勿動元氣斯可謂之良工矣况小兒
有積腸胃脆軟不可用烈毒之藥攻擊久則脾虛飲食減
少或吐或痢變生他証取積之法調脾和胃緩急次序攻
之切勿失其胃氣有因下積傷脾反生潮熱脾虛生氣因
茲敗腫者戒之慎之

三稜煎丸

治嬰孩小兒食傷生冷粘膩熱物等毒脾胃

積滯久不尅化令兒肚熱脚冷痞瘡寒熱反

療癥瘕中脘不和膨脹上膈氣壅心腹不得宣通所以作疾此藥溫良但是諸疾積滯並宜服之

京三稜 蓬莪术

並燒各一兩 芫花一分 鱗甲去裙米醋炙半兩

淡豆豉二錢 巴豆二十粒去殼

當歸五錢去皮尖炒 杏仁二錢

右前六味一處以米醋一碗煮乾就炒為末次入當歸末又入杏仁巴豆和勻水糊為丸如麻子大每服二十丸姜湯送下大小加減服之

木香化滯丸 治小兒宿食不散消心腹痛脹止呕壯熱

木香五錢 青橘皮六個 楠柏六個 补骨脂一兩

黑草牛

取末二兩

右五味搗羅為末滴水為丸如黃米大每服二三十丸
溫水送下不拘時服

五色丸 治小兒諸般積滯驚風

青丸 青黛 南星各五錢
巴豆霜半錢 紅丸

硃砂 半夏各五錢 巴豆霜半錢 白丸 白附子

寒水石 煅五錢 巴豆霜半錢 黃丸 大黃

麝金各五錢 巴豆霜半錢 黑丸 五靈脂

全蝎各五錢 巴豆霜半錢

右各為末麵糊為丸如黍米大每服五七丸姜湯下急

風薄苛湯下慢驚全蝎姜桑湯下

褐丸子 治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心腹脹

滿嘔逆氣痞急或脇鳴泄瀉頻併腹中冷氣痛

食癥乳癖痞氣痞積聚腸胃或秘或利頭面浮

滿不思乳食及療五種痞氣八種痢疾肌肉消

瘦氣粗腹大神色昏憤情意不樂當服散冷熱

氣調和臟腑去疳積止瀉痢進乳食生肌肉悅

顏色功效非常不能縷述

蘿蔔子

二兩微炒

陳皮去白

青皮去白皮六錢

黑牽牛

一兩半生半熟半

京三棱炮一

蓬莪术炮一兩

胡椒一錢

木香一分

砂仁六錢

一方加胡黃連半兩苦練

子一兩

蘿蔔子只用一兩

右為細末麵糊為丸如麻子大每服三十九蘿蔔子

湯送下

搗脾散 治小兒脾積立効

海蛤粉 黃丹

舶上硫黃各等分

右初伏日修合為末用好米醋調成膏攤於新烏盆內
晒乾研為細末一歲兒服一分空心米湯調下取出脾

穢如藍汁為驗

進食丸 治積氣乳癰痃痞食癥

木香 桀殼炒當歸 代赭石三錢 射香半錢

硃砂三錢 巴豆一錢去油

右為末麵糊丸如米大一歲二三丸大小加減服此藥
久利有積不除或多壯熱或疳積肚疼常服消食永無
食痞之積余常用功不可盡述

二稜散 治小兒溺白者由乳哺失節過傷於脾故使清
濁不分而白也久則成疳宜疎脾土消食化氣

滯亦治疳積肚疼

荆三稜炮切 義朮炮切各半兩 益智子去壳一兩

甘草炒半兩 神曲炒一錢半兩 橘紅各半兩

右為細末每服空心米飲調下一錢

消食丸 又名消乳丸治傷食脾胃不和

香附子二兩 縮砂仁一兩 橘皮 甘草炒

神曲炒 三稜炒 麥蘖炒 義术炒各半兩

右末化蒸餅為丸如黍米大食後溫水下一錢十九大
小加減之

異香散 治積氣心腹疼痛

蓬术 三稜 青皮 陳皮 蔟香 砂仁 甘草
香附 木香 官桂 桔梗 益智

右㕮咀姜棗煎不拘時服

枳實湯 治小兒傷食腹脹大便不通

枳實一厚朴各三錢 大黃五錢 官桂二錢

甘草一錢

右㕮咀生姜煎不拘時服

九聖丸 治小兒傷食積痞肚腹痛手足面目浮腫

京三棱 蓬莪术 川練子 青皮 陳皮

芫花

先用醋浸一宿炒乾入三棱蓬术
炒赤色入青陳皮川練微炒等分

杏仁

五錢去皮
尖另研

右末入巴豆二十一粒去油同杏仁另為泥入前件研
勻麪糊為丸如黍米大一歲常服二九臨睡熟水下二
十丸所食之物一夜而化永無疳疾停滯之患也

紅丸子 治血膜包心僻側於脣旁時時作痛發熱瘡家

中脘多蓄黃水日久結癧亦効

三稜

蓬莪术 芫花 桃仁

去皮尖另研

杏仁

去皮尖另研

烏藥

取心培乾

硃砂 研為衣巴豆

右為細末醋糊丸如菉豆大硃砂采湯下

萬金丸 磨積去黃辨

白术

陳皮 厚朴

姜梨甘草 夜明沙

炒

針砂

醋淬炒

綠藜化水煮糊為丸或煮藜肉為丸如菉豆大每服五

十九空心米飲送下

治癬丹

用鉄脚威靈仙不拘多少為細末煉蜜丸如彈大紅綃
袋盛藥一丸同猪猪肉一塊煮肉熟去藥令食肉

雄黃丸 治癬積痰嗽嘔吐

雄黃

五錢另研

半夏末

一兩另研

神曲末

一兩炒

巴豆

四十九粒另研

白麪

一兩

右和勻滴水為丸如棗豆大用米糠炒赤色每服七丸
加至十丸嘔吐姜湯下痰嗽壅水下不拘時

膽礬丸 治癬消癬進食止瀉和胃追蟲

保礬

須升者

膽礬

真者一

大棗

四十箇去核

好醋

一升

已上四味同熬令棗爛和後藥

史君子二兩
去皮 枳實三兩
去皮 黃連一兩

荊黎勃三十粒
去皮膜另研 一兩

巴豆

二十七粒
去皮膜另研

已上五味同炒令紫色

夜明沙

存性三分
一兩

練根皮末五錢

又已上三味同史君子等為細末用前棗肉膏和劑量
稀稠未成旋入棗肉亦不可多恐服之難化大稠即入
溫水可丸如菉豆大每服二三十丸米飲湯下溫水亦
可不拘時服

楊氏換榔丸

雞心換榔 鶴虱 貫衆 蕪荑 川練子肉

史君子肉

雷丸

雄黃 乾漆

存性

輕粉

巴豆

去油壳

木香 黃丹

煅錫灰炒不見星如灰

右為末酒煮麪糊丸以五更用豬肉葱油煎將肉細嚼
莫吞引頭向上便用肉汁調化虫散吞下換榔丸至已
時取下虫方可飲食

化虫散

雷丸二錢 史君子十箇 鶴虱一錢 生大黃一錢

甘草一錢

右為細末肉汁調下

胡黃連丸

胡黃連

五錢阿魏一兩五錢
醋浸

神麌炒三兩

黃連炒二兩

射香

四粒

沉香阿魏丸

治一切積氣心腹脹痛脾胃不和

沉香

一兩

木香二兩阿魏一兩
醋浸

查肉三兩白术二兩

陳皮一兩連翹一兩枳實

一兩炒厚朴七錢半
姜汁拌

半夏麵一兩

黃連

一兩

半炒三稜一兩
醋煮

蓬术一兩青皮一兩
醋煮

香附一兩
醋煮

砂仁一兩

右為細末用神麌糊為丸如桐子大每服八十九空心

白湯送下