

新刊西學集成

醫學集成卷之六

後學 義烏 傅滋 續註

○ 癆瘵三十七

脉法

平人牀大為勞極虛為勞浮大為裡虛脉虛弱沉弦
無寒熱短氣裡急小便不利面色白時目瞋喜衄諸
乾動微緊男子失精女子夢交脉小遲名脫氣如咳
行則喘手足寒腹滿甚則溏泄食不消脉弦而大
則為乾弦則為減女子漏下男子失精脉微弱而澀
為無子脉舉之而滑按之而微者在何部以知其病

脉輕手則滑重按則平者在何經而辨其府寸弱而微者上虛尺弱滑而濇下虛尺滑而濇疾為血虛脉數骨肉相失聲散嘔血陽事不禁晝涼夜熱者死

丹溪云陰虛之極痰與血病有有虫者其傳尸一證不可云無其病俗名傳尸雖多種不同其病與前人相似大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聾或腹中有塊或腦後兩邊有小核數箇或聚或散沈沈默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或後下利蟲瘦困乏不自勝持證雖不同其根多有虫嚙心肺一也

王節齋云人若色慾過勞傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽痰涎無力飲食少進甚則交經帶血咯吐血或咳嗽吐血或血身熱燥渴甚則交經帶血消痰此各勞察最難調治輕者用藥數十貼重者期以歲年然必須病人變命聖心定志艱旁室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無効也此病治之於早則易痊若到肌肉燒燥沈困著味則難為矣

大法

四物湯加人尿竹瀝姜汁或加參朮

一方

青蒿一斗五升童便三斗文武大熬約童便減二斗

去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇

又長砂故即末

熬數沸

以甘草末收之用湯調服

氣血虛甚發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之

身瘦屬火因火燒燂故也。白蠟磨治瘰癧

不治證

不受補者肉脫甚者

附方

癆瘵方

雜著

當歸

芍藥 各一錢 三分

川芎

熟地黄 各一錢

黃柏 酒炒 七分 知母 酒炒 一錢

生地

酒洗 五分 甘草 炙 五分

天門冬 去心 一錢

白朮 三分

陳皮

七分 乾姜 炒 三分

生薑 三片

水煎服咳嗽加桑白

皮塊令瓜蒌仁各七分五味七粒痰加姜製半夏貝

母瓜蒌仁各一錢盜汗加牡蠣酸棗仁各七分浮葵

一撮剉熟加桑白皮沙參地骨皮各七分麋道精

加牡蠣龍骨

另末綿裹入

山茱萸各七分赤白濁加白茯苓

苓一錢炒連三分衄血咳血出於肺也加桑白皮一

錢黃芩山梔炒各五分嗽血痰血出於脾也加桑白

皮貝母黃連瓜蒌仁各七分嘔吐血出於胃也加山

施黃連乾葛蒲黃炒各一錢韭汁半酒蜜姜汁少許

咯嘔血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢若

先見血證或吐衄甚者宜先治血輕者涼血止血盛

者先消瘀血次止血涼血蓋血未多必有瘀停於胸

膈者不先消化之即止之涼之不應也葛可久方可

次第檢用唯獨參湯止可用於大吐血後昏倦脉微
細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬若陰虛火
動潮熱盜汁咳嗽脉數者不可用也且此病大忌服
人參若服過多者亦難治此病屬火太熾多燥然須
節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀澀則前項
寒涼之藥難用矣急宜調理脾胃用二陳加白朮麥
芽等藥俟胃氣復然後用本病藥收功保後宜常服
補陰丸

二方

治傳尸癘瘵寒熱交攻久嗽咯血先以三拗湯

次以蓮心散

不可久方

黃石甘草

生炙

為細末入冰片少許吹之

如嘔止咯嗽血者先以十灰散過住甚者以花柳石
散止之止後其人必倦用獨參湯補之後服他藥保
和湯止嗽清肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痰
消化丸下痰消氣加減法具各方之下服藥之法每
日仍濃煎消苛湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐
徐嚥下次嚼一丸緩上溶化至上床時亦如此用之
夜則肺竅開藥必流入竅中如痰壅却先用錫糖拌
消化丸一百丸吞之次又依前嚼嚥太平丸令其作

卧服前七藥後若有嗽可煮潤肺丸食之服前藥有
暇煮此七藥服之亦續煮白鳳膏食之固其根本
後服十珍丸以收功也

十灰散

治癆證嘔血咯血嗽血先以此過之

大蓟

小蓟

側柏葉

荷葉

茅根

牡丹皮

大黃

槐子

棕灰

等分

百草霜

右各燒灰存性研細出火毒以藕汁或蘿蔔汁磨京
墨半碗調下五錢立止病重出血升斗者亦效

花藥石散

花藥石

煨存性研細

右用童便一盞煎醋調末三錢甚者五錢食後男子

和酒一半婦人和醋一半調下立止其瘀血化為

水後以

獨參湯

人參一兩水二盞棗五枚煎細服之

保和湯

治勞嗽潤肺

知母

貝母

天門冬

麥門冬

款花

三錢

天花粉

薏苡仁

杏仁

錢

五味

粉草

炙

地令

紫苑

百合

桔梗

一錢

阿膠

川歸

生地

紫蘇

薄荷

五分

姜水煎加錫一匙服

保真湯

治勞證骨蒸

當歸

生地黄

熟地黄

人參

白朮

黃芪

赤茯苓

白茯苓

各半兩

天門冬

麥門冬

赤芍

白芍

知母

炒栢

五味

訖胡

地骨

二錢

甘草

陳皮

二錢

蓮心

五分

右姜棗水

煎服

如驚悸加茯神遠志栢子仁酸棗仁淋濁加萆薢烏

藥猪苓澤瀉便澁加水通石韋扁鰲遺精加龍骨牡

蠣蓮須蓮子躁熱加石膏滑石青蒿煎甲盜汗加浮

麥牡蠣麻黃根黃芪

太平丸

治勞證咳嗽肺痿肺癰

天門冬

麥門冬

知母

貝母

欵花

杏仁

二錢

當歸

生地

黃連

阿膠

兩半

蒲黃

京墨

荊芥

蒲荷

各一兩

蜜

四兩

射香

少許

有黃右為末煉蜜九彈子大以蒲荷湯漱喉嚨一丸
津下上床時再服一丸如痰盛先用飴糖拌消化丸

一百丸送下後嚥化仰卧使流入肺竅

消化丸

白茯苓

青礞石

煅法見痰門

橘紅

半夏

姜汁炒各兩半

枳殼

枳實

各一兩

蒲荷

南星

姜炒各八錢

神曲糊丸桐子大飴糖拌吞下

百九次嚼太平丸二藥

潤肺丸

治久嗽肺燥肺痿

羯羊肺

具杏仁

研

柿霜

真酥

各一兩

白蜜

二兩

右先將羊肺淨洗次

將五藥水解薄攪稠粘灌入肺中水煮熟食與前七

藥同服

白鳳膏

治一切虛怯咳嗽吐痰咯血發喘此火乘金

也

鴨

黑紫白者一隻

大京棗

二斤

參苓

平胃散

并

陳酒一大

瓶將鴨縛定腳掛起次量患人隨量傾酒器中盪溫

却刺鴨血入酒中攪勻飲之具血直入肺中補肺止

嗽其鴨上乾搗去毛脇下開二孔取出腸雜用紙拭

乾次將棗去核入參苓平胃散以皮札定填鴨肚砂

毫一箇放鴨在內四圍用炭火慢煨煮酒一瓶作三

次添入以酒乾為度取出食之餘乾隨意食用又以
十珍丸收功

十珍丸

治一切勞證久勞虛憊體乾精涸血枯氣

竭服前藥愈後以此收功

猪脊脊一條羊脊脊一條

團魚

一個烏骨雞一個右四味去骨取肉煮酒一大瓶

於鬘內煮熟搗細再加大山藥五味蓮肉半斤京事

一百个霜柿十个右四味以水一大瓶於沙鬘內煮

熟搗細令均前藥并肉再用慢火熬却下明膠四兩

黃蠟三兩右二味旋下前八味和勻一處研成膏和

平胃散末四君子湯末并知母黃柏末各一两共十

兩搜和成劑如硬再入白蜜同熬取起放青石上用
提匕打如法免如桐子大每一百丸棗湯下服半月
精神完氣血和一月飲食加倍起居輕快二月消除
諸虛百損一切虛憊不可盡述

已上皆見
可久方也

三物湯

治傳尸癆寒熱久嗽客血羸瘦先服此後連

心散萬不失一方見靈門

寧心散

當歸

黃芪

甘草

煎甲

訖胡

前胡

羌活

獨滑

防己

防風

茯苓

半夏

黃苓

陳皮

阿膠

官桂

赤芍

麻黃

杏仁

肉

南星

川芎

各一兩

芫花

酒炒

枳殼

右除芫花每服二錢姜三片棗一枚入芫花一抄水
二小盞半煎至八分服頃吐有異物漸減芫花蓋甘
草所以殺虫炊之所以斷熱去寒

少在此處

調鼎方

治傳尸癆神効

混沌皮

一具醋浸一宿焙干

鱉甲

炙

桔梗

胡黃連

芍藥

大黃

炒

草龍膽

貝母

黃藥子

知母

敗鼓皮心

醋炙各二兩半

犀角

銹上

蓬朮

一个

芒硝

半斤

朱砂

二斤水飛

右為末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十九

空心溫酒下

取勞虫方

三因

桑枝

柳枝

桃枝

梅枝

各七寸

青蒿一握

石櫛皮

右用童便一升半芎白七並去頭葉煎及一半去渣

別入安息香阿魏

各一分

再煎一炷盡去渣調辰砂末

半錢攪即求一分麝香一字分作二服調下五更初

一服三點時一服至巳時必取下虫色紅者可救青

者不治

神授散

三因

治傳尸瘴氣殺虫去毒

川椒

二斤羅去子并合口者炒汗出即乾

為細末米湯下一錢必麻痺

暈悶必傾如不能禁以酒糊丸梧桐子大空心服五