

痧症要法

(七)

增廣  
靈驗方新編

上海錦章圖書局  
印行

痧字字書皆不載右台仙館筆記謂集韻有痧字音蘇疾也痧字或當作瘧痧與瘧乃一音之轉也集韻又有  
瘧字亦云疾也今世有瘧痧之疾或古作瘧瘧歟又說文有疝字注腹中急也廣韻音古巧切與較同音即古  
絞腸痧矣按疝方書云穢氣感觸邪熱而發之病是為今之痧症無疑然古今方書汗牛馬充棟宇論述此症  
者多賾於時疫專言主治者卒是景岳全書雖開一及之未深切著明坊行析微理化全書亦流傳未遍林氏  
築樵痧症要法析理明論症審詳宜忌便施治誠瘧瘧之元龜疝症之指南也夫穢濁之氣閤閤浩穰為尤甚  
望溪之誌陳馭虛也述其言曰京師大畜駢閤食腥葷葷滯偏側溝渠汙滯無大川廣壑以流其惡方春時地  
氣憤盈上達淫雨汎溢炎陽蒸之中人膈臆困懷忿蓄而為厲疫大江以南地益卑濕微雨霜人炎臆敲蒸加  
以射工同影飛絲觸肌燥濕寒暑迭乘為災所謂愀溷鬱邑毆溫致濕中心慘怛生病造熱殆為斯地發矣故  
氓庶熙攘踴躍於塵埃者相屬即竹皮韋帶之土櫛穢觸熱亦往往不免懸壺之客束手莫措進帛布單衣單  
奏其剮摩砭刺之術技工者亦能稍定其營亂而邪氣結轉精神越渫絲縣延延於然不能自振使早以林氏  
是書從事灑練臟腑輸瀉濁已忍然而汗霍然而愈矣此古所以致慨於醫之所病病道少也余雕駘方新  
編竣事又以續編請者因考其字義而兼識此書之有益於南中人士云

光緒癸未五月望合肥張紹棠題於治山之觀魚躍處

凡著述之有裨日用者皆足以傳世行遠而莫切近於醫沙症書尤切近中之切近者也余曩於一切藝術頗未措意乙卯丙辰侍先大父疾兩載粗究醫藥之事既而終天抱恨亦遂置之卒已承乏泉南會沙疫流行夏秋尤劇雖多方拯救十嘗六七不治如皋吳渭泉大兄素精軒岐馳譽日下客秋觀容來閩亟以此症相詢渭泉出閩人林樂樵所著痧症全書見示且云刺藥並施業已行之有成效余按溫疫痧症相為表裏明季吳又可著溫疫論上下卷已收入

欽定四庫全書獨林氏書較晚出未被甄采而實足補吳書所未備因憇患重刊以廣流布他日家置一編按方求治不致倉卒無所措手用仰副

聖天子痼瘼在抱之至意未必非是書之功也鳩工有日渭泉行將去茲士余乃屬諸槐坡重加校勘付諸剞劂以成渭泉之志於其行也祖道城西濡筆而為之序時

道光壬午仲冬上澣福建鹽運使司鹽法道仁和王楚堂識

喉風門十二症

內腫鎖喉風纏喉風

匝舌喉風

虛爛喉風

白色喉風

酒毒喉風

勞碌喉風

酒寒喉風

腫爛喉風

肺寒喉風

辛苦喉風

淡紅喉風

喉癰門十一症

伏寒喉癰

腫爛喉癰

淡白喉癰

大紅喉癰

聲啞喉癰

單喉癰

外症喉癰

雙腮喉癰

舌上癰

舌下癰

上腭癰

舌門十三症

木舌

白腫舌

爛邊舌

紅點紫舌

純紫舌

座舌蓮花

重舌

蓮花舌

焦黃舌

舌上珠

舌下珠

左雀舌

右雀舌

小舌門五症

胃火小舌

胃毒小舌

積熱小舌

純白小舌

懸旗小舌

雜症門八症

松子喉疔

走馬牙疳

喉單

喉菌

喉瘤

又喉瘤

左陰瘡

右陰瘡

張氏湯藥列方

吳氏丹藥列方

咽喉口齒各有專科此書既備二科宜題曰喉齒秘集茲仍其舊者亦名從主人意也

味古齋誌

冊訂痧書序 古無痧字本作沙今俗作痧又省作痧

痧無專書雖古有絞腸痧乾霍亂青筋白虎中惡等症治而禁忌未明剖析未盡千古如在暗室醫家說為怪症稍知推拿焮刮者又禁人服藥迷誤就斃可勝悼哉康熙初林約樵始以痧書授王養吾丙寅刻晰微理化全書未廣流傳乾隆丙午江甯有重梓施送者沈氏尊生書亦已收入而見者亦鮮爰為刪纂開雕較原書詞理簡淨視沈刻眉目清疏中有疊出數見者便于倉猝檢閱對症施治毋嫌煩複也方名原取六十四卦今改八音分紀省字數易記查耳家置一冊庶幾識所忌宜無誤身命倘有同志益廣其傳可也  
嘉慶三年歲次戊午泰興何汾丹流氏誌

附原書正誤一條

醫家不信有痧頭痛則用紫蘇麻黃發汗腹痛則用木香枳實溫中不語直視則認為陰症而用桂附乾薑卒倒脈伏認為中風而用牛黃蘇合小兒則誤作驚風痘疹婦人則誤為經阻血凝立刻殺人可勝惜哉人祇知絞腸痛是痧不知有不肚疼而種種雜症之兼現疑似之間必當詳究也

原叙節錄

吾師林姓其先閩人諱森號藥樵自號深山野人性藹晦有山水癖佳句妙楮時與邱壑爭奇一日過於荆溪之南岳拂石對語片晌投洽徐而叩之凡天文術數地理方藥無不精貫予追隨不忍釋野人曰偉男子立身行己豈得虛生於天地必將世上人維持調護所貴一點真心耳出痧書一冊付予曰予知醫是書不道人所已言不經人所已試持此以往可與古人頡頏霄壤矣既又授我手法予復綜核古今即所聞見編成是書幸得張子一菴詳加訂繹紫崖詹子慨為梓傳二十年來始得相與有成以廣野人之惠澤豈偶然哉康熙丙寅養吾山人王凱偉仙誌

海甯王君諱治行號服吾新建之裔博學多才晚以醫名甲申鼎革老卒于常其子凱號養吾遂家毘陵工詞賦性慷慨博通醫理得林氏傳刻痧書救世近時痧症尤多從此人知治法約樵養吾自當俎豆醫林云

近復得驗方百十條已續纂入書內適李義門先生示以痧書余藏生康訪遺以喉症書皆罕觀之秘因并付梓列為卷九卷十於療治急症不無小補云同治元年夏日海山仙館主人識

卷上

痧原大略第一

痧無補法第二

分經絡第三

看涼熱第四

分表裏第五

審脈第六

論吐下第七

急症第八

緒論第九

手法第十 焯刮刺

救痧十處

用藥大法第十一

藥忌

藥宜

宜忌半

補未列藥

飲食第十二

食忌

食宜

救急小方第十三 試痧法

卷中

痧分症治第十四

風痧

暑痧

陰痧

陽痧

紅痧

斑痧

瀉痧

吐痧

瀉痧即水痧

緊痧

慢痧即白痧

暈痧

絞腸痧

抽筋痧

暗痧

悶痧

落弓痧

噤口痧

撲蛾痧即喉痧

角弓痧附方歌

瘟痧

滿痧

脫腸痧附方

羊毛痧附輓擰法

羊筋痧附挑法

紫疱痧

瘋痧

血沫痧附方

蛔結痧

銅痧即發黃

鐵痧

痧塊

身重痧

心煩嗜睡痧

偏身青筋痧

偏身腫脹痧

痧別兼類變第十五

傷寒兼痧

痧類傷寒

傷風咳嗽痧

咳嗽嘔噦痧

霍亂痧

痧痢

痧類瘧疾

瘧疾兼痧

頭痛痧

心痛痧

腰痛痧

小腹痛痧

頭眩偏痛痧

流火流痰痧

疾喘氣急痧

半身不遂痧

膨脹兼痧

痧變臌脹

老病兼痧

弱症兼痧

內傷兼痧

痧變癆瘵

痧變血衄便紅

痧變發斑

痧小便不通

眼目怪症痧

痧後牙疳

痧後胸膈痛

婦人倒經痧

附胎產痧論

胎前痧痛

產後痧痛

小兒夾驚痧

痘前痧脹

痘後痧脹

瘡症兼痧

痧變腫毒

附痧後調理

卷下

六十四方第十六加總歌

金石

絲竹

土

革

木各八

麻瘋方附竹六

應用羣方第十七

玉樞丹

牛黃八寶丹

仙方腦麝丸

鬱金丸

煉石丹

硫礬丸

附華陀危病方

潤下丸

治胸香櫟丸

大羌活湯

加減聖效散

如聖散

失笑散

普濟消毒飲

祛癰辟瘟丹

白虎湯 竹葉石膏湯

異症方案

加味活命飲

六一散

治腹痛法二

補原本未列方

五苓散加減

胃苓湯

六和湯

藿香正氣散

續附絡痛方案

金鈴子 海浮石 附

續附景岳刮案灸法

痧原大略第一 先吐瀉而心腹絞痛者其痧從穢氣發者多先心腹絞痛腫唇乾鼻燥腹中絞痛足陽明胃

悶痰涎膠結從傷伏熱發者多遍身腫脹痠痛四肢不舉舌強不言從寒無力泄瀉不已足太陰脾經痧

痧無補法第二 痧者屬氣也入氣分則作瘡作瘰入血分則為蓄為瘀遇脹硬足少陰腎經痧咳嗽聲啞

熱酒不論犯者虛實皆以有餘治絕無補法用藥剋削病自當之中病即經痧 半身腫脹廢俛仰右足不

分經絡第三 腰背顛頂連及風府脹痛難忍足太陽膀胱經痧 兩目赤腫唇乾鼻燥腹中絞痛足陽明胃

經痧 脇肋腫脹痛連兩耳足少陽胆經痧 腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已足太陰脾經痧

心胸吊痛身重難移作腫作脹足厥陰肝經痧 痛連腰腎外腎也小腹脹硬足少陰腎經痧 咳嗽聲啞

氣逆發噎手太陰肺經痧 半身疼痛麻木左足不能屈伸手太陽小腸經痧 半身腫脹廢俛仰右足不

能屈伸手陽明大腸經痧 病重昏沉或狂言不省人事手少陰心經痧 或醒或寐或獨語一二句手厥

陰心包絡經痧 胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極手太陽三焦經痧

按十二經受病見症隨症施治其引經藥亦不可少今通列手足經脉後

手少陰心循手小指內側出其端 手太陽小腸起手小指端循外側上行 手少陽三焦起手無名指端

手厥陰心包絡又名手心主出中指端 手陽明大腸起手食指端 手太陰肺出手大指端 足厥陰肝起

足大指繆毛上 足太陰脾起足大指端 足陽明胃起足次指外間又一支亦入大指端又一支入中指外

間 足少陽胆起足四指間 足太陽膀胱起足小指外側端 足少陰腎起足小指下

閱此便於針刺

足太陽  
手太陽  
膀胱  
小腸

陽明  
胃  
大腸

少陽  
膽  
三焦

足少陰  
手少陰  
腎  
心

太陰  
脾  
肺

厥陰  
肝  
心胞絡

足太陽膀胱榮木 黃柏

足少陽胆

手太陽小腸榮木 黃柏

足厥陰肝榮木 黃柏

足陽明胃石膏 沈作厚 朴

手少陽三焦沈有丹皮

手陽明大腸石膏 沈作厚 朴

手厥陰心胞絡

足太陰脾石膏 沈作厚 朴

手太陰肺石膏 沈作厚 朴

足少陰腎石膏 沈作厚 朴

手少陰心石膏 沈作厚 朴

勝小藥相羌些須胃大葛樓芷區區脾弓腎獨鹽酒俱膽肝焦絡柴丹青川芎宜少再于甯肺忍結止心

獨辛羌芎白芷少為貴胃腸脾肺升麻廢腎尤切戒毋加桂

看涼熱第四 痧犯太陽則頭痛發熱犯少陽則耳旁腫脹寒熱往來犯陽明則面目如大但熱不寒犯太陰

則腹痛犯厥陰則小腹或胸脇痛犯少陰則腰痛以上皆身涼犯肺則咳嗽痰喘微熱其則鼻衄犯心則心

痛或心脈頭額冷汗如珠而身或熱或涼犯膀胱則小便溺血甚則身熱犯大腸則痢下膿血重則嘔吐身

熱犯肝則沉重不能轉側晡熱內熱甚則吐血犯三焦則熱毒內攻上則口渴下則便結凡痧氣壅阻發而

為熱若誤為外感傳經熱症而發汗溫飲雖慢痧遲緩亦必變出頭汗發狂癲語種種重症不知外感之脈

浮數而緊熱症之脈洪數有力痧症之脈終有不同或有可疑須看痧筋有無辨之 痧症身涼而內熱者

宜攻其裡表實者宜透其肌用藥隨時活變故不立主方

分表裏第五 痧感肌表人不自知則入半表半裏故胸中作悶或作嘔吐而腹痛生焉此可焮刮而愈不愈

用金四金五方 痧毒入裏故欲吐不吐欲瀉不瀉衝心則心胸大痛攻腹則盤腸吊痛可放痧而愈不愈

用絲三石六方 痧毒中深逆攻心替立時發暈氣血不流放亦無紫血即有亦不多惟當審脈辨症之係

風寒暑濕氣血食積痰飲施治令懸氣血流動然後扶起放痧如不醒擇用絲五匏一土五方如此重症立

時連進湯丸方能有效 痧阻于氣分宜刮壅于血分宜放痛而絨動者阻于食積氣分也痛而不移者

壅于血分而有瘀也發于頭面上部毒氣上壅也纏于手足下部毒氣下注也上吐下瀉痧氣衝激也煩悶

氣脹痧氣壅塞也惡寒發熱痧氣過於肌表也胸膈偏痛毒血滯於經絡也為腫而脹食結血凝結滯腸胃也吐血便血痧氣泛溢而憂潰敗也咳嗽喘急痧壅氣分而生痰逆也立時悶絕者毒血攻心也手足數而不能運者毒血注下也腰脇俱痛者偏痛半身者身重不能轉側者皆毒血壅塞也變成腫毒潰爛者毒血凝滯敗壞肌表也

審脈第六 痧脈多微緩細澀有時弦數微浮大亦虛而無力疾徐不倫時或六脈俱伏伏亦無妨痧逆脈即漸還如頭痛壯熱脈應洪實而反微遲者痧也厥冷不語脈應沉細而反滑數者痧也脈症不符便舍症而從脈診痧盡此兩言

按傷寒雜病自有本脈若一兼痧其脈必變病必凶暴然兼痧之脈可知也傷食痧脈多緊實傷血痧脈多乳滑傷暑痧脈多洪滑而疾數傷風痧脈多沉微穢觸痧脈多變異不常傷氣痧脈多沉伏或如雀啄傷寒濕痧脈多沉細或有痧脈似陰症者尤不可不辨如傷寒脈沉遲無力是直中三陰治用熱藥何疑惟傷寒兼痧脈似陰症一服溫補熱藥痧毒變幻悔無及矣故於其外間症候稍有不合便取痧筋驗之有則為痧無則為陰涼熱異施且故痧服約後經絡無阻脈便不復沉伏然後按脈辨症治其傷寒無不效者至雜病兼痧有沉伏之脈亦準此法

凡痧脈微細者生實大急數者重洪大無倫者凶一部無脈者輕一手無脈者重兩手無脈者死六脈無根及諸怪脈見而放痧服藥不應者不治丹溪治雜症以氣血痰為先痧脹何能離此痧有氣塞者為喘急為脹滿為嘔噦為頭眼脹其痛緊脈必洪數屬陽有氣閉者為昏冒口噤目翻厥冷雖痛口不能言脈必沉伏屬陰痧有熱血者為煩燥為紫斑為頭面赤為衄口出紅沫脈必實大屬陽有血阻者腰痛脇痛攻心痛手足青紫脈必緊字乍大乍小屬陰痧有痰塞者喉中漉漉有聲吐咯不出嘔吐酸水清涎脈必弦滑屬陽有痰厥者卒倒手足厥冷肌膚芒刺遍身青筋坐臥不能轉側脈必微細似有似無屬陰亦不得謂陽痧則生陰痧則死痧有脈伏三日亦得救活者在得其數而已

論吐下第七 傷寒食未化下之太早反引寒邪入胃變為熱邪固結所食乃成結胸若痧症新食以吐為先

至所食既久驟然痧脹雖食消未盡下之無礙蓋因痧本人毒在腸胃腸胃部分肌肉作腫作脹蓋腸絞痛遍及臟腑故外宜刮放以洩其毒于表內可即下以攻毒于裡則腫脹自當潛消食積因之通利非又寒邪入胃變成結胸之可憂也但下之必兼消散食積又宜以漸而進中病即止霍亂症惡心吐瀉上吐下瀉瀉如水注此感受暑火暴發升降不利清濁不分所瀉皆五臟津液宜急用五苓散或胃苓湯以分利陰陽清暑火之氣有痰食積者亦不可遏下恐津液暴涸元氣損傷也更有吐瀉無物亦有上下關閉竟不吐瀉者為乾霍亂惟心腹絞痛令人立斃急以炒鹽湯探吐通則可救即定後週時勿進粒米得食復後慎之即如嘔盡洩空倦極當用六和湯調理方補羣方求

### 急症第八

急症昏迷先觀唇舌色黑者山黃者重淡紅者略輕蓋黃知內熱黑知熱極淡紅雖熱用約不可

太冷又要看古胎施治

痧症危急故血不流若審無食積血痰阻滯于中用陰陽水或泥漿水晚蠶砂水細

辛水白沙糖梅水擇一飲之稍醒扶起再治若有食積血痰破瘀用桃仁紅花童便之類去新食用鹽湯灌

湯吐之食久沙脹用查葛麥芽消之有積阻用枳榔大黃驅之金匱方治之或痰血凝結昏迷不醒用菜油

射香調下立甦阻滯去痧氣行筋自現而後可刮可放當藥即藥蓋緣痧症初發未攻壞臟腑故耳凡痧

藥得宜倘有不效者蓋湯劑多帶冷冷則直入腸胃未能達於肌膚血肉故治先刮放也刮放而藥仍不效

必刮放未盡也刮已到放已盡而痧猶在則毒雖在陽明胃及脾肝腎三陰經絡非藥何以治之

昏迷不醒難施刮放當用藥救夫湯藥帶冷雖未能即周血肉然當熱毒攻心正遇帶冷之藥順流而下

昏迷自醒如不醒乃食積血痰所阻攻而下之無不醒者

痧發無寒症然亦有時為寒非真寒也蓋因痧熱而服大寒之劑以至此夫痧必無食積血阻于中方可服

寒飲得效若一有之而飲大寒則食不消積不行血不散而毒反冰伏矣嘗見巖谷中行旅感暑渴飲潤泉

而即斃者是名寒痧蓋飲寒毒結多致不救也若幸遇放痧之人毒血一行便無阻滯故方書有服陰陽水

者不獨取井水即此故耳是以久服涼飲痧有未痊者略用三香溫和之劑寔為權宜之術若驟用桂附乾

姜吳萸參芪之屬則又誤矣痧皆屬火火有君相之別手少陰君火也右腎命門為手心主乃手厥陰胞

絡之臟經言心之原出於太陵凡刺太陵穴者以瀉手心主相火之原耳又有手少陽三焦合為表裏神脈

同出現于右尺二經代君行令故相火之為病居痰火性炎烈以致三焦阻塞六脉全乖昏冒痰喘然相火作病猶有可回若犯心君煩在煩更莫謂術疏耳痧犯咽喉則痰喘如錐先放痧急用薄荷牛蒡山豆根童便之類清之兼吹竹一方餘症且緩治痧症危急大便不通急宜放痧用潤下丸以攻之小便不通宜放痧用土四方以分利之痧有心胸高起如饅頭者不治增用竹六心胸左右或背心一點痛者用角弓反張者死腰腎一片痛者死脇肋痛四肢腫痛者難治鼻如烟煤者舌卷囊縮者環口蠶黑者頭汗如珠喘而不休者皆迷甚放無血服藥不應者痧塊大痛服藥不應者俱死此皆實熱之為害耳

緒論第九 在北曰青筋曰馬頭瘟江浙則為痧聞廣則為瘴氣其實一也宜生料平胃散加草果枳榔聞廣瘴氣由蛇獸惡鹹而成凡山行見有黑氣飛過急伏地掩其口鼻俟過再行若嗅其毒即腹疫寒熱臉甲青紫即用平胃散加枳榔紫蘇半夏蔥姜煎服汗出為度玉樞丹亦妙

湘聞浦口張總戎和征緬甸時帶兵數百人路過風作桂花香略嗅之至晚腦痛昏沉有守備係士人進謁曰不可為矣是名枳榔瘴蛇食枳榔花毒與香俱也踰日果卒兵從亦半損避之之法伏地屏氣與前法同也

聞江南溪澗有射工蟲含沙射人影即寒熱頭疼筋急體強悶亂呻吟涎流咳嗽始終便不能言朝輕暮重不識者指為傷寒士人曰此痧病也用真正玉樞丹磨服一錢即安凡渡有毒蟲處先用竹竿擊水面急渡則無妨

按射工溪毒中病者狀如傷寒寒熱發瘡遍在一處用紅莧菜葉搗汁飲一升日再服以渣敷之馬齒莧同惟鵝喜食此蟲故鄰近家多畜鵝

嶺南烟瘴尤多痧病乃溪毒沙蟲水弩射工蠍短狐蝦鬚之類俱能含射人被其毒者憎寒壯熱百體分解肢節痛酸似傷寒初發狀彼土人治法手捫痛處用角筒入肉以口吸出其砂外以大蒜煨熱搗膏封貼瘡口即愈諸蟲惟蝦鬚最毒若不早治十死八九其毒入骨狀如蝦鬚瘡類疔腫彼地有鸛鵒鸛鳴等鳥專諸食蟲以此鳥毛糞煨灰服之及籠此鳥于被毒人身畔吸之其沙聞氣自出而愈其餘治法詳前後各條

瘟疫痧。瘟疫與痧脹皆氣為之。或因風雨寒煖不時。山澤濕熱蒸動。又兵荒積尸之氣。隨天地升降流行。人在氣交中。無可逃避。轉相漸染。故痧有觸穢一症也。凡人尤忌夜行。多致犯痧。以受陰濁之氣故耳。明末癸未。京師大疫。有胸腹滿生白毛者。有頭大如斗。眼鼻俱沒者。有兩腮紅腫。痰喘壅塞者。呼吸聞死以萬計。皆痧類也。針挑血出。隨愈。頃之變為嗽喘症。雖輕不半日隨斃。用前法挑之。亦隨愈。放痧之法。由來久矣。按所謂大頭瘟者。下非不病。特甚於上耳。元瘡病內非不病。特見於外耳。蝦蟇瘟腹非不病。特痺于喉耳。症類多端。惟以清熱解毒為主治之。先上先下。從內從外。自當因症而施。以上諸症。用普濟消毒飲最好。新增祛瘴辟瘟湯一方。

辛酉一婦。孕幾八月。夫不在家。黃昏時忽飢。不可忍。即炊米一升為飯。食盡而睡。少頃。隔房聽兒啼三聲。以為產矣。呼之不應。持燈照之。婦已死。腹內依然如此怪症焉。知非痧然。亦不及措手矣。

解痧症

解者。骨節解散。你者。筋不收束。似寒似熱。困急煩躁。腹疼。飲食不美。嘔吐酸水。或因傷酒中濕。或感風寒。勞房。女人經水不調。血氣不和。皆能成此症。即痧類非傷食也。宜先用熱水蘸搭臂膊。以手麻刮之。甚者刺十指。委中出血。或以香油燈照身背。有紅點處烙之。使腠理開通。血氣舒暢而愈。又宜服蘇合香丸。

汾按。解你。不盡為痧。然暗痧慢痧。每似解你。人所當知。名醫類案更解你以痧名。未為無見。但後附戴氏說。力辯解你非痧。適與庸醫之見同。勿為所誤。

白虎病

凡太歲後一位為白虎。如太歲在巳。則白虎在辰。太歲在申。則白虎在未。其神所值之方。小兒出入

居處。或有觸犯。則病。其身微熱。或冷。有時啼叫。屈指如數物狀。以集香湯治之。用沉香檀乳四香。參草伏神。棗仁水煎。臨服入麝香少許。存渣房內燒之。至如小兒出瘡疹。一名麻。又名痧。散見於皮膚。與痧粒相似。

小兒出痧。必先身熱。咳嗽。或嘔吐。腹痛。時隱時見。三日乃平。今時痧症。亦有細粟紅點。或隱或顯。額上最多。

胸膈頸項次之。手足腰背又次之。在內則心腹脹疼。在外則肌膚芒刺。其原皆因熱毒熾。故與小兒之痧疹

同名。若小兒果係痧疹。必從本料正治。又不當混入此痧症也。治痧當明雜症。其于兼痧類痧等症。方能

原治不誤

繅伸活曰絞腸痧屬胃氣盛猝中邪機帶過不能吐瀉以致絞腸甚常胸腹脹  
必有紅髮速拔去之急以三拔銳針刺委中擠出熱血可立蘇次用新艾  
止蛇如律亦有紅髮

手法第十 脉不明不可亂用藥症不明不可輕用藥手法不明即藥不能速效故手法為治痧要者

一曰焯 痧在肌表未發出者以燈照之隱隱膚間且慢焯若既發出狀如蚊咬粒如痞點疎則余氣密則連  
片更有發過一層復發兩三層者焯法看頭額及胸前兩處服上與肩膊處照定紅點以紙燃條或大燈  
草微蘸香油點灼焯之即時爆响焯畢便覺胸腹寬舒矣

一曰刮 痧在膚裡發不出者則用刮若背脊頸項上下及胸前脇肋兩肩臂掌用銅錢或碗口蘸香油刮之  
若在頭額項後兩肘臂膝腕用棉紗線或芒布蘸油憂見紅紫血點起方止大小腹軟肉內痧用食鹽以  
手擦之痧既刮出痛處亦輕矣

一曰刺 古言東南卑濕利用砭以針放毒血即砭道也痧重者經鐵氣難解放痧當用銀針銀性無毒  
放痧有十處

頭頂心百會穴

只此破略見

印堂

微入內不須深入

兩太陽穴

太陽痛甚皆用之

喉中兩旁

喉中兩旁

手十指頭

指頭

兩乳

兩乳

兩臂彎

臂彎

足十指頭

足十指頭

兩腿彎

腿彎

亦如此辨之

痧筋見者毒入血分宜放于隱下見者毒入氣分及見而旋微見者乃毒阻氣分治宜通其腸胃痧筋自見

至伏而不見者必從脈症辨之血則散食則消痰積則驅結既解而筋復見然後刺放可也○痧筋或見數處或一處必刺去惡血令痧毒盡洩或誤飲熱湯痰筋反隱而不見略見亦刺放不出急飲冷水解之後可刮放痧為食積所阻刮放不出者當先消食積而再刮放熱極血凝滯阻胸腹刮放不盡者當先散瘀血而再刮放痧發兼遇惱怒傷肝作脹刮放不盡者又當先用破氣藥再刮放如此痧毒皆可漸消矣

用藥大法第十一 痧氣阻塞作痛作脹用荆防之類從表而散用青陳之類從中而消枳實大黃之類從大便而下木通澤瀉之類從小便而行查葛之類治食阻紅花銀花之類治血壅枳榔蓬蓬之類所以治積之滯也 無食積血瘀而痧氣壅甚者藥須冷服有食積而無血瘀者稍冷服毒盛血瘀者微溫服 稍冷者九分冷也微冷者八分冷也微溫者七分冷也

藥忌 用藥一差因危立見先知其忌則思過半矣

參朮白朮山藥 補毒氣

茯苓豬苓 其氣俱在脾實

麻黃 發表太過禁用

五味子 木瓜 酸飲忌用

茯神柏子仁酸棗仁 即虛煩不寐亦不可用

訐半夏藿香止吐 凡治吐症用半夏藿香獨痧症作吐半夏性燥須防益助火邪必不可用藿香惟取其

正氣以治穢觸倘腸胃有食積血瘀阻滯阻痧毒驟用此以止吐反有閉門逐盜之憂

藥宜

陳皮青皮 陳行氣青代肝氣痧氣壅

荊芥 透肌發熱為臣使之助寒熱往來

防風 透肌解表散痧毒痧筋

乾葛 散陽明經之

熟地白芍 補血斂血

半夏白芷蒼朮 性燥忌用

肉桂附子吳茱萸 禁立時有變

竹瀝 性寒忌用須用姜汁方

茯苓巴戟 尤所大忌

枳殼枳實 破積滯理氣至頭而逆力不

獨活 發散治熱其性至頭而逆力不

柴胡 和解表裏專治少

紫朴 陽和經裏熱往來

寬中治嘔消痰下風

前胡 疏風消痰止嗽

薄荷 清利氣解

甘草 用之恐成痧塊難治一應甘甜味俱不宜

升麻 禁用忌提痧氣上升難遏

乾姜 能助熱○用過服冷水宜少

杜仲補骨脂枸杞子 即腰疼

枳殼枳實 破積滯理氣至頭而逆力不

獨活 發散治熱其性至頭而逆力不

柴胡 和解表裏專治少

紫朴 陽和經裏熱往來

寬中治嘔消痰下風

前胡 疏風消痰止嗽

薄荷 清利氣解

薄荷 清利氣解