

K29
15
:383(3)

383(3)

四川省

長壽縣志

(三)

中國方志叢書·華中地方·第三八三號

據

民國·湯化培修，李鼎禧纂
民國十七年石印本

影印

成文出版社有限公司印行

中華民國六十五年 月臺一版

長壽縣志

全三冊

發行人：黃 成 助

出版者：成文出版社有限公司
台北市郵政信箱二二六〇五號
台北市羅斯福路三段二四〇巷五號

印刷者：成文出版社有限公司

內政部登記證內版台業字第一一四七號

長壽縣志卷八

物產部上

動物不易羅致除習見外畧言形狀庶幾遇物能名
植物可取驗可就視故多言功用其訛傳混稱者必

之辨明

天然動物

天然植物

天然礦物

天然動物

常產

禽類

雞中國善養雞者一年可至五觔英國前女皇曾設宏
壯家禽舍討究飼養法各國貴婦人亦多飼家禽者

美國胡兒利土著有家禽飼養法又日本人譯有家禽疾病
篇極詳難之利大本境養者均未得法

鴨肉味美富脂肪卵充食用毛亦可售產卵不定其處且好
陰濕地故至產卵期每早十點鐘令居舍內通常不自

卵皆令鵝產卵不多肉硬難消化而肝為貴重食品其柔毛
 雞伏之鵝者於工藝多需用一雄可伴五六雌亦如鴉此兩
 禽共屬水禽不定居水上近傍有水少許即可陸上亦可飼
 育雛初生二三日務令溫暖勿感寒濕二三週間煮麥豆又
 細判動產物質以餌之朝遶出夕早入盆貯水令浴為宜舍
 內常須清潔時時易藁除汚沉去臭氣使不罹病則自肥大
 雁似鵝有蒼白二色令人以白而小者為雁大者為鴻鴈野
 蒼者為野鵝南來時瘦北嚮時肥雁脂味美鵝鵝雄者
 也肥而耐寒食用綠頭雄野鵝也形大如雞班色繡翼雄者
 者為上尾尖者次之雄野鵝而尾長雌者丈暗而尾短性
 好闕其卵福色將卵時雌避其雄潛伏之否鵝一名飛奴有
 則雄食其卵周禮庖人供六禽雄是其一否鵝青白兒綠灰
 斑數色相錫之法全在眼晴有大小黃綠珠砂數種成珠砂者
 為最欲晴有珠砂從雛時以人舌常舐其眼亦能成珠砂者
 肉與卵俱鷹如鐵雄者身小雌大者體大二年曰鵝背利同鉤
 稱美味鷹如鐵雄者身小雌大者體大二年曰鵝背利同鉤
 蒼鷹北人多慈鳥似鳥鵝而小多羣飛作鵝聲初生母哺
 取鵝秦之

人謂之鳥鴉大背而性貪驚古有鴉經以占吉凶然北人喜
 寒鴉鴉尾如鴉而長尾去背黑爪綠背白腹山鵲狀如鴉而鳥
 哉鵲尾如鴉而長尾去背黑爪綠背白腹山鵲狀如鴉而鳥
 背亦足尾長不能遠飛班鳩者小而反色及大而班如梨花点
 最好竊食一名山鵲飛班鳩者小而反色及大而班如梨花点
 者聲大能鳴雄呼晴雌呼雨性鴉鴉一名布穀尾長牝牡飛
 孝而拙於為巢故曰鴉巧鳩拙鴉鴉一名布穀尾長牝牡飛
 巢多居樹穴及空鵲巢中哺子朝自上而下暮自下而上穀
 雨始鳴夏至後乃止禽經云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為
 鷹故鳩之一目猶如鷹之鸛鵒一名八哥巢於鵲巢樹穴及人
 目生三子一為鸛鵒鸛鵒一名八哥巢於鵲巢樹穴及人
 有白點其舌如人舌剪別能作人言嫩則百舌一名反舌能
 口黃夫老則口白頭上有憤亦有無憤者百舌一名反舌能
 之音居樹孔窟穴中狀如鸛鵒而小身長灰黑色微有班
 點啄亦尖黑行則頭俯立春後鳴將不已夏至後無聲有班
 鴉一名黃鸝雌雄雙飛體毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉
 尖背青脚立春後即鳴其音圓滑如織機聲乃應節月令

鳴仲春倉庚燕去也伏氣驚社去其來也街泥巢於屋宇之下其

燕另是雀一名瓦雀栖宿簷瓦之間老而班鷁鷁善營巢一

詩之桃虫生蒿木之間居藩籬之上狀如畫眉狀如山鵲而

黃雀而小俗名黃脰雀畜則可教之鬬如畫眉大色蒼黃兩

雌則不鳴不鬬人多秦雄者古有相畫眉訣

杜鵑一名子規色慘黑口亦有小冠春暮即鳴夜啼達旦至

一名陽雀而金川鎮記乃云有一種雀自呼曰貴貴陽晝夜

不絕聲土人目為陽雀夜間與叫月子規空山谷嚮

鴛鴦垂之黃色有文頭而外雄鳴曰鴛鴦鳴曰鴛鴦人獲其一則
相思鴛鴦水鳥也林棲小食羣飛成序潔白如雪頭細而長
而死鴛鴦脚青善翹高尺餘喙長三寸項有長毛十數莖翹
翹然如絲欲取魚則弭之郭景純云其毛可為暖羅今人爭
獵取其毛以售西人又有似鴛鴦而頭無絲脚黃色者名鶴子

鷓鴣一名水老鴉色深黑亦如鴉而長喙倣曲善沒水取魚
鷓鴣日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木枯漁船往往縻
畜之以鷓鴣浮水上輕漾如漚形竹雞一名泥滑滑多居竹林
捕魚鷓鴣如小白雞長喙長脚竹雞一名泥滑滑多居竹林
其傳必為鬪諺云家有竹雞啼秧雞背大如小白雞多居田澤畔夏
白蟻化為泥蓋性好食蟻也秧雞背大如小白雞多居田澤畔夏
至後夜鳴達旦號寒蟲晝夜呼叫一名昌旦月令仲冬月裸體
秋後即止
不鳴蓋冬至至陽生漸煖故啄木鳥小者如雀大者如鴉面如
也其屎名五靈脂入藥故啄木鳥桃花喙足皆青色剛瓜利
背如錐長數寸舌鉤出食之刺蝟一名有薄肉翅連合四足及尾
啄得蟲蠹以舌鉤出食之刺蝟一名有薄肉翅連合四足及尾
如一畫伏夜飛其腦重故倒懸多生古屋中屎名夜明砂入
藥抱朴子謂白色者千百歲服之令人不死然唐陳子真宋
劉亮皆得白蝙蝠食之立翡翠爾雅注鵲一名翠雄赤曰翡
死好言仙者誤人不少立翡翠雌青曰翠婦人以其羽為首飾

獸類

豕

西人不重猪肉近考其肉富滋養分謂雖有傳寄生

為良蕃殖甚速毛堪獲利酒粕豆牛肉可食尤暢銷西人最

誦飼養之法分肉用乳用役用三種現止農家畜以羊最供

耕田宜選骨大胸廣脚直蹄堅者乃強健有力

者毛與乳也而乳為第一西人謂羊乳遠勝人乳牛乳日本

人著有山羊全書牧羊指引法極精詳本境畜羊者少惟鄰

近白家場馬脚稍大而長足稍大而輕快者適於乘體大頸短

一帶較蕃馬脚稍大而長足稍大而輕快者適於乘體大頸短

最善而日本人則謂牛雖視馬遲鈍而其力較強且價較廉

飼較易病較少生可取乳及衰老屠殺則無一不適於用故

用牛優用於馬本境用狗種類甚多短喙善守者為吠犬居

馬處更宜少宜多畜牛羊狗家類所賴雖不如西人好狗之甚亦

宜選良種狗病磨貓身似狸面似虎柔毛利齒口旁有剛鬚

鳥藥飲之則愈貓身似狸面似虎柔毛利齒口旁有剛鬚

數莖尾長短腰目若金鈴上鬚多飼之則遇冬不偷卧灶下

以硫磺少許納於豬腸內或拌飯飼之則遇冬不偷卧灶下

兔蕃殖速飼養少勞皮與毛皆有益價值日本農學士若野兔
丙謂牛馬豚羊之外飼兔亦有本境畜兔者少若野兔
處處有之凡兔至野豬形如家豬但腹小腳長毛色褐其肉
秋深時食方美
豪豬俗名刺猪狀如猪項脊有棘鬣長尺許粗如山羊一名
一各獐羊謂羊之在荒野也一種大角豹而性暴故名似虎
一種角細本境西山往往有之
文如錢者曰金錢豹宜為裘如艾葉者曰艾葉豹最射俗屬
畏蛇本境西山間有之有人有見金錢者誤以為虎
豺狗其形似狗前矮後高尾長體細狼俗名毛狗大如狗銳
瘦毛黃褐色牙如錐聲似犬氣臊臭狼頭尖毛白頰駢脇高
前廣後脚則不甚高能食雞鴨其色雜黃黑亦有蒼灰色者其
腸直故鳴則後窾皆沸羹為狼烟其性善顧而食戾踐藉老
則胡如袋所以後跋胡曳尾進退兩難狽狽似黑狗罕見黃者形
足前短後長足後短負之而行故曰狼狽狽似黑狗罕見黃者形
氣臊西人考孤無靈性狸一名野貓有數種大小如狐毛雜
斷不能為仙作崇黃黑有班如貓圓頭大尾如善竊雞

鴨蟲鼠果竄九節狸似虎狸而尾有黑白錢文相間皮可為肉臭不可食

獾水獺四足俱短頭與身尾皆扁故俗名扁子毛色青黑所獾三尺餘能知水性捕魚甚捷得魚四方陳之進而弗食

謂祭魚也漁船則畜鼠有四齒而無牙前爪四後爪五淮南之亦有白色者鼠子云魚食巴豆而死鼠食巴豆而肥

段成式云鼠食鹽而身輕食砒即死本草綱目云牡鼠甘微溫無毒似牝鼠或有毒然西人考究鼠皆有毒能致疫凡瘰

疫流行時下鼯鼠一名黃鼠即狀似鼠而身長尾大黃色帶令通國掘鼠鼯鼠赤氣極腥臭健於捕鼠及禽畜入能刺蛇

用之不折與尾可作筆嚴冬也

蟲類

蠶家蠶有一化二化三化四化之多本境有順慶潮州兩

種至山蠶則無人試辨法國魏雷若有飼育野蠶織畧謂已養過二十餘種此氣不同故難照辨雖縣辨理堂所辨養山

蠶法分春秋二季秋蘭蜂養者寥寥即養亦未得法曰本花

又勝於春蘭極簡明

英人博蘭雅譯有西蠟李時珍曰唐宋以前洗燭入藥所用
國養蜂法并及野蜂白蠟皆蠟也白蠟則自元以來人
始知之其蟲大如蟻其種後延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩
莖化為白脂乃結成蠟狀如凝霜處著後刺取謂之蠟渣若
過白露則粘住難刮矣其蟲嫩時白色或或中蒸化滙下器
中待凝成塊即為蠟也其蟲嫩時白色或或中蒸化滙下器
乃結苞於樹上初若黍米大入冬漸長大如雞頭子紫赤色
累累抱枝宛若樹之結實俗呼為蠟種一苞數百次年立春
日摘下以若葉苞之分繫各樹芒種後苞折卵化蟲乃延出
葉底復上樹作蠟樹下要潔淨防蟻食其蟲
五倍子通種作小迷於葉間正如火蟲之作蠟子也初起甚
小漸漸長堅其大如拳或如結成其殼堅脆其中空虛有細蟲
久則細黃銀於枝葉宛如結成其殼堅脆其中空虛有細蟲
如蟻蜂霜降前采取蒸殺去則蟲必穿環而殺薄且腐矣皮
工造為百藥煎以染皂大為時用今則西國製熟皮將皮浸
於五倍子水內收盡膠質遂變成熟皮比生者更堅
韌水難通過亦不腐敗又可造墨水故爭購之
螻蛄首

奮臂修頸大腹一手四足善緣
而提以鬚代鼻能翳葉捕蟬
香以鬚代鼻古今注橘蠹化蝶
之葉化蝶坪雅蔬菜化蝶西陽
葉化蝶如丹青野史綠綵化蝶
蠅諸蟲至老俱各脫而為蝶如
亦必生蟲而食花葉以及所化
隨其蟲所食花葉以及所化之
靖蜓大頭露目短頸長腰釋尾
蜻蜓鼻薄如紗食蚊飲露水
在草上者曰草螽在土中者曰
土螽似草螽而大者曰螽斯
蟻其性猛其音商善鳴蟬一名
健鬚有青黑黃紫數種蟬鳴一
狀謂之蟬花禮記所謂蟬有
螻蛄也其骸曰蟬蛻入藥
螻蛄一名蟬蛻有螢有三種一
所謂腐草化為螢者是也一種
飛乃行根所化也一名螢蛻如
明堂月令所謂腐草化為螢

為蠍者是也 蠅夏出不蟄喜暖惡寒真能敗物巨者首如大
 其名宵行 蠅麻蓋毛根所化也聲在鼻而足喜交
 蜘蛛其類甚多大小顏色不一 蟾蜍多在人家下濕處身大
 皆有毒布網其絲右繞一 蟾蜍青黑無點而癩不能逃
 不解作聲行動進 蝦蟇在波洋中背有黑點身小能跳接百
 緩俗名賴蝦蟇 蟾蜍一名四雞肉味如雞四月食之最美似蝦蟇而背青
 誤矣蛙一色青細腹以脰鳴亦有背黃點者名金絲蛙
 蜈蚣春出冬蟄節節有足雙鬚岐尾性畏蜘蛛以溺射之即
 斷爛能制蛇見大蛇便緣上噉其脰
 蝸牛有角如牛形似小螺負蚯蚓而夏始出仲冬蟄結蛇類
 設行則頭出驚則縮入 蚯蚓而則先出晴則夜鳴蛇類
 極多春出則食物冬蟄則含蟻而食必死不稍却豈能食
 土其舌其耳其毒在涎蟻而行至死不稍却豈能食
 以保種者

鱗介類

鯉其脇鱗一道從頭至尾無大小皆三十六鱗每鱗
 有小黑點產長流淡水水中者形味而美在池沼者

有泥鰻魚似鯉而黑色身圓頭扁骨軟長者大鰻魚其身扁也
 土氣鰻魚餘其子滿腹有黃脂本境呼為嚴鰻魚
 故石古名鰻魚小頭縮頸脊潤腹鰻魚頭小形扁細鱗其色青白腹內有脂肪味最美鰻魚腹其色最白古名
 細鱗而本境則呼為白甲其大鰻魚似鰻而色黑其頭最大此
 口無鱗者方曰鰻魚誤也鰻魚中之下品蓋庸常以供
 饕餮者本境魚青鱗似鰻而色青象鼻魚鼻長如象蓋鰻屬也
 呼為肥頭魚青鱗體薄味美
 鱣而鼻長水篦魚體圓鱗細色白肉嫩味極美宜草魚身圓長
 體無鱗甲蒸食惟多刺俗呼為出水爛
 肉厚而鬆以草飼之故名古名桃花魚俗名洋魚巨口細鱗
 純有青白二色白者味較勝桃花魚味同松江之鱣出水
 數刻即饒桃花開時始有之長尺許不可多得按嘉定郭璞
 巖前墨魚亦每歲二三月出止在烏尤一帶十餘日輒不見
 人以為奇不知來鰻魚冬月一名鮒形似小鯉色黑而體促
 鰻魚之變化者多也鰻魚冬月一名鮒形似小鯉色黑而體促
 無大鰻魚腹黃故俗名黃鰻或作鰻魚誤鰻字平聲黃魚也
 生泥鰻中細長如蛇而無鱗多涎沫大者長二三

尺鰓俗名鰓魚最難握物類相感志云鰓心中青黑色無味甚妙美

石寶魚產龍溪石鏡中長寸許紫粘石上取者閩鰓上游形

如中而頭尾異味極鮮美藏水底石鰓魚而遊啞沙而食黃沙

白色俗呼鰓有肉裙故曰鰓甲裏肉鰓肉裏甲無耳以目聽

純雌無雄以通牝外骨內肉廣肩大腰其息以耳無雄與蛇為

鰓外剛內柔二鰓八腕殼上有十二星點如鯉之三六

之黃應八月盈虧生於流水者色黃生於止水者色紺霜後味

訛為彭越似鰓而大似蟹而小者名鰓不可食蔡謨誤

者沙狗也不可食兩鰓極小如石者蚌江也不可食六足者

名鰓四足者名北皆有大有小不可食生溪澗石穴中小而殼

堅赤者石蟹田螺生水田及溪澗中類蝸牛而尖長青黃色也野人食之

春夏可螺蛳惟食泥水春月採買鍋中煮之其肉自出酒烹採食之

糟煮食之清用蚌蛤可食殼可製粉蝦梅蝦梅雨時有之則有毒不堪用

蘆蝦青色相傳蘆葦所化泥蝦乃稻花變成多在泥田中

天然植物有葛枝味勝五嶺今皆無矣

常產

穀類 稻二種粘者為糯不粘者為粳最宜注意莫如選種及全穗黃熟帶黃金色之時候天氣晴好雨三日無雨

採先出之穗以桶貯水一斗攪之再三凡浮水上者多不佳十兩待落解後徐入種五升攪之再三凡浮水上者多不佳

宜除去而用其下沉者納袋中緩縛之浸漬清流中或池水中約七日至十四日如無清水池水則桶貯清水投以泥選

之種時時攪之每日換新水然後布席上曝兩三日藏之無
 濕氣處於播種前常使濕潤則發芽迅速且無遲早之差
 高粱程氏九穀考定為耐旱又耐水有二種粘者可釀酒
 作餅不粘者可作糕煮粥莖可織箔夾蘇稍可作帚根
 葉可供炊爨穀浸水色紅可麥酒及製飴造醬等小麥亦可
 以釀紅酒有利於民者最溥麥酒及製飴造醬等小麥亦可
 造醬油而作麵粉極佳兩種之稈均有用鹽水宜稍濃蕎麥
 選稻種同惟小麥較大麥重率稍加故用鹽水宜稍濃蕎麥
 能耐寒成育之期六速栽培稍勞力且罕罹病蟲之害粉可
 作饅頭莖葉可充牛馬食料人可為肥料其花可飼養蜜蜂
 歲可獲三次不問玉蜀黍十名包谷能耐水旱穀粒有八代
 田之肥瘠皆宜
 種黍古人定律累黍以生律度量衡後人取黍定之終不能
 黍古人必用上黨黍以生律度量衡後人取黍定之終不能
 無大小然上黨亦不常有他黍則參差有赤白黃黑數種一
 年三季白者亞於糯赤者最粘可蒸食可作餲而釀酒尤佳
 古以菰葉裹成櫻謂之角黍栗即小米古以栗為黍稷之總
 本境近年新得黃種宜推廣