



鐵樵函授醫學

金匱翼方選按

第十五種第一期

導言

余初著金匱方論。因其方與實地經驗所見之病症不合者頗多。故多所攻鑿。既而悔之。已成兩萬字。棄去不錄。重爲此書。此雖後賢所爲。然其方亦曾經過數十百次經驗。比較切于實用。用意比較容易了解。方法比較容易學步。門類亦全備。固是學者必讀之書。得此一編。則方藥運用。都有根據。徒有理論。不能用藥。不可以爲醫也。守一先生之說。能運用數十味藥。能治數十種病。方法不詳備。不足以應世也。惟舊籍挈症。都不可爲訓。說病既不詳。用藥亦無標準。可言。學者執死書。治活病。畫依樣葫蘆。愈病什一。殺人什九。且殺人而不自知。是有書等于無書。私意以爲是有改革之必要。今茲所爲。錄其必要者。節其不必要者。詳其所知者。闕其所不知者。務使挈症詳明。藥有標準。治病方法。與上

兩學期講義中理論如桴鼓之相應。則活書應活病。庶幾所造就者有可觀矣。以余之讜陋。平心論之。經驗亦尙苦不充。此書不能完備。自不待言。然而毅然爲此。不復猶豫者。葦路藍縷云爾。先河後海。是有待于後來。

中風八法

一曰開關

卒然口噤目張。兩手握固。痰壅氣塞。無門下藥。此爲閉症。閉則宜開。不開則死。搐鼻。揩齒。探吐。皆開法也。

白礬散

聖濟

治急中風口閉涎上欲垂死者。

白礬

二錢

生薑

一錢

連皮搗水二升煎取一升二合

右二味合研。瀘分三服。旋旋灌之。須臾吐出痰毒。眼開風退。方可服諸湯散救治。若氣衰弱不宜吐之。（此方以白礬涌泄爲主。佐入生姜。辛以開之也。）

將右二味于新瓦上煨令赤爲度。煉蜜丸。芡實大。每用一丸。綿裹放患人口中。近喉處。良久吐出痰立愈。一方加皂角一錢。煨研。取三分吹入鼻中。（按巴豆爲斬關奪門之將。用佐白礬以吐痰。因其性猛烈。故蜜丸含化。是急藥緩用之法。）

鐵按。中風從寒化者。唇舌都潤。舌質不紅。口液奇多。喉間痰聲漉漉。目瞑。或雖張而無神。其眼球不能自由轉動。左側臥則目向左。右側臥則目向右。此在舊醫書謂之目連搭。其舌常萎縮。此種因三叉神經麻痺。滑車神經與舌咽神經都是其分枝。詳驚風詳說講義。惟其如此。所以舌萎。目連搭。會厭之肌肉亦不能自由運動。故痰聲漉漉而不能吐。凡猝然中風。卽見此種症象者。當用辛溫下降。如乾薑附子吳萸之類。當用有刺激性之藥。使麻痺之神經得蘇醒。則痰涎自出。第一方白礬生薑。其生薑一味。卽是富有刺激作用。

凡藥性其藥位最當注意。生薑之刺激作用。不在舌尖而在咽喉。故能取效。若問何以在咽喉。則無理由可言。惟有求之經驗。

第二方巴豆所謂斬關奪隘。因此藥能嘔能瀉。其性奇悍。食停上膈之結胸症。用此可以取效。惟只宜用巴豆霜。且只能以厘計。至多到一分。至于中風其癥結是神經麻痺。照此用法。開關是否有效。未經試驗。惟既經煨過。用量又少。當然無害。此後尚有急救稀涎散及勝金丸兩方。都不甚好。稀涎散用猪牙皂角明礬。此種藥只宜擦牙。不宜內服。勝金丸用藜蘆。尤其凶悍。都屬可商。經驗上用之而有效者。最好是蘇合香丸。開關云者。指猝中之後。最初用藥而言。蘇合香丸能刺激神經。亦能令病者嘔吐。凡用一丸。溫開水化。灌入病人口中。如不能咽。可聽其徐徐滲入。無論見寒化症象。熱化症象。都可用。寒化者可加薑。

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

在元氣也。元氣固，然後可以圖邪氣。

參附湯（按此方爲急救之法。藥止二味。取其力專效速也。）

人參

製附子

用人參須倍于附子。或等分。不拘五錢或一兩。酌宜用之。薑水煎服。有痰加竹瀝。

鐵按。所謂脫。是渙汗遺尿。目無神。若萬分危急。可用艾灸關元氣海。艾炷如蓮子大。隔薑一片。約至少三壯。多至七壯。關元在臍下一寸半。氣海在臍下三寸。

三曰泄大邪

昔人謂南方無真中風。病多是痰火氣虛所致。是以近世罕有議解散者。然其間賊風邪氣亦間有之。設遇此等。豈清熱益氣理痰所能愈者。續命諸方。所以

不可竟廢也。下略。

小續命湯

麻黃

川芎

桂枝

防己

杏仁

黃芩

芍藥

宜桂

白芍

附子

甘草

防風

人參

生薑

三化湯

厚朴

枳實

大黃

羌活

肘後方

雞屎

大豆

防風

按此三方祇能充佐使之選

荊芥散 荊芥一味略炒爲末。華陀愈風散。治婦人產後中風。口噤。手足痲

癱如角弓。或產後血暈。不省人事。四肢強直。或心眼倒築。吐瀉欲死者。亦只此

一味。微炒爲末。每服三錢。豆淋酒調服。或童子小便服之。口噤則抉齒灌下。藥

黑豆二升熬令聲絕酒二升納鐵中急攪以絹濾取清頓服取汗

鐵按以上諸方與現在所見中風症全完不合中風熱化者多屬肝胆上逆症寒化者多屬濕痰或中毒性其癥結則經神爲病絕對不是麻黃桂枝人參附子可治之病余頗致疑于金匱方不可用卽是因此假使有表證而當用麻桂有虛症而當用參附乃中風兼見之副病決不能說小續命湯可以治中風三化湯用大黃枳實厚朴是因有積可知羌活雖是風藥不能謂有此一味卽是治風之方故余于原書掣症悉數闕之因此等舊說無益于事徒亂人意且中風之爲病最顯著最多數之病原是飲酒多內飲酒則神經可以中毒多內則生殖腺早衰以故中風多在五十左右準此以談是此病無有不兼虛弱性者發汗攻下之藥可以充佐使之選斷不在主要之列中風之意義是動作不仁動作不仁乃神經爲病然則旣云是風便不是麻

黃桂枝大黃等藥可治。且中風之原因多半是虛。即有當用此等藥之副症。亦須審慎。

### 四曰轉大氣

大氣不息之真氣也。不轉則息矣。故不特氣厥類中。即真中風邪。亦以轉氣爲先。經云。大氣一轉。邪氣乃散。此之謂也。（喻嘉言曰。中風症多挾中氣。）

八味順氣散。嚴氏凡患中風者。先服此順養真氣。次進治風藥。（中風正氣虛痰

涎壅盛者。此方主之。嚴用和曰。內因七情得者。法當調氣。不當治風。外因六淫得者。亦當治氣後。因所感六氣治之。）

人參 白朮 茯苓 陳皮 青皮 台州烏藥

香白芷各一兩 甘草半兩

右咬咀。每服三錢。水一盞。煎七分。溫服。

勻氣散。良方即順風勻六氣。（此方即前方去茯苓陳皮而加天麻紫蘇祛風疏

白朮一錢

烏藥一錢

人參一錢

天麻一錢

沉香

青皮

白芷

木瓜

紫蘇

甘草各五分

右剉作一貼。薑三片。水煎服。

鐵按。以上兩方。都平正可用。但尙嫌其近乎國老藥。學者倘能明白病理。更能明白藥之效用。儘可不必泥定成方。

### 五曰逐痰涎

或因風而動痰。或因痰而致風。或邪風多附頑痰。或痰病有如風病。是以掉搖眩暈倒仆昏迷等症。風固有之。痰亦能然。要在有表無表。脈浮脈滑爲辨耳。風病兼治痰則可。痰病兼治風則不可。

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言。

製南星

半

夏 泡七次

枳

實

麩炒

茯

苓

各二錢

橘 紅一錢半 石菖蒲 人參各一錢 竹茹七分

(此方功效極緩。王道無近功也。)

水煎一鍾半。生姜五片。煎八分。食後服。

鐵按此方之有效成分。只是胆星石菖蒲。其餘都是副藥。凡副藥有兩種作用。其一對副症而言。如有痰則加二陳。虛則加生草。有外感則加羌防是也。其二對主藥而言。如用生軍嫌其峻。則用甘草調之。用厚朴嫌其燥。則用人參調之是也。明乎此。則古方可以隨意加減。又舌本強。語言不便利。僅服南星菖蒲。不定能取效。加回天丸。則其效如神矣。

清心散 治風痰不開。(按此方即喻氏用牛黃丸之意。但牛黃丸方。諸書互有異同。不如此方之簡要也。)

薄荷 青黛 礪 砂各二錢 牛黃

冰片各三分

右爲細末。生以蜜水。洗舌。後以薑汁。攪舌。將藥末。蜜水。調和。搽舌。本上鐵按。此方甚好。用法亦好。惟牛黃須注意。此物能清心熱。然不能去外感。假使是陽明熱。誤用。病者必見精神恍惚。又此物宜于中毒性之病。凡中風而有瓜。疥。鵝。掌。者。或皮膚隱黑色。汗出而臭者。皆屬中毒性。若見神經癱之見症。尤其是中毒症。必其病爲中毒性。而又熱化者。然後牛黃是適當之藥。

### 六曰除熱風

內風之氣多從熱化。昔人所謂風從火出者是也。是證不可治風。惟宜治熱。內經云。風淫于內。治以甘涼。外臺云。中風多從熱起。宜先服竹瀝湯。河間云。熱盛而生風。或熱微風甚。卽兼治風也。或風微熱甚。但治其熱。卽風亦自消也。

竹瀝湯 治熱風心中煩悶。言語蹇澀。

竹瀝

荆

瀝各五合

生薑汁三合

右三味相和。溫服三合。以酒調服良。一方竹瀝。荆瀝。梨汁各二合。陳醬汁半合。

相合。微煎一二沸。濾清。細細灌入口中。治中風不語。昏沉不識人。一方竹瀝五合。人乳汁二合。三年陳醬汁半合。三味相和。分三服。治熱風。舌強不得語。心神煩悶。一方竹瀝二升。生葛汁一升。生姜汁三合。三味相和。溫分三服。日夜各一服。

鐵按。荆瀝藥店中不備。本草綱目謂是黃荆。余對於此。略有疑義。闕之爲是。地黃煎千金治風熱心煩悶。及脾胃間熱不下食。

生地汁

枸杞根汁各二升

生薑汁一升

酥三升

荆瀝

竹

瀝各五升

梔子仁

大黃各四兩

茯苓六兩

天

冬

人

參各八兩

右先煎地黃等汁成膏。餘五物爲散。內攪調。每服一七日。再漸加至三七。覺利減之。

鐵按。此方甚好。所謂每服一七者。一方寸七也。人參之量倍大黃。梔子十一

味藥總和之。服一方寸七。大約大黃得一方寸二十分之一。不過一兩分而已。此等處學者最當注意。酥藥店中亦無有。是羊酥乃羊奶之奶油。何以用此。其義未詳。亦當闕疑。

七日通竅隧

風邪中人。與痰氣相搏。閉其經隧。神暴昏。脈暴絕者。急與蘇合至寶之屬以通之。蓋惟香藥為能達經隧通神明也。（按蘇合丸集辛香以走竅經絡。寒閉者宜之。至寶丹取精靈以直達心藏。熱閉者宜之。蓋寒從外襲。宣發陽氣。熱從內陷。宜清透營陰也。）蘇合香丸（徐洄溪云。此辟邪祛穢之聖方。）

白朮 硃砂研 烏犀角屑 青木香

香附 訶子煨取肉 白檀香各二兩 龍腦研五錢

薰陸香 安息香 另末無灰酒一升熬膏 蘇合香油 入安息香膏內各一兩

麝香研七錢半 沈香 丁香 華撥各二兩



髮際是兩耳前兩穴

肩髃二穴 在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之 手陽明大腸經

曲池二穴 在肘外輔屈肘曲骨中以手拱胸取之橫紋頭陷中是 手陽明大腸經

風市二穴 在膝外兩筋間平立舒下手着腿當中指頭盡處陷者宛宛中 手少陽胆經

足三里二穴 在膝眼下三寸脃外廉兩筋間 足陽明胃經

絕骨二穴 在足外踝上三寸當骨尖前動脈中尋按取之足少陽胆經為髓之會一名懸鐘

灸風中藏氣塞涎潮不語昏危者下火立效

百會一穴

大椎一穴 一名百勞在項後第一推上陷中 督脈

風池二穴 在顛顛後髮際陷中 足少陽胆經

肩井二穴 在肩上陷鮮中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當其中指下陷者中是 足少陽胆經

曲池二穴