

痘疹 外科

景岳全書

卷六十三
六十四



景岳全書卷之六十三長集

痘疹詮古方

會稽 張介賓 會卿著

山陰 余士仁元德氏訂

痘疹

保元湯一 治痘瘡氣虛塌陷者

人參 二三錢 炙甘草 一錢 肉桂 五七分 黃芪 二三錢 灌膜
時酒炒 日漿

時密

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加人乳好酒各
半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面



北京中医药大学图书馆版权所有

加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四
肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒
附子七八分或一錢

調元湯二

按此即保元湯無肉桂者名為調元湯即東垣

之黃芪湯也東垣用為小兒治驚之劑魏桂岩用以治痘多
效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保
全誠幼科王道之妙方但能因此廓充則凡氣分血分虛寒
虛陷等症皆可隨證增減用之無不可奏神效也

內補湯三

治痘瘡中虛等證

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散

四

治痘毒元氣虛弱或妄行剋伐不能潰散用之未
成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

錢炒各二

當歸

白朮

熟地

芍藥

錢炒

茯苓

各一錢

炙甘草五分

右每用三五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散

五

治痘癰

金銀花

黃芪

當歸

赤芍藥

防風

甘草節

荆芥

連翹

木通

右水煎八酒少許服

陳氏托裏消毒散六

治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或

發寒熱肌肉不生

人參

黃芪炒

當歸酒洗

川芎

芍藥炒

白朮炒

茯苓

陳皮各一錢

金銀花

連翹

白芷各七分

炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散七

治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或爲倒靨及瘡



瘧毒不化膿潰作痛等證

人參

黃芪蜜炙

當歸

川芎

厚朴薑制

防風

桔梗炒

白芷

紫草

官桂

木香

甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘

米○一方有芍藥

參芪四聖散入

治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參

黃芪炒

白朮炒

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓各五分紫草

防風

木通各三分

右用水煎服

陳氏四聖散九

治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼麩炒

黃芪等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十

治痘瘡黑陷倒陷

人參

黃芪炙

川芎

甘草

紫草

木通

木香等分

蟬蛻十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖散十一

治毒盛不起



芍藥

升麻

乾葛各一錢甘草

紫草

木通各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯十二

治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久

人參

黃芪

當歸酒洗

甘草

蟬蛻去上二分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散十三

治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌

人參

紫草

如無紅花代之

白米

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬蛻

糯米等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散十四

一名托裡十補散○調氣補血內托瘡毒

後必用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸各二錢川芎

防風

桔梗

白芷

甘草炙

厚朴各一錢桂心三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯十五

亦名活血散○大能養營起痘

當歸倍用

川芎



南京中医药大学图书馆版权所有

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不安腹痛

白芍藥酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四

君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散十七

治痘色淡白

當歸酒焙

赤芍酒炒

川芍

紫草

紅花各五錢

木香二錢

血竭一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯十八

治白疹白痘



當歸身

人參

生地

紅花

蟬蛻等分

水一盞生薑二片煎六分溫服無時

人參胃愛散十九

治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等

人參

茯苓

甘藷

丁香

藿香

紫蘇

木瓜

糯米

右每服二錢薑棗水煎

二仙散二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉難候等證

丁香九粒

乾薑炒一錢

右為細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫煖陰



返陽回別痘變潤矣量大小加減與之

陳氏木香散二二

又名十一味異功散○治小兒痘

疹虛寒此

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

炙甘草

半夏制

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲嘔不嘔瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急

用此藥治之若誤認為實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

陳氏十二味異功散二二 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咳

牙泄瀉喘嗽等證

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴各二錢半

白朮

茯苓

官桂各二錢

當歸三錢半

制附子

半夏各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二方溫性

有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更當詳酌

薛氏人參麥門冬散二三 治痘瘡微渴



麥門冬一兩 人參

炙甘草

白朮

陳皮

厚朴姜制各五錢

右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒增減

薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人參白朮散

柴胡麥門冬散二四

治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡二錢半 龍胆草一錢 麥門冬三錢 甘草炙

人參 立參各錢半

右咬咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜

升均湯二五 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

人參

白朮炒

芍藥

茯苓

甘草

紫草如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯二六

亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻

葛根

芍藥

甘草等分

右咬咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯為主後世好奇多立方法
法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之
不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於
後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內

熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加
半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨
活北細辛●頭痛加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地
黃燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黃○衄
血加山梔仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其
毒加大力子連翹紫草○瘡不出加防風蟬蛻荊芥穗紅花
子○目痛加龍胆草蜜蒙花柴胡○瘡出太稠密加人參當
歸木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾
或帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡
丹皮○痘平陷灰白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂

○手足瘡不起脾胃不足也加人參黃芪防風官桂○泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黃芪防風官桂白芷

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此方性味清涼純於疎泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小兒氣血體質大都虛弱和平者十居七八故凡痘瘡初起乍見發熱用藥最貴和平兼養營氣則庶乎盡善若預用清涼未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患有不可測矣故余制柴歸飲爲治痘之先着所當酌宜用之若治麻疹則多屬火證此方乃所宜也