

加批詳評景岳全書

卷五十四

書集

長洲葉桂天士評
古吳江家楨恩卷訂

古方八陣

和陣

局二陳湯一 治痰飲嘔惡。風寒欬嗽。或頭眩心悸。或中脘不快。或因生冷。或飲酒過多。脾胃不和等症。

陳皮 半夏製各三錢 茯苓 二錢 炙甘草 一錢

水二鍾。薑三五片。棗一枚。煎八分食。

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸。胃脘痛呃逆。即前方加丁香九粒。氣滯甚者。可加一二錢。

丹溪加味二陳湯三

治食鬱痰滯。胸膈不快。

蒼朮末治浸 白朮 炒橘紅 半夏 泡茯苓

川芎

香附

各八枚

殼

黃連

姜炒

甘草

各五分

水蓋半煎。八分食。前稍熱服。

二朮二陳湯四 治一切嘔吐。清水如注。

蒼朮土炒 白朮 炒陳皮

半夏

製

茯苓

各一錢

炙甘草

五分

水一鍾半

薑三片

棗三枚

煎八分

分。稍熱服。○虛寒者。加人參。煨乾薑。○痰飲。加南星。倍半夏。○宿食。加神曲砂仁。

加批詳評景岳全書

卷五十四

書集

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

古方八陣

和陣

局二陳湯一 治痰飲嘔惡。風寒欬嗽。或頭眩心悸。或中脘不快。或因生冷。或飲酒過多。脾胃不和等症。

陳皮 半夏製各三錢 茯苓 二錢 兖甘草 一錢

水二鍾。薑三五片。乘一枚。煎八分食。

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸。胃脘痛呃逆。即前方加丁香九粒。氣滯甚者。可加一二錢。

丹溪加味二陳湯三

治食鬱痰滯。胸膈不快。

蒼朮未治浸 白朮 炒橘紅 半夏 泡茯苓

川芎

香附

各八枳殼

黃連

姜炒甘草各五分

水蓋半煎。八分食前稍熱服。

二朮二陳湯四 治一切嘔吐。清水如注。

蒼朮土炒

白朮 炒陳皮

半夏製各一錢 茯苓

各一錢。炙甘草五分

水一鍾半。薑三片。乘二枚。煎八

分。稍熱服。○虛寒者。加人參。煨乾薑。○痰飲。加南星。倍半夏。○宿食。加神曲砂仁。

詳解本草全書

書

集

所有

明宣黃芩二陳湯五 治熱痰。

黃芩 陳皮 半夏 茯苓等分 甘草減半

水一鍾半。薑三片。煎七分。食遠服。

疑辨柴葛二陳湯六 治一切瘧。暑溼勞食等症。

柴胡 乾葛 陳皮 半夏 茯苓 甘草

白朮 蒼朮 川芎 黃芩 各等分。若陰虛大瘧除此味。

水二鍾。薑三片。煎服。○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑。若久瘧及發散過者除之。○陽分汗多。加人參。黃耆去乾葛。○陰分虛者。加酒炒芍藥當歸生地。○久瘧微邪潮熱。加四君子湯去祛邪之藥。○若欲截瘧。加常山檳榔青皮貝母各一錢。

桂附二陳湯七 方在熟陣百十五。治寒瘧厥冷。

匱小半夏湯八 治嘔吐穀不得下。及心下有飲者。

半夏一升 生薑半斤 右二味以水七升。煮取一升半。分溫再服。○局方用半夏五錢。生薑

二錢半。水一鍾半。煎服。

匱小半夏加茯苓湯九 治卒嘔吐。心下痞。膈間有水眩悸者。即前方加茯苓三兩。煎法同前。

匱大半夏湯十 治胃反不受食。食入即吐。○外臺云。治嘔而心下痞軟者。

半夏二升洗 完用 人參三兩 白蜜一斤 右三味以水一斗二升。和蜜搗之。二百四十遍。煮藥取

二升半。溫服一升。餘分再服。

藥御大半夏湯十一 一名橘皮湯。○治痰飲及脾胃不和。

半夏 陳皮 白茯苓各二錢 水二鍾。薑五片。煎八分。溫服。

茯苓半夏湯十二

治嘔吐。噦心下堅痞。膈間有水痰。眩驚悸。及小兒等病。

白茯苓二兩

半夏五錢

右每服三五七錢。薑水煎服。

宣橘皮半夏湯十三

治痰涎壅。久不已者。常服潤燥解肌熱。止嗽。

陳皮五錢

半夏製二錢半

水一鍾半。加生薑三五片。煎七分。溫服。

靈祐米半夏湯十四

久病不寐者。神效。世醫鮮用之。

橘米一升

半夏五合

右用千里長流水八升。揚之萬遍。取清者五升。煮橘米半夏。以薑

薪令煮至一升半。去渣飲汁一小杯。日三服。其新病者。覆杯即卧。汗之即已。久病者。三日而已也。

東半夏白朮天麻湯十五

治眩暉。及足太陰疾。厥頭疼。

半夏錢半

白朮炒各一錢

神曲炒各半錢

麥芽各半錢

陳皮各半錢

人參各半錢

黃耆各半錢

茯苓各半錢

蒼朮各半錢

天麻各半錢

澤鴻各半錢

各五分

黃柏二分

乾薑二分

右咬咀。每服半兩。水二鍾。煎八分。食遠熟服。

金匱黃芩半夏生薑湯十六

治乾嘔而利者。

黃芩生薑各三兩

火草各二兩

芍藥各二兩

半夏半斤

大棗個

右六味。以水一斗。煮取三升。

去滓溫服一升。日再夜一服。

東平胃散十七 治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。嘔噦惡心。吞酸噫氣。體重節痛。

自痢霍亂。噫膈反胃等症。



上海中医大學圖書館版權所有

厚朴薑陳皮去白各五兩蒼朮去皮米泔炒八兩炙甘草二兩本方加人參茯苓各二兩即名參苓
平胃散○右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服○或去薑棗入鹽
小捻單以沸湯點服亦可○小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神曲麥芽各半錢
胃中氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃因倦加人參黃耆○如有痰加半夏○不腹散
脹加大黃芒硝○如脈大內熱加黃連黃芩

調氣平胃散十八治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴製陳皮 木香 烏藥 白豆蔻 砂仁 白檀香各一錢

甘草五分蒼朮錢半砂仁半錢

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢益黃散十九

治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或肚腹作痛或大便不實手足逆

冷等症

陳皮一兩青皮 蘶子肉炮去皮炙甘草各半錢丁香二錢右每服四錢水煎服

藿香正氣散二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之

氣瘧痢傷寒等症

藿香 紫蘇 桔梗 白芷 大腹皮各一錢陳皮 半夏 茯苓 甘草 白朮 厚朴各

分水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散二一治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或作瘧疾或受山癥瘴氣等毒

厚朴 薑裏 霽香 半夏 蒼朮 米泔 陳皮 各一錢 甘草 天五 薑棗水煎服。

陳不換金正氣散 二二 治感冒風寒。或傷生冷。或瘴瘧。或疫癘。

蒼朮 米泔 浸炒 厚朴 薑汁炒各四兩 橘紅 三兩 火甘草 半夏 製 霽香 各二兩 人參 木香 裏煨 白茯苓

右每服一兩。薑棗水煎服。

徐正氣散 二三

正胃氣。進飲食。退寒瘞。食瘞。瘴氣。脾胃滯者。用之為宜。

藿香 草果 各二兩 半夏 陳皮 厚朴 砂仁 火甘草 各一錢 右為末。每服三錢。加生薑

七斤。棗三枚。同煎。俟瘞未發前。和渣服。

濟大正氣散 二四

治脾胃不和。為寒溼氣所傷。心腹脹悶。有妨飲食。

白朮 陳皮 各二錢 半夏 霽香葉 厚朴 薑炒 桂枝 枳殼 檳榔 乾薑 炮各三錢 甘草 天五

水一鍾半。薑三片。棗一枚。煎七分。不時溫服。

陳升陽益胃湯 二五

治秋燥令行。濕熱少退。脾胃虛弱。怠惰嗜卧。體重節痛。四肢不收。口苦舌乾。飲食不消。大便不調。小便頻數。兼見肺病。酒淅惡寒。慘慘不樂。面色惡而不和。乃陽氣不伸故也。當升陽益胃。○良方無黃耆。甘草。半夏。芍藥四味。

不伸故也。當升陽益胃。○良方無黃耆。甘草。半夏。芍藥四味。

人參 火甘草 半夏 脈滑者宜用各一錢 黃耆 一錢 白朮 三分 白芍 防風 羌活 獨活 各五分

柴胡 茵苓 小便利者勿用澤瀉不淋者勿用各三分 陳皮 四分 黃連 二分 右咬咀。每服三錢。漸加至五錢。

生薑五片。棗二枚。水三鐘。煎一鍾。早飯午飯之間。溫服。忌語話一二時。及酒濕助火之物。○

服藥後。如小便畢而病反增。是不宜利小便也。當去茯苓。澤瀉。若得喜食增食。初一二日間不可太飽。恐藥力尚淺。胃氣再傷。不得轉運也。或用美食以助藥力。而滋胃氣。慎不可淡食。以損藥力。而助邪氣之沉降也。亦可小役形體。使胃氣升降。切勿大勞。致令復傷。復以胃氣安靜為尤善。

海藏白术湯二六

治風溼惡寒。服緩。

白术 防風

甘草 右吹咀加生薑煎服。

濟生白术湯二七

治五臟受溼。欬嗽痰多。氣喘身重。脈濡細。

白术 橘紅

半夏 茯苓各二錢。甘草一錢。

水一鍾半。薑五片。煎七分。食遠服。

良方二味白术湯二八

方在婦人十二。治妊娠內熱心痛。

良方四味白术湯二九

方在婦人十三。治妊娠內熱心痛。

白术散三十

治自汗盜汗極效。

白术半斤

右將白术切成小塊。用浮麥一升。水一斗。同煮乾。如白术尚硬。再加水煮透爛。

取起切片。焙乾為末。每服二三錢。仍用浮麥煎湯食遠調服。

○如治小兒。以炒黃耆煎湯量。食遠調服。

大小與服。○忌蘿蔔。辛辣炙燶之物。乳母尤忌。

贍白术散三一

方在固障三。治虛風多汗癱弱。

良方白术散三二

方在婦人十一。治妊娠傷寒內熱等症。



北京中医药大学图书馆

調胃白术散

(三三)

治脾胃不和。腹脹泄瀉。身面浮腫。

白术

茯苓

各二錢

陳皮

白芍藥

炒澤瀉

檳榔

各一錢

木香

五分

水二鍾

薑三片

煎

食遠服。

○如腫不退。

倍加白术。

并枳實數炒一錢。

白术芍藥湯

(三四)

治脾經受濕水泄體重微滿。因弱無力。不欲飲食。或暴泄無異水穀不入。

宜此和之。

白术

炒

芍藥

炒各

甘草

炒半

兩

右每服一兩。水煎服。

白术芍藥湯

(三五)

治痛瀉要方。

白术

炒三兩

芍藥

炒二兩

陳皮

炒兩半

防風

一兩

右或煎或丸或散皆可用。久瀉者加炒升麻六錢。

金苓桂术甘草湯

(三六)

病痰飲者當以溫藥和之。凡心下有痰飲。胸腸支滿目眩。此方主之。

金苓桂术甘草湯

(三七)

桂枝

白术

各三兩

甘草

二兩

右以水六升煮取三升。溫分三服。小便即利。

神术散

(三七)

治傷寒頭痛身熱等症。

蒼术

二錢

川芎

藁本

甘草

各一錢

水二鍾

薑三片

煎一鍾

不拘時服。

局方

神术散

(三八)

方在散陣六五。

治四時溫疫頭疼發熱。

藏海

神术散

(三九)

治風溼惡脈緊。

蒼术

防風

甘草

右咬咀。

加葱白煎服。

○治剛症無汗者。

加羌活或獨活。

麻黃。

外科方脈流氣飲。

木香磨汁 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 烏藥 大腹皮 枳實 茯苓 柴蘇 桔梗

防風 黃耆 當歸 川芎 芍藥 甘草 半夏等分製各

和二十四味流氣飲四六

調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘇 陳皮 青皮 厚朴製各 甘草 大腹皮

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

肉桂 木香 草果 茴朮 炮薑香各一錢冬 人參 白朮 赤茯苓 木瓜

白芷

半夏 枳殼炒各 石菖蒲兩各 右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯四七 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不能飲食

半夏製五兩 人參 肉桂 甘草炙各一兩 右每服三五錢水一鍾半薑三片前八分服

因三七氣湯四八 治如同前○按此方即局方四七湯也在後

半夏製五兩 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇二兩 右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯四九 即前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局七氣湯五十 治七情鬱結臟氣互相刑剋陰陽不和。揮霍撩亂吐瀉交作。

方半夏製厚朴 芍藥 茯苓各二錢 人參 肉桂 橘紅 紫蘇各一錢水二鍾加薑棗煎服

指七七氣湯五一 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻痛作疼積聚癰瘕脹滿等症

半夏 甘草各七分 香附錢半青皮 陳皮 桔梗 官桂 薤香 益智 茴朮煨各一錢 右

每服三五錢。薑三片。棗一枚。水煎服。統首七氣湯。有三稜。玄胡。索。薑黃。草豆蔻。無半夏。桔梗。○濟生大七氣湯。有三稜。無半夏。

四磨飲五三 治諸逆氣

沉香。烏藥。枳實。檳榔。右四味。用白湯共磨服。或下養正丹尤佳。一方用白酒磨。濟生用人參。無枳實。○本方加木香。即名五磨飲。

濟疏鑿飲五三

治水氣通身浮腫。喘呼氣急。煩渴。大小便不利。

澤鴻。茯苓皮。

木通。商陸。大腹皮。檳榔。羌活。去蘆。

秦艽。去蘆。椒目。赤小豆。

右㕮咀。每服六七錢。水一鍾半。薑五片。煎服。

良厚朴湯五四 治心腹脹滿。此病氣壅實者之法治也。

厚朴。薑汁炒。

四五錢。

加生薑五七片。水煎溫服。○或間用沉香降氣散。

木香寬中散五五 治七情傷於脾胃。以致胸膈痞滿。停痰氣逆。或成五膈之病。

青皮。陳皮。丁香各四。

厚朴。製一斤。

甘草。火。白豆蔻。二兩。香附。炒。砂仁。木香。各三。

為末。每服二錢。薑鹽湯調服。○若脾胃虛損之證。不可過服。或與六君子兼用之。

良木香分氣飲五六

治氣滯留注四肢。腹急中滿。胸膈脇肋脹脹。虛氣上衝。小便臭濁。

木香。猪苓。澤瀉。赤茯苓。半夏。枳殼。檳榔。燈草。蘇子等分。右㕮咀。每服一兩。水一鍾半。煎八分。入麝香末少許。食遠服。

良人參木香散 五七

治水氣病

人參 木香 茯苓 滑石 琥珀 海金沙 枳殼 檳榔 猪苓 甘草等
每服一兩。生薑三片。水一鍾半煎。七分日進三服。不拘時。

消導寬中湯 五八

治氣滯食滯。水腫脹滿。

白术 一錢半 枳實 炒 厚朴 姜製 陳皮 半夏 茯苓 山楂 神曲 炒 麥芽 炒 薏苡仁子 炒 各一錢
水一鍾半。薑三片。煎八分。食遠服。○小便不利。加猪苓澤瀉。

化滯調中湯 五九

治食滯脹滿。

白术 錢半 人參 白茯苓 陳皮 厚朴 燒汁 山楂 半夏 神曲 炒 麥芽 炒 各五分 砂仁 七分
水一鍾半。薑三片。煎七分。食前服。○脹甚者。加葡萄子。炒用一錢。麴食傷者尤宜用。

橘 三和湯 六十

治脾溼脹滿。

陳皮 厚朴 薑汁炒 白术 檳榔各一錢 紫蘇七分 海金沙 木通各五 水一鍾半。薑三片。棗一枚。煎七分。食遠服。

盤道滯通經湯 六一

治脾濕氣不宣。面目手足浮腫。

木香 白术 桑白皮 陳皮各五錢 茯苓一兩

右㕮咀。每服七八錢。水一鍾半煎。八分。食前溫服。

良導水茯苓湯 六二

治水腫。頭面手足偏身腫。如爛瓜之狀。按而塌陷。胸腹喘滿。不能轉側。

安睡飲食不下。小便秘滯。溺出如割。或如黑豆汁而絕少。服喘嗽氣逆諸藥不效。用此即漸利而愈。

赤茯苓 麥門冬 去心澤瀉 白朮各三兩 桑白皮 紫蘇 檳榔 木瓜各一兩 大腹皮味
皮 砂仁 木香各七錢半 右㕮咀。每服一二兩水二鍾。燈草三十根。煎八分。食前服。如病
重者。可用藥五兩。再倍加麥冬及燈草半兩。以水一斗。於砂鍋內熬至一大碗。再下小錠內。
煎至一鍾。五更空心服。滓再煎。連進此三服。自然小水通利。一日添加一日。

健脾散六三 和中健胃。消食快氣。

人參 白朮 炒丁香 薤香 砂仁 炒肉果 炒神麵 炒天甘草等分 右為細末。每服二錢。
不拘時服。橘皮湯下。

參术健脾湯六四 治脾虛兼滯脹滿。

人參 白茯苓 陳皮 半夏 砂仁 厚朴薑製各一錢 白朮二錢 甘草三分 水一鍾半。薑

三片。煎七分。食遠服。○加神麩。麥芽山楂。消脹尤佳。

因當歸散六五 水腫之疾。多由火不養土。土不制水。故水氣盈溢。脈道閉塞。滲透經絡。發為
浮腫。心腹脹滿之證。

當歸 桂心 木香 赤茯苓 木通 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 陳皮 白朮各一斤 水二鍾。加紫蘇五葉。煎八分。不拘時服。

木瓜 一斤



當歸活血散六六

治療血脹滿

赤芍藥

酒洗

生地黃各錢

桃仁去皮紅花酒洗

香附各一錢

川芎

牡丹皮

穿心

索 蓬木

炮各八分

三稜炮青皮各七分

水一鍾半煎七分食前服

局五加散六七

治風濕客於脾經以致面目浮虛四肢腫滿心腹膨脹上氣急促兼治皮水

胎水

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮等分

右咀每服三錢水一大鍾煎

大分

熟服無時

澹五皮散六八

治病後身面四肢浮腫小便不利脈虛而大此由諸氣不能運行散漫發皮

膚肌腠之間故令腫滿此藥最宜

大腹皮

陳皮

生薑皮

桑白皮炒赤茯苓皮各分

右咬咀每服五六錢水一大鍾煎

八分不拘時溫服日三次忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸六九

治水腫一切小便不通難治之證

沉香

郁李仁去皮蕎麥

炒各一兩半

琥珀

杏仁去皮紫蘇

赤茯苓澤鴻各半

橘紅

防

已各七錢半

右為細末煉蜜丸桐子大以麝香為衣每服二十五丸空心人參湯送下量虛實

增減

法製陳皮七十

消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒甘草各二兩青鹽炒一兩。乾薑烏梅肉各半兩。白檀香半錢。右六味共為末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子慢火一處煮候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時。大家祕法痛散七一治諸般心氣痛或氣滯不行。攻刺心腹痛連胸脇小腸吊疝及婦人血氣刺痛。此方屢用無不神效。

青皮五靈脂去石川棟子川山甲大茴香各二錢良薑香油玄胡索沒藥檳榔砂仁一錢木香錢二分砂仁少許右咀用木鼈子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木鼈不用共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下。

調痛飲七二治脾痛氣膈。

木香丁香檀香大香附台烏藥莪朶肉桂片薑黃白生薑白豆蔻砂仁炙甘草等分右咀每服二錢半加紫蘇四葉煎湯服。

丁香止痛散七三方在熟陣百八。

治心痛。

良烏藥七四治血氣壅滯心腹作痛。

故手拈散七五治心脾氣痛。

烏藥莪朶炒醋浸

桂心

桃仁

當歸

青皮

木香等分

右共為末每服二錢熟酒下。

延胡索

五靈脂

草果

沒藥等分

右為細末每服二三錢不拘時熟酒調下。



良遊山方

七六

治心脾痛。此藥極奇。葉石林遊山見一小寺頗整潔。問僧所以仰給者。則曰。

素無田產。亦不可求。只貯數藥以贍其脾。夜藥最為流布。有詩云。

草果玄胡索。靈脂并沒藥。酒調一二錢。一似手拈郤。

右等分為末。每服三錢。不拘時。溫酒調下。

舒筋湯

七七

一名如神湯。○治閃肭血滯。腰腹疼痛。及產後血滯作痛者。更妙。

當歸

玄胡索

桂心

等分

右為細末。每服二錢。不拘時。溫酒調服。○一方。加杜仲牛膝。

桃仁續斷亦可。

丹玄桂丸

七八

治死血留胃腕。當心作痛。

溪玄桂丸

七八

治死血留胃腕。當心作痛。

大。每服四十丸。薑湯下。

潔枳木丸

七九

治痞積。消食強胃。

枳實

去穰麪

白术

數炒

一兩

官桂

二兩

紅花

三錢

紅麵

五錢

滑石

各五

桃仁

三十

右為細末。

湯浸蒸餅為丸。蜜豆

大。每服四十丸。薑湯下。

古潔枳木丸

七九

治痞積。消食強胃。

枳實

去穰麪

白术

數炒

一兩

官桂

二兩

紅花

三錢

紅麵

五錢

滑石

各五

桃仁

三十

右為細末。

湯浸蒸餅為丸。蜜豆

枳木丸

香砂枳术丸

八十

破滯氣。消宿食。開胃進食。

木香

砂仁各五

枳實

數炒各

一兩

白术

米泔浸

炒一兩

右製服如术丸法。

麵藥枳术丸八一 治强食多食。心胸滿悶不快。

神曲炒 麵藥砂枳實各一兩 炙炒各白术二兩

右製服如枳术丸法。

垣木香人參生薑枳术丸八二

開胃進飲食。

木香三錢人參五錢乾生薑二錢陳皮四錢

枳實一兩白术半

右為細末。荷葉燒飯為

丸桐子大。每服三十九。食前溫水下。

直加味枳术丸八三 治脾胃虛弱。食積氣滯。胸腹脹滿。常服進食寬中。和暢脾胃。

指加味枳實各一兩 砂仁炒半兩 神曲炒

白术甘浸土炒二兩 枳實數炒半兩 麥芽炒陳皮山查香附炒各一兩砂仁炒半兩

如前法九服。

丹枳實丸八四 專治食積痞塊。

枳實白术

山查麥芽

神曲半夏

各二兩

蒼朮陳皮

各五錢

木香錢半

薑黃三錢

荷葉蒸飯為丸桐子大。每服百丸。食後薑湯下。

醫統大健脾丸八五 又名百穀丸。○徐東皋曰。此方健脾養胃。滋穀氣。除濕熱。寬胸膈。去痞滿。

久服強中益氣。百病不生。

人參白茯苓飯上廣陳皮各二

枳實飯上

青皮朱醋洗

半夏麵炒山查肉

各一兩

白术土炒

穀芽炒一兩白豆蔻炒

廣木香各五錢川黃連一兩六錢同吳茱萸五

右為末用長流水煮

荷葉老米粥。搗丸綠豆大。每服百丸。食前白湯下。○愚按此方雖佳。但脾多畏寒。若非有火。

當去黃連。或仍加炮薑一二兩為炒。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com