

屬二經血虛用當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱小柴胡湯
加山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如不應
用加味八味丸又耳聾膿即停耳用紅綿散麝香散內服柴胡聰耳
湯通氣散如壯盛之人積熱上攻膿水不差紅綿散麝香散不宜
收斂太過也宜三黃散若虫入耳痛將生薑擦猫鼻其尿自出取
滴耳內虫即出用麻油則虫死難出或用炒芝麻枕之虫亦出但
不及猫尿之速也有一小兒患耳膿經年藥不效此腎虛也用六
味丸加桑螵蛸服之即愈

喻嘉言曰人身有九竅陽竅^七眼耳鼻口是也陰竅二前後二陰
也陽氣走上竅而下入陰位則有下泄腹鳴之候陰氣走下竅而
上入於陽位則有室塞耳鳴之候故人當五十以^上腎氣漸衰于
下每^二從陽上逆腎主閉藏不欲外泄因肝木為子疏泄母氣而
散于外是以謀慮鬱怒之火一動陰氣從之上逆耳竅室塞不清

年高之體大率類然較之聾病一天一淵聾病者竅中另有一膜遮蔽外氣不得內入故以開竅為主而方書所用石菖蒲射香等藥及內外攻法皆為此而設至于高年陰氣不自收攝越出上竅之理從無一人言及不知陰氣至上竅亦隔一膜不能越出竅外止於竅中如蛙鼓蚊鑼鼓吹不已以故外入之聲為其內聲所混聽之不清若氣稍不逆上則聽稍輕清氣全不逆上則聽全清矣余悟明此理治高年逆上之氣屢獲奇驗大意全以磁石為主以其重能達下性主下吸又能制肝木之上吸故也而用地黃龜膠群陰之藥輔之更用五味子山茱萸之酸以收之令陰氣自旺於本宮不上觸於陽竅穀入即通無壅礙也方書指為少陽胆厥陰肝二經熱多所致是說左耳分部然少陽之氣能走上竅其穴皆絡于腦巔無觸筋冲耳之理不當與厥陰混同立說其通聖散一方汗下兼用乃治壯火之法丹溪所取亦無確見惟滾痰丸一方

少壯用之多有效者則以大黄、芩沉香之苦最能下氣而礪石之重墜大約與磁石之用相倣也然大損脾胃耗胸中氤氲之氣至於腎虛耳鳴指作膀胱相火上升則陽必能透出上竅不為鳴也尤見丹溪無稽之談高年之人腎水已竭真火易露故腎中之氣易出難收况有厥陰之子為之挹取乎然則壯水以制陽光如盞中加油燈焰自少誠為良法乃云作腎虛治不効豈為老人立法哉收攝腎氣老人之元務以丹溪明哲而為此等議論乎

薛立齋醫案

脾胃虧損吞酸噯腐證

一儒者面色痿黃吞酸噯腐恪服理氣化痰之藥大便不實食少倦怠此脾胃虛寒用六君子加炮姜木香漸愈更兼用四神丸而元氣復此症若中氣虛弱者用人參理中湯或補中益氣加木香乾薑不應送左金丸或越鞠丸若中氣虛必加附子或附子理中

湯無有不驗

一上舍嘔吐痰涎發熱作渴胸膈痞悶或用清氣化痰降火前症益甚痰涎自出余曰嘔吐痰涎胃氣虛寒發熱作渴胃不生津胸膈痞滿脾氣虛弱須用參芪歸朮之類溫補脾胃生發陽氣諸病自退不信虛症甚至余曰飲食不入吃逆不絕泄瀉腹痛手足逆冷是謂五虛煩熱作渴虛陽越于外也脉洪大脉欲絕也死期迫矣果然

陸陳湖母久患心腹痞痛每作必胸滿厥逆面赤唇麻嘔吐咽乾舌燥寒熱不等疑痛無補法迎予折中余曰此寒涼損真之故內真寒而外假熱也且脉弦洪而有怪狀乃脾氣虧損肝脉乘之而然惟當溫補其胃遂與補中益氣加半夏茯苓吳茱萸木香一服而効自病發月餘竟夕不安乃熟寐徹曉脉洪頓斂諸症釋然一婦人年踰二十不進飲食二年矣日餘清茶菓品之類面部微

脾主四肢不用
之氣以手柔
則收伸腫脹
者不可必至其

黃浮腫形骸如常仍能步履但骸倦怠肝脾二脉弦浮按之微而結滯余用六君子木香吳茱下痰積甚多飲食頓進形體始瘦卧床月餘仍服六君之類而安

脾胃虧損停食痢疾等症

羅給事小腹急痛大便欲去不去此脾胃氣虛而下陷也用補中益氣送八味丸二劑而愈此等症候因痢藥致損元氣肢骸腫脹而死者不可枚舉

少宗伯顧東江停食患痢腹痛下墜或用疏導之劑兩足腫脹食少體倦煩熱作渴脉洪數按之微細余以六君加薑桂各二錢吳茱萸五味各一錢煎熱冷服諸症頓退再服全退此假熱而治以假寒也

一老婦因食後怒患痢裏急後重屬脾氣下陷與大劑六君子加附子肉蔻煨木香各一錢吳茱五分骨脂五味各一錢二劑諸症

脾胃症

頃愈惟小腹脹滿此肝氣滯於脾也與調中益氣加附子木香五分四劑而安後口內覺鹹此腎水泛也與六味地黃丸二劑頃安先母年八十仲夏患痢腹痛作嘔不食熱渴引湯手按腹痛稍止脉鼓指而有力真氣虛而邪氣實也急用人參五錢白朮茯苓各三錢陳皮升麻附子炙甘草各一錢服之睡覺索食脉症頃退再劑而安此取症不取脉也凡暴病毋論其脉當從其症時石閣老太夫人年歲脉症皆同彼端治其痢遂致不起

橫金陳梓園年六十面帶赤色吐痰口乾或時作泄就診余曰僕之症或以為脾經濕熱痰火作瀉率用二陳黃連枳實神曲麦芽白朮柴胡之類不應何也余脉之左關弦緊腎水不能生肝木也右關弦大肝木乘脾土也此乃脾腎虧損不能生剋制化當滋化源余謂其甥曰令舅不久當損于痢後果然

脾胃虧損瘧疾寒熱等症

脾虛不用補
中益氣馬能
竟見功效仿此
后而用行氣之
品未見立見危
殆余疑之屢矣

冬官朱省庵停食感寒而患瘧自用清脾截瘧二藥食後腹時或
作痛服二陳黃連枳實之類小腹重墜腿足浮腫加白朮山查吐
食未化謂余曰何也余曰食後脹痛乃脾虛不能消化也小腹重
墜乃脾虛不能升舉也腿足浮腫乃脾虛不能運行也吐食不消
乃脾胃虛寒無火也治以補中益氣加吳茱萸炮姜肉桂一劑諸
症頓退飲食頓加不數劑而痊大凡停食之症宜用六君子枳實
厚朴若食已消而不愈用六君子湯若內傷外感用藿香正氣散
若內傷多而外感少用人參養胃湯若勞傷元氣兼傷食補中益氣加神曲陳皮若氣惱
益氣加川芎若勞傷元氣兼傷食補中益氣加神曲陳皮若氣惱
兼食用六君子加香附山梔若噯酸或食後口酸當節飲食病作
時大熱燥湯以薑湯乘熱飲之此截瘧之良法也夫人以脾胃為
主未有脾胃實而患瘧者若專主發表攻裏降火蕪痰治末而
忘本矣

一儒者秋患寒熱至春未愈胸痞腹脹余用人參二兩生姜二兩
煨熟煎頓服寒熱即止更以調中益氣加半夏茯苓炮薑數劑元
氣頓復後任縣尹每飲食勞倦疾作服前藥即愈

脾胃虧損心腹作痛等症

府庠徐道夫母胃脘當心而劇痛脉右寸關俱無左雖有微而似
絕手足厥冷病勢危篤察其色眼胞上下青黯此脾虛肝木所勝
用參朮茯苓陳皮甘草補其中氣用木香和胃氣以行肝氣用吳
茱散脾胃之寒止心腹之痛急與一劑病悉愈向使泥其痛無補
法而反用攻伐之藥禍不旋踵

脾胃虧損暑濕所傷等症

一儒者每春夏口乾發熱勞則頭痛照清涼化痰藥瀉喘煩躁用
香茹飲神思昏倦脉大而虛此因閉藏之際不遠幃幕為患名曰
注夏用補中益氣去升麻柴胡加五味麥冬炮姜一劑脉益甚仍

用前藥加肉桂五分服之即甦更用六味丸而怪

肝脾虧損頭目耳鼻等症

給事張禹功目赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯苓杏仁山藥山萸五味項愈又勞役復甚用十全大補兼以前藥漸愈却用補中益氣加前藥而怪東垣云諸經脉絡皆走於面而行空竅其清氣散於目而為精走於耳而為聽若心煩事冗飲食失節脾胃虧損心火太甚百脉沸騰邪害空竅而失明矣况脾為諸陰之首目為血脉之宗脾虛則五藏之精氣皆為失所若不理脾胃不養神血乃治標而不治本也

少宰李浦汀耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚此元氣虧損之症五更服六味丸食前服補中益氣項愈此症若血虛而有火用八珍加山梔柴胡氣虛而有火四君加山梔柴胡若因怒遂聾用小柴

日為肝氣上下
隨肝脾升也
作痛服降火
祛風之品而不
效必脾肝之
損而然非宜
症心肝虛不明
虛實其用
治未有不投
人考

胡加芎歸山梔虛用補中益氣加山梔午前甚用四物加木苓久
須補中益氣午後甚用地黃丸

一儒者兩目作痛服降火祛風之藥兩目如緋熱倦殊甚余用十
全大補湯數劑諸症悉退服補中益氣兼六味丸而愈復因勞役
午後目滿體倦服十全大補而痊

脾肺虧損咳嗽痰喘等症

鴻臚蘇龍溪咳嗽氣喘鼻塞流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更
用補中益氣以實腠理而愈後因勞怒仍作自用前藥益甚加黃
連枳實腹脹不食小便短少服二陳四苓前症愈劇小便不通余
曰腹脹不食脾胃虛也小便短少肺腎虛也悉因攻伐所致投以
六君加黃芪炮姜五味二劑諸症悉退再用補中益氣加炮姜五
味數劑全愈

地官李北川每患咳嗽余用補中益氣即愈一日復作用參蘇飲

益甚更服人參散毒散項強口噤腰背反張余曰此誤汗亡津液而變瘵矣仍以前湯加附子一錢四劑而痊感冒咳嗽若誤行發汗過多喘促呼吸不利吐痰不止必患肺癰矣

司聽陳國華素陰虛患咳嗽以自知醫用發表化痰之劑不應因清熱化痰等藥其症愈甚余曰此脾肺虛也不信用牛黃清心丸更加胸腹作脹飲食少思足三陰虛症悉具朝用六君桔梗升麻麥冬五味補脾以生肺金夕用八味丸補命門火以生脾土諸症漸愈經云不能治其虛安問其餘此脾土虛不能生肺金而金病復用前藥反瀉其火吾不得而知也

今人每以三陳脈脈
乃以脾氣不和三陳
宜可安投況肺
為肺藏用藥
手輕清也久矣
如一脈而痰即出
者乃虛痰也則可
以二陳投之

儒者張克明咳嗽用二陳苓連枳殼胸滿氣喘侵晨吐痰加蘇子杏仁口出痰涎口乾作渴余曰清晨吐痰脾虛不能消化飲食胸滿氣喘脾虛不能生肺金涎沫自出脾虛不能收攝口乾作渴脾虛不能生津液遂用六君加炮薑肉果溫補脾胃更用八味丸以

脾肺症

土母而愈

脾肺^腎虧損小便自遺淋瀝等症

考工楊朴菴口舌乾燥小便頻數此膀胱陽燥陰虛先用滋腎丸以補陰而小便愈再用補中益氣六味地黃以補脾腎而安若汗多而小便少或體不禁寒乃脾肺氣虛也

儒者楊文奎痢後兩足浮腫胸腹脹滿小便短少用分利之劑遍身腫脹氣喘余曰兩足浮腫脾氣下陷也胸腹脹滿脾虛作痞也小便短少肺不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補中益氣加附子而愈

痛後而愈腫脹
脾虛此脾肺
腎交損之病
可分利之劑
其虛乎其用
補中益氣或
桂枝九宜矣

大尹顧榮甫尾閭作癢小便赤瀉左尺脉洪數屬腎經虛熱法當滋補不信服黃柏知母等藥年許高骨腫痛小便淋瀝肺腎二脉洪數無倫余曰子母俱敗無能為矣呆沒
余甥凌雲漢年十六庚子夏作瀉發熱吐痰唇燥遍身生疥兩腿

尤多色黯作癢日晡愈熾仲冬腿患瘡尺脉洪數余曰疥腎病也瘡骨疽也皆腎經虛症針之膿出其氣氤余謂火王之際必患瘡症遂用六味十全不二旬諸症愈而瘡症具仍用前藥而愈抵冬娶妻至春其症復作亦服地黄丸數劑煎藥三百劑而愈

脾肺腎虧損遺精吐血便血等症

少宰汪涵齋頭暈白濁余用補中益氣加茯苓半夏愈而復患腰痛用山藥山萸五味草詳遠志利愈又因勞心盜汗白濁以歸脾湯加五味而愈後不時眩運用八味丸全愈

銀臺許函谷因勞發熱作渴小便自愈遺或時閉瀉余作肝火血虛陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥山萸午後服地黄丸月餘諸症悉退

一男子鰥居數年素勤苦勞則吐血發熱煩躁服犀角地黄湯氣高而喘前症益甚更遺精白濁形骸倦怠飲食少思脉洪大舉按皆有

力服十全大補加麥冬五味山萸山藥而愈

一童子年十四發熱吐血余謂宜補中益氣以滋化源不信用寒涼降火愈甚謂余曰童子未室何腎虛之有參芪補氣奚為用之余还丹溪先生云腎主閉藏肝主疏泄二藏俱有相火而其系上屬於心、為君火為物所感則易於動心動則相火翕然而起雖不交會其精亦暗耗矣又精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五藏有不滿之處異日有難狀之疾遂用補中益氣及地黃丸而痊

星士張東谷說命時出中庭吐血一二口云久有此症遇勞即發余意此勞傷肺氣其血必散視之果然與補中益氣加五味麥冬山藥熟地茯神遠志服之而愈曰每服四物黃連山梔之類血益多而倦益甚得公一匕吐血頓止神思如故何也余曰脾統血肺主氣此勞傷脾肺致血妄行故用健脾肺之氣而嚔血歸源耳

三陰五換而用
潤肺丸是也其
元之

脾肺腎虧損大便秘結等症

一儒者大便素結服搜風順氣丸復胸膈不利飲食善消面帶陽色左關尺脉洪而虛余曰此足三陰虛也不信乃服潤腸丸大便秘不實肢體困倦余與補中益氣六味地黃月餘而驗年許而安若脾肺氣虛用補中益氣若脾中鬱結者用加味歸脾若氣血虛者用八珍加肉蓯蓉若脾經津液涸者用六味若發熱作渴飲冷者用竹葉黃芪湯若燥在左腸者猪胆汁導之若肝胆邪侮脾者用小柴胡加山梔郁李仁枳殼若膏粱厚味積熱者用加味清胃散亦有熱燥風燥陽結陰結者當審其因而治之若復傷胃氣多成敗症

一男子五十餘因怒少食大便不利服潤腸丸大便秘結胸膈作痛欲魚服脾約丸肝脾腎脉浮而濡余曰此足三陰精血虧損之症也東垣先生云若人胃強脾弱約束津液不得輸四布但輸膀胱

脫小便數而大便難者用脾約丸若人陰血枯槁內火燔灼肺金受邪土受木傷脾肺失傳大便秘而小便數者用潤腸丸令滋其化源則大便自調矣

一儒者懷抱鬱結復因場屋不遂發熱作渴胸膈不利飲食少思服清熱化痰行氣等劑前症益甚肢體困倦心脾一脈濡滯此鬱結傷脾之更症也遂用加味歸脾湯治之飲食漸進諸症漸退但大便尚濡兩顴赤色此脾腎虛火內傷陰血用八珍湯加肉蓯蓉麥冬五味至三十餘劑大便自潤

脾腎虧損小便不利肚腹膨脹等症

大尹劉天錫內有濕熱大便滑利小便濡滯服淡滲之劑愈加滴瀝小腹腿膝皆腫兩眼脹痛此腎虛熱在下焦淡滲導招陽氣陰無以化遂用地黃滋腎二丸小便如故更以補中益氣加麥冬五味兼服愈

州同劉禹功素不慎起居七情以致飲食不甘胸膈不利用消導
順氣肚腹痞悶吐痰氣逆遂用化痰降火食少泄瀉小腹作痛用
分利降火小便瀉滯氣喘痰服清氣化痰丸小便愈滯大便愈瀉
肚腹脹大肚臍突出不能寢卧六脉微細左寸虛甚右寸短促此
命門火衰脾腎虛寒之危症也先用金匱加減腎氣丸料內桂附
各一錢五分二劑下痰穢甚多又以補中益氣送二神丸二劑諸
症悉退五六日又用前藥數劑并附子之類貼腰臍及湧泉穴寸
脉漸復而安後因怒腹悶惑於人言服沉香化氣丸大便下血諸
症悉至余曰此陰絡傷也辭不治果歿

一男子素不善調攝唾痰口乾飲食不美服化痰行氣之劑胸腹
膨滿痰涎愈甚服導痰理脾之劑肚腹膨脹二便不利服分氣利
水之劑腹大脇痛睡卧不得服破血消導之劑兩足皆腫脉浮大
不及於寸口朝用金匱加減腎氣丸夕用補中益氣湯煎送前丸