

醫
酒
學
心
悟



天都普明子程國鼓鍾齡著

傷寒門

傷寒類傷寒辨

傷寒六經見症法

太陽經症

頭痛

惡風寒

陽明經症

目痛鼻乾

唇焦漱水不欲嚥

脈長

少陽經症

項脊強

喘

身痛 脈浮

四肢拘急 脈伏

發熱



耳聾 胸滿 脇痛 目眩 口苦 嘔吐
寒熱往來 頭汗 盜汗 舌胎滑 脉弦

太陰經病

腹滿痛 肝利 脉沉

少陰經症

口燥咽乾 咽痛 下利清水 日不明

厥陰經症

少腹滿 舌捲囊縮 厥逆 消渴

太陽腑病

口渴溺赤

陽明腑病



潮熱 譫語 狂亂 不得眠 燥渴 自汗
手足心腋下汗 便閉 轉失氣

論裏中之裏

陽明本症用藥法 陽明兼症用藥法

合病併病

並三陰諸症

腹中冷痛 嘔吐清涎沫 下利清穀 但欲寐

踈臥 四肢厥冷 身痛知被杖 囊縮 舌黑而潤

脈沉細無力 吐衄

兩感

傷寒兼症

咳嗽 咽痛 吐血 鼻衄 便濃血 畜血
動陰血 鼻鼻鼻 不能言及語言難出 尿温瘰



身重難轉側 發黃 瘰 斑疹 結胸痞氣 驚悸

臟結 振戰慄 筋惕肉瞤 又手冒心 驚悸

小便不利 遺溺 呃逆 懊憹 欬胃 奔豚

身熱惡寒 身寒惡熱 風溫濕溫 風濕相搏

勞復食復 陰陽易 狐惑 陽毒陰毒 百合病

壞病 熱入血室 陰躁似陽 陽毒似陰 痲

腫 除中 氣上衝心

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋

痲瘋 痲疹 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋 痲毒 痲瘋



傷寒諸方目錄

太陽經症

桂枝湯

加味香薷散

陽明經症

葛根湯

少陽經症

小柴胡湯

太陰經症

大柴胡湯

少陰經症

麻黃湯
柴葛解肌湯



醫方考卷之六

小承氣湯
甘桔湯

太陽腑病

五苓散

陽明腑病

白虎湯

調胃承氣湯

直中三陰諸症

附子理中湯

白通加豬膽汁湯

咳嗽

止嗽散

小半夏加茯苓湯

吐血

大承氣湯

四逆湯
理中安蚘散



南京中醫藥大學圖書館版權所有

犀角地黄湯

畜血

桃仁承氣湯
抵當湯

語言難出

姜蕤湯

發黃

梔子蘗皮湯
茵陳五苓散

瘧

加減小續命湯
三乙承氣湯

斑疹

茵陳蒿湯
茵陳米附湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

三黃解毒湯
犀角大青湯

結胸痞氣

小陷胸湯

半夏瀉心湯

枳實理中丸

筋惕肉瞤

真武湯

呃逆

扁鵲丁香散

懊憹

梔子鼓湯

大陷胸湯
白散



鬱冒

導赤散

勞復

人參三白湯

狐惑

雄黃丸

陽毒

梔子湯

百合病

百合知母湯



壞病

羊肉湯

氣上撞心

瓜蒂散

諸方補遺

姜附湯

桂枝附子湯

保和湯

二陳湯

四物湯

甘草附子湯

入味丸

桂枝加芍藥湯

六味地黃湯

酸棗仁湯

香薷飲

藿香正氣散

補中益氣湯

枳榔散

澤蘭湯

麻黃附子細辛湯

十棗湯

人參膏

當歸補血湯

小青龍湯



南京中醫藥大學
1954
南京中醫藥大學圖書館版權所有

造遙散

歸脾湯

桂枝湯

五味異功散
十全大補湯
代抵當丸



南京中醫藥大學
1664
南京中醫藥大學圖書館版權所有

高方補遺

精製子湯

參茸補

四寶

八味丸

蘇林氏

蘇林氏

蘇林氏

蘇林氏

參茸補

四寶

八味丸

蘇林氏

蘇林氏

蘇林氏

蘇林氏



南京中醫藥大學圖書館版權所有

傷寒類傷寒辨

傷寒者冬令感寒之正病也。類傷寒者與傷寒相似而實不同也。世人一見發熱輒曰傷寒。率爾發表。表之不去。則以和解清涼諸法繼之。其間有對症而即愈者。有不對症而不愈者。有幸愈而垂危復生者。皆由施治之初辨症未明也。夫有一病即有一症。初時錯治。則輕者轉重。重者轉危。即幸安全。性命已如懸縷。大可懼耳。予因著六氣相雜須辨論。提醒斯世。茲更反覆叮嚀。條列于左。俾入門診視。先取而明辨之。初劑不差。勝於救逆良多矣。學者其致思焉。

一。霜降以後。天令嚴寒。感之而即病者。正傷寒也。其症發熱惡

寒頭項痛腰脊強身體痛但脈浮緊無汗爲傷寒脈浮緩有汗爲傷風寒用麻黃湯風用桂枝湯予以加味香薷散代之
隨手而愈

冬時感寒不即發伏藏於肌膚至春因溫氣感觸而發者曰溫病春猶不發至夏因熱氣感觸而後發者曰熱病其症頭痛發熱與正傷寒同但不惡寒而口渴與正傷寒異爾柴葛解肌湯主之

一四時之中有不頭痛發熱卒然惡寒厥冷口鼻氣冷嘔吐痛瀉面青脈遲者中寒也薑附湯主之
一冬時當寒不寒乃更溫煖因而衣被單薄以致感寒而病者

冬温也。冬温之症，夜寒内热，香薷散加清药主之。

夏秋之間，天時暴寒，人感之而即病者，時行寒疫也。亦有時

非寒疫，而其人乘風取冷，遂至頭痛發熱者，名曰感冒。其見

症與正傷寒畧同，但較輕爾。香薷散主之。

夏月有病，頭痛身熱，自汗煩渴者，傷暑也。加減香薷飲主之。

暑症與熱病相似，但熱病初起無汗，暑病初起自汗。熱病脈

盛，暑病脈虛。此為異爾。然有傷暑中暑，開暑之別。治法詳本

門

夏月有病，頭痛發熱，身重腹滿，譫語自汗，兩脛逆冷者，濕温

也。其人常傷於濕，因而中暑，暑濕相搏，名曰濕温。切忌發汗。



汗之名重暘為難治蒼朮白虎湯主之按傷寒發厥脛冷臂亦冷濕溫發厥脛冷臂不冷以此為別

頭痛身熱與傷寒同而其人身重默默但欲眠鼻息鼾語難出四肢不收者風溫也不可發汗加減葶藶湯主之

發熱惡寒似傷寒而脈細身重不能自轉側或頭汗出者風濕也不嘔不渴桂枝加附子湯主之

一病人嘔吐而利或頭痛腹痛惡寒發熱者霍亂也藿香正氣散主之

一病人身熱面赤目脈赤項強獨頭搖卒然口噤背反僵者瘧也無汗為剛瘧有汗為柔瘧加減續命湯主之瘧病有外感

