

本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種



大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

藺茹 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 開寶

芎藭 本經

雲實 本經

蓖麻 唐本

常山蜀漆 本經

土紅山附

藜蘆 本經

○山慈石

參果

木藜蘆 拾遺

附子 本經

無頭

本經

白朮

別錄

眼藥

漏籃子

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

山跋

本經

菟藟

開寶
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經
不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅
羊不吃草附

芫花

本經

莢花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蘘

本經

石龍芮

本經
胡椒菜

毛茛

拾遺
每薑附

牛扁

本經
風建草附

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部第十七卷上

草之六

毒草類四十七種

大黃

本經下品

釋名黃良

本經

將軍

當

火參

吳普

膚如

黃其色也

將軍

大

之號當取其暖快也。吳普曰：推陳致新如戡定禍亂，以致太平，所以有將軍之號。

集解

別錄曰：大黃生河西山谷及隴西二月八月

生黃赤，其葉四四相當，莖高三尺許，三月花黃，五

月實黑，八月采根，根有黃汁，切片陰乾。弘景曰：今

采益州北部汶山及西山者，雖非河西隴西好者，

猶作紫地錦色，味甚苦澀，色至濃黑。西川陰乾者，

勝北部日乾者，亦有火乾者，皮小焦，不如西耐蛙，堪

久。此藥至勁利，粗者便不中服。恭曰：葉子莖並侶。



羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦似宿羊蹄大者乃如盤長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以非者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡川當分別之若取和及深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取湯瀉駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之上番大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如棒二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大者爲枕紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪即古涇原
龍西地與別錄相合

正誤

頌曰謂州出一種羊蹄大黃治疥癩甚効初生苗葉累年長大即葉似商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為上大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂士大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根修治

雷曰凡使細切以文如水旋盛緊重者到片蒸之從巳至未晒乾又酒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次晒乾却酒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸 煑

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒扁鵲苦無毒李當之大寒元素

日味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒杲曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟

本經

平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結

別錄

通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿

甄權

通宜一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘡

大明

瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿

元素

下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚志

怒心下悸氣得消石紫石英菴仁療女子血閉宗奭曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不屑補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽門手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手足厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

肝胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致爲痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元帝常有心中腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方 舊十四新 吐血 衄血 治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熟服取利 張仲景金匱玉函 吐血刺痛 黃一

兩為散每服一錢以生地黄汁一合水 傷寒痞滿 半盞煎三五沸無時服 簡要濟眾方

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也 大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁 熱病譫狂 川大黃 分作二次溫服 仲景傷寒論 五兩剉

炒微赤為散用臘雪水五升煎如 傷寒發黃 方同 膏每服半匙冷水下 聖惠方

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一 升入芒消一兩緩服須臾當利下 傷寒類要 腰

脚風氣 作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿 令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯經

膿惡物即痛止 崔元亮海上方 方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸○衛生寶鑑用皂莢炙膏和丸名墜痰丸

又名全真丸金宣宗服 痰為百病 痰為百病惟水瀉胎

之有驗賜名保安丸 前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二十丸小病五六丸緩病七八十

丸急病一百二十丸溫水吞下即卧勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈 男女諸病 無極丸治婦人

疾數萬也 養生主論 經血不通赤白

帶下崩漏不一腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒
一盞浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒同炒豆
黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸一日
切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空心溫
酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾三物
武當高士孫碧雲方也醫林集要
九治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三九凡中
客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
者以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
圖經
本草
腹中痞塊
煎丸
梧子大每服三十九生薑湯
下吐利為度
腹脇積塊
風化石灰末半斤瓦器炒
一外臺秘要
極熱稍冷人大黃末一兩

炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤帛貼之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗

膏和貼之或加阿魏一二便不利上搶

兩尤妙丹溪心法久患積聚心腹脹滿害食

大黃白芍各二兩為末木九梧子大每脾癖瘕積

湯下四十九日三以知為度千金方

不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋

內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用

舶上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十

歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生

冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之小兒

後再服若不忌口不如勿服聖濟總錄

無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聾或乍痢乍瘥諸狀多

者大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微

朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和

置瓦盆中於大鍋內浮湯上炭火慢煮候至成膏

可丸乃貯器中三歲兒一服七九梧子大日再服

以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加丸若

下重者

用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳

母亦禁之一加木香小兒諸熱大黃煨熟黃芩各

一兩半崔知悌方一兩為末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下骨蒸積熱漸漸

加黃連各三黃九錢氏小兒方黃連

大黃四分以童子小便五六大合煎取四合去滓

空腹分為二服如人行五里再服廣利方赤

白濁淋入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便相火秘結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服

方三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服劉諸痢初起大黃煨熟當歸各二三

河間保命集錢壯人各一兩水煎服

取利或加檳熱痢裏急大黃一兩浸酒半日忽喘

椰集簡方熱痢裏急大黃一兩浸酒半日忽喘

悶絕不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

而復蘇各傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

悶絕而復蘇各傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

而復蘇各傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

水二盞煎一盞熱服
可安 危氏得效方 食已即吐 一兩甘草二錢半

水一升煮半升溫服 婦人血瘕 作痛大黃一兩酒 仲景全置玉函方 二升煮十沸頓服

取利 千金翼 產後血塊 大黃末一兩頭醋半升熬膏丸 梧子大每服五丸溫醋化下良

久當下 千金方 乾血氣痛 好醋一升熬成膏先炙子大固 錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末

睡酒化一丸服大便利一二行紅漏自下 婦人嫁 及調經仙藥也或加香附 董氏集驗方

痛 小戶腫痛也大黃一兩酒一 男子偏墜 作痛大 升煮一沸頓服 千金方 黃末和

醋塗之乾則 濕熱眩暈 不可當者酒炒大黃為末 易 梅師方 茶清服二錢急則治其標

也 丹 小兒腦熱 常欲閉目大黃一分水三合浸 溪纂要 一夜一歲兒服半合餘者塗頂

上乾即再上 暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎 姚和衆至寶方 服之 傳信適用方 胃

火牙痛

口含冰水一口以紙擦蘸大黃末

風熱牙

痛

紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效

效好大黃瓶內燒存性為末早晚揩牙漱去都

下一家專貨此藥兩宮常以數千

風蟲牙痛

齧常出血

漸至崩落口臭極効大黃米泔浸軟生地黃各旋

切一片合定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話惡

引入風

口瘡糜爛

大黃枯礬等分為末

鼻中生

本事方

瘡

生大黃杏仁搗勻猪脂和塗○又方生大黃黃連各一錢麝香少許為末生油調搽聖惠方

仙茅毒發

舌脹出口方

傷損瘀血

三因方雞鳴散治從高墜下木

石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以此藥

推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研

酒一盞煎六分雞鳴時服至曉取下瘀血即愈○

和濟方治跌壓瘀血在內脹滿大黃當歸等分炒