

葛仙翁肘後備急方

三



葛仙翁肘後備急方卷之六

陸六

葛仙翁肘後備急方卷之五

陸五

上海商務印書館五洲書局本



葛山館新刻經方卷之六

上海涵芬樓影印正統道藏本

葛山館新刻經方卷之五



葛仙翁肘後備急方卷之五

陸五

治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六

隱居効方治羊疽瘡有蟲痒

附子八分藜蘆二分末傳之蟲自然出

葛氏療妬發諸癰疽發背及乳方

比灸其上百壯

又方熬粢粉令黑雞子白和之塗縛上以貼
癰小穿練上作小口泄毒氣燥易之神祕
又方釜底上搗以雞子中黃和塗之加少豉

彌良



又方搗黃檗末篩雞子白和厚塗之乾復易
差

又方燒鹿角搗末以苦酒和塗之佳

又方於石上水磨鹿角取濁汁塗癰上乾復

易隨手消

壁五

又方末半夏雞子白和塗之水磨傳並良

又方神効水磨出小品

又方醋和茱萸若搗薑或小蒜傳之並良

一切惡毒腫

蔓菁根一大握無以龍葵根代之乳頭香



葛仙翁肘後備急方

一兩光明者黃連一兩宣州者杏仁四十
九枚去尖用柳木取三四錢白色者各細
剉搗三二百杵團作餅子厚三四分可腫
處大小貼之乾復易立散別貼膏藥治瘡
處佳

葛氏療癰發數十處方

取牛矢燒搗末以雞子白和塗之乾復易
神効

又方用鹿角桂雞屎別搗燒合和雞子白和

塗乾復上



又癰已有膿當使壞方

取白雞兩翅羽肢各一枚燒服之即穿姚

同

又方吞薏苡子一枚勿多

又方以苦酒和雀矢塗癰頭上如小豆

雀五

葛氏若已結癰使聚不更長方

小豆末塗若雞子白和尤佳即差

又方芫花末膠汁和貼上燥復易化爲水

若潰後膿血不止急痛

取生白楸葉十重貼上布帛寬縛之



乳腫

桂心甘草各二分烏頭一分炮搗爲末和
苦酒塗紙覆之膿化爲水則神効

葛氏婦女乳癰妬腫

削柳根皮熟搗火溫帛囊貯熨之冷更易

大良

又方取研米槌煮令沸絮中覆乳以熨上當
用二枚牙熨之數十迴止姚云神効

乳癰方

大黃茵草伏龍肝竈下黃土也生薑各二

分先以三物搗篩又合生薑搗以醋和塗
乳痛則止極驗劉涓子不用生薑用生薑
四分分等余比見用鯽魚立驗此方小品
佳

姚氏乳癰

陸五

大黃鼠糞濕者黃連各一分二物為末鼠
矢更搗以黍米粥清和傅乳四邊痛即止
愈無黍米用粳米並得

又方牛馬矢傅並佳此並消去

小品妬方



黃芩白歛芍藥分等末篩漿服一錢七日
五服若右乳結者將左乳汁服左乳結者
將右乳汁服散消根姚同此方必愈
姚方搗生地黃傅之熱則易小豆亦佳
又云二三百衆療不差但堅紫色者

用前柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈
凡乳汁不得洩內結名妬乳乃急於癰
徐玉療乳中癰癰起痛方

大黃黃連各三兩水五升煮取一升二合
分三服得下即愈

葛氏卒毒腫起急痛方

蕪菁根大者削去上皮熟搗苦酒和如泥
煮三沸急攪之出傳腫帛裹上日再三易
用子亦良

又方燒牛矢末苦酒和傳上乾復易

又方水和石灰封上又苦酒磨升麻若青木
香或紫檀以磨傳上良

又方取水中萍子草熟搗以傳上

又已入腹者

麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水



四升煮取二升分爲再服

若惡核腫結不肯散者

吳茱萸小蒜分等合搗傳之丹蒜亦得

又方搗鯽魚以傳之

若風腫多痒按之隨手起或隱癢方

陞五

但令痛以手摩捋抑按日數度自消

四

又方以苦酒磨桂若獨活數傳之良

身體頭面忽有暴腫處如吹方

巴豆三十枚連皮碎水五升煮取三升去

滓綿沾以拭腫上趁手消勿近口



皮肉卒腫起狹長赤痛名牒

鹿角五兩白歛一兩牡蠣四兩附子一兩

搗篩和苦酒塗帛上燥復易

小品癰結腫堅如石或如大核色不變或作

石癰不消

鹿角八兩燒作灰白歛二兩麤理黃色磨

石一斤燒令赤三物搗作末以苦酒和泥

厚塗癰上燥更塗取消止內服連翹湯下

之姚方云燒石令極赤內五升苦酒中復

燒又內苦酒中令減半止搗石和藥先用



所餘苦酒不足添上用

姚方若發腫至堅而有根者名曰石癰

當上灸百壯石子當碎出不出者可益壯
癰疽瘤石癰結筋癰癰皆不可就針角針
角者少有不_五及禍者也

又癰未潰方

陸五

五

茵草末和雞子白塗紙令厚貼上燥復易
得痛自差

癰腫振熅不可棖方

大黃搗篩以苦酒和貼腫上燥易不過三



即差減不復作膿自消除甚神驗也
癰腫未成膿

取牛耳垢封之即愈

若惡肉不盡者食肉藥食去以膏塗之則愈
食肉方

取白炭灰荻灰等分煎令如膏此不宜預
作十日則歇并可與去黑子此大毒若用
効驗本方用法

凡癰腫用

栝蒌根赤小豆皆當內苦酒中五宿出熬



葛仙翁肘後備急方

之畢搗爲散以苦酒和塗紙上貼腫驗

隱居効方消癰腫

白歛二分藜蘆一分爲末酒和如泥貼上

日三大良

疽瘡骨出

黃連牡蠣各二分爲末先鹽酒洗後傳

葛氏忽得燂疽著手足肩累累如米豆刮汁

出急療之

熬蕪菁熟搗裹以展轉其上日夜勿止

若發疽於十指端及色赤黑甚難療宜按大



方非單方所及

若骨疽積年一捏一汁出不差

熬末膠粘勃瘡上乃破生鯉魚以搗之如
炊頃刮視有小蟲出更洗傳藥蟲盡則便
止差

陸五

六

姚方云燍疽者肉中忽生一黯子如豆粟劇
者如梅李大或赤或黑或白或青其壓有核
核有深根應心小久四面悉腫疱黯紫黑
色能爛壞筋骨毒入臟腑煞人南方人名爲
擒著毒

