

己 11

141

宋
王叔和脈經



脉經卷第七

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十



病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八
重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二



熱病至脉死日證第二十三

熱病損脉死日證第二十四

病不可發汗證第一

少陰病脉細沈數病為在裏不可發其汗

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲

者不可發其汗何以知然此為榮氣不足血微少故也

少陰病脉微一作濡而微弱不可發其汗無陽故也

脉濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上澀反在下

微則陽氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反

躁煩澀則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤



XI

林經卷七

二

昌

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節疼

疼目運惡寒食即反吐穀不得前

一云穀不消化

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足逆冷

欲得蹇卧不能自温

諸脉數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾

一云小便難胞中乾

胃燥而煩其形相象根本

異源

脉濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下

弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得温微弦為虛

不可發汗發汗則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎

沫咽中必乾小便不利心中飢煩晬時而發其形似



北京中醫藥大學圖書館

瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗蹇而苦滿滿一作心痛
腹中復堅

厥不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎穀不得前
諸逆發汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將難全
太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少
其人不嘔清便續自可一日再三發其脉微而惡寒
此爲陰陽俱虛不可復發汗也

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可
復發其汗咽乾燥者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

衄家不可攻其表汗出必額陷脉上促急而緊直視
而不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與禹餘糧圓

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痊

一作瘡下同

冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷

汗出多極發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱

厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其

汗必口傷爛赤病人脉數數為有熱當消穀引食反

吐者醫發其汗陽微膈氣虛脉則為數數為客陽不



南京

中醫藥大學圖書館

能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脉沈煩而喘滿脉沈者病爲在裏反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出又自嘔者下之益煩心懊憹如飢發汗則致瘥身強難以屈伸熏之則發黃不得小便久則發欬唾

太陽病發其汗因致瘥

傷寒脉弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發其汗

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結脊心下痞堅者不可發其汗

少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必

難以強責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道

出或從口鼻或從目出一本作耳目者是為下厥上竭為

難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脉異經病雖

俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於

風因復傷於熱風熱相薄則發風温四肢不收頭痛


身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出謔

言獨語内煩躁擾不得卧善驚目亂無精治之復發

其汗如此者醫殺之也

傷寒濕温其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發

濕温病苦兩脛逆冷腹滿义肯頭目痛苦妄言治在



足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在
身青面色變名曰重暍如此者死醫殺之也

右二前
出醫律

病可發汗證第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周至熱熱一時間益佳但不欲
如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不
得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗而無湯者圓散亦可用要以汗出爲解
然不如湯隨證良

太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯證



陽明病脉遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂枝湯證

夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脉浮虛者當發其汗屬桂枝湯證

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈屬桂枝湯證

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和

也先其時發汗即愈屬桂枝湯證

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下者即

愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏

子湯證

傷寒脉浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯證

陽明病脉浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯證

太陰病脉浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解

表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必

衄衄乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證

脉浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反

青一作小便清者此為不在裏故在表也當發其汗頭痛者

必衄屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯證

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自

出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝

湯證

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪

風屬桂枝湯證



南京中醫藥大學圖書館藏

太陽病下之氣上撞可與桂枝湯不撞不可與之
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風
風府却與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發賁豚氣從少
腹上撞心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯
太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔者屬葛根湯證

太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促者表未
解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗



而喘屬麻黃湯證

太陽與陽明合病喘而肯滿不可下也屬麻黃湯證
太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩
躁頭痛屬大青龍湯脉微弱汗出惡風不可服之服
之則厥筋惕肉瞤此為逆也

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者
大青龍湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利
或噎或小便不利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴
者此寒去為欲解屬小青龍湯證

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久

按之氣不通一作按之不痛鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉

黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不

解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻

黃湯不溺腹滿加噦不治

太陽病十日以去脉浮細嗜卧此為外解設脊滿脇

痛與小柴胡湯脉浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日以後脊脇苦滿嘿嘿不

欲飲食煩心喜嘔或脊中煩而不嘔或渴或腹中痛

或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱

或欬者屬小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足温而

渴屬小柴胡湯證



傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結
外證未去者屬柴胡桂枝湯

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以
三日無證故微發汗也

脈浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗
病發汗以後證第三

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因
轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可
下下之爲逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤
者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足
言陽氣怫鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛
處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐