

十六

古今圖書集成

中華書局影印

第四三九冊

博物彙編

藝術典

醫部

卷三六

三六

姜仲



胃腹門五

方二

內補散
養脾丸
溫胃丸
煎
和胃飲
飲
芍藥枳木丸
理陰煎
參薑飲
穿心參
流氣飲
大黃牡丹
脾艾
散

三台丸

升麻除濕湯

大營煎

小營

大和中飲

括痰丸

消膈煎

溫胃飲

五君子煎

同清心散

又方

內托

又方

一粒金丹

勝金丹

十宣散

封

細辛

桂心各三兩

附子一兩

蜀椒六兩

右十五味爲末白蜜丸如梧子大酒服十九日三

加至三十九弱者飲服此方通治男女集驗無細

莘龍骨

秦綾錦家二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪致腹脹病滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆

吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾

人參

附子炮去皮臍六錢

肉桂

白术各一兩半

厚朴去皮臍製三兩

荳子煨去核一兩三錢

人參

茯苓各四錢

丁香

沉香

木香各一錢半

陳皮

大腹皮

神麆炒各半兩

附子炮去皮臍六錢

麥芽炒

白湯送下食前服

各二錢

生薑十四兩切片焙乾

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼用

白湯送下食前服

生冷物

神應丸

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

乾地黃 薑絲 山茱萸 地麥各五兩 遠志
巴戟天各半兩 麥冬 五味子 甘草 人參
旋覆 石斛 桂心 茯苓 附子各一兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無

所禁

鍼脾丸

治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消雷鳴腹脹

泄痢不止

鍾乳粉三兩 赤石脂 好翹 大麥芽 當歸

黃連 人參 取石斛 龍骨 乾薑 白茯苓

細辛 桂心各三兩 附子一兩 蜀椒六兩

右十五味爲末白蜜丸如梧子大酒服十九日三

加至三十九弱者飲服此方通治男女集驗無細

莘龍骨

秦綾錦家二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪致腹脹病滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆

吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾

人參

附子炮去皮臍六錢

肉桂

白术各一兩半

厚朴去皮臍製三兩

荳子煨去核一兩三錢

人參

茯苓各四錢

丁香

沉香

木香各一錢半

陳皮

大腹皮

神麆炒各半兩

附子炮去皮臍六錢

麥芽炒

白湯送下食前服

各二錢

生薑十四兩切片焙乾

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼用

白湯送下食前服

生冷物

神應丸

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

胃腹門五

方二

內補散

千金方

治男子五勞六絕六絕之爲病皆起於大勞脈虛

外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹

中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不

欲語惄聞人聲

內補散

千金方

下同

治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛腸鳴米穀

不化

黃蠟二兩 巴豆 杏仁去皮尖雙仁 百草霜

乾薑各五錢 丁香 木香各二錢

右先將黃蠟用好酢煮去粗穢將巴豆杏仁同炒
黑烟盡研如泥將黃蠟再上火入麻油半兩鎔開
入在杏仁巴豆泥內同攪旋下丁香木香等藥末
研勻搓作挺子油紙裹了旋丸用每服三五十丸

溫米飲送下食前日進三服

五福飲

景岳全書下同

治三陰氣血俱虛治節不行而胃痞腹脹者

人參 熟地各隨宜 當歸二三錢 炙草一錢

白术炒一錢半

右水鍾七分食遠溫服或加生薑三五片

大營煎

當歸二三錢或五錢 熟地三五七錢 枸杞子

杜仲各二錢 炙草 肉桂各一二錢 牛膝錢半

右水鍾七分食遠溫服

小營煎

熟地二三錢 當歸 白芍藥酒炒 山藥炒

枸杞各二錢 炙甘草一錢

右水鍾半煎七分食遠溫服

和胃飲

治寒濕傷脾腹滿腹痛

陳皮 厚朴各錢半 乾薑炮一二錢 炙草一錢

右水鍾半煎七分溫服
排氣飲

治氣逆食滯胃腹脹痛

陳皮 薤香 枢殼各錢半 木香七分或一錢

香附 澤瀉 烏藥各二錢 厚朴一錢

右水鍾半煎七分熱服

大和中飲

治氣逆食滯胃腹脹痛

陳皮一二錢 枳實一錢 山楂 麥芽各二錢

砂仁五分 厚朴

右水鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

陳皮 茯苓 厚朴各錢半 甘草五分 山楂

扁豆炒各一錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆胃腹脹滿

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢半 砂仁七分

蘇葉 芍藥各一錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

廓清飲

治三焦壅滯胃膈脹滿或肚腹單脹氣實等證

白芥子五七分或一錢 枳殼二錢 茯苓連皮

澤瀉各二三錢 陳皮 蘿蔔子生一錢不取能減之

厚朴錢半 大腹皮一二錢

右水鍾半煎七分食遠溫服

掃蟲煎

治諸蟲上攻胃腹作痛

青皮 小茴香炒 吳茱萸各一錢 甘草八分

檳榔 烏藥各錢半 細榧子敲碎三錢 侏砂

雄黃各五分並研極細 烏梅二箇

右除侏砂雄黃一味餘八味水鍾半煎八分去查
隨入二味再煎三四沸攪勻徐徐服如惡心加炒

乾薑一二錢或先啖牛脯少許俟茶頃頓服之妙

十香丸

治氣滯寒滯諸痛

木香 沉香 小茴香 香附酒炒 荔核煨焦

澤瀉 烏藥 陳皮 丁香各等分 皂角燒煙盡

右爲末酒糊丸彈子大者磨化服小者湯引下

芍藥枳朮丸

治食積痞滿小兒腹大脹滿疼痛脾胃不和

白术炒 赤芍藥酒炒各二兩 枳實炒

陳皮各一兩

荷葉湯羹老黃米粥爲丸桐子大米飲白湯任下

百餘丸

括痰丸

治一切停痰胃脹腹脹悶疼痛等證

陳皮四兩切用鹽二錢入水中拌浸一宿曬乾

半夏製 白芥子 猪苓各二兩 炙甘草五錢

乾薑炒黃一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服錢許白湯下

如胃脹疼痛者加台烏藥二錢

神香散

治前證諸藥不效者
丁香 白豆蔻或可砂仁

右等分爲末白湯調下五七分甚者一錢日數服
不拘若寒氣作痛者薑湯下

獨蟲丸

治蟲積會腹脹痛
乾漆炒烟盡 雄黃微炒 蕤夷 雷丸 桃仁

皂角燒烟盡 錫灰 檳榔 史君子各等分
輕粉減半 細榧肉加倍

右爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服五七分白湯
陸續下如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同
百順丸

治一切積滯會腹脹痛
錦紋大黃一斤 牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末湯浸蒸餅丸菉豆大每用五分或一二三
錢酌宜用引蜜丸亦可
大分清飲

治熱閉腹痛
茯苓 淨瀉 木通各二錢 猪苓 車前子
桔子或倍之 枳殼各一錢

右水鍾半煎八分食遠溫服
如內熱甚者加黃芩黃蘗草龍膽之屬
如大便堅鞭脹滿者加大黃二三錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各錢半
清膈煎

治瘧因火動氣壅腎滿煩渴
陳皮錢半 貝母敲碎二三錢 白芥子五七分

右水鍾半煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃蘗草龍膽之屬
如大便堅鞭脹滿者加大黃二三錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各錢半
清膈煎

治瘧因火動氣壅腎滿煩渴
陳皮錢半 貝母敲碎二三錢 白芥子五七分

膽星一二錢 海石 木通各二錢
右水鍾半煎七分溫服
六味回陽飲

治陰陽將脫會腹畏寒膨脹
炮乾薑各二三錢 當歸身三錢如淮葛或勸血者以冬木代

人參一二兩或數錢 炙甘草一錢 製附子
熟地五錢或一兩

右水鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治前證

熟地黃三五七錢或一二兩 炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃色一二三錢

右水鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢
養中煎

治中氣虛寒胃滿嘔瀉
人參一二三錢 白扁豆炒二三錢 山藥炒

茯苓各二錢 乾薑炒黃一二錢 炙甘草一錢

右水鍾煎七分熱服

溫胃飲

人參 白朮各一二三錢或一兩 扁豆炒二錢

乾薑炒焦一二三錢 當歸一二錢淮葛者勿用 炙草
陳皮各一錢此味或不用

右水鍾煎七分熱服

乾薑炒黃一二錢
右水鍾八分溫服
參薑飲

治前證

乾薑炮五分或一二錢或用煨生薑三五片亦可
人參三五錢或倍之 炙甘草三五分

右水鍾半煎七八分徐徐服之此方陳皮量及狀

荅皆可酌而佐之
胃關煎

治脾腎虛寒腹痛不止
熟地三五錢或一兩 山藥炒

扁豆炒各二錢
焦乾薑 白朮炒各一二三錢
炙甘草一二錢

吳茱萸製五七分

右水鍾煎七分食遠溫服
聖木煎

治脾胃虛衰痞脹甚者卽以此煎送神香散最妙

白朮五六錢至一兩 乾薑炒
肉桂各一二錢
陳皮酌用或不用

右水鍾半煎七分溫服

右水鍾半煎七分溫服
內固清心散淮葛全書下同

粉甘草 升麻 當歸 川芎 黃芪 白芍藥
山梔仁 乳香 黃芩 羌活 桔梗 天花粉

青皮 白芷

中醫藥大學圖書館版權所有

沉香 丁香 木香 蕃香 麝香 藥仁各等分

右辰砂末一錢金箔五片同研燈心薄荷煎湯下

內塞散

治穿心冷瘻

人參 白朮 白茯苓 熟地黃 甘草 茯苓
黃芪 肉桂 當歸 黃芩酒炒 桔梗 防風

右水煎服連服十貼常服黃藥丸護心散

六合回生丹

治前證有回生之妙

鉛粉一兩 輕粉 銀硃 雄黃 没藥炙黃

乳香炙黃各二分五釐

右六味各擇真正好者研爲極細末凡治其病先

用好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾後剖猪腰子片用

藥一二分摻腰子上却敷患上待腰子發熱如蒸

良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不

可手擦第二日依前法再敷之第三日亦敷之惡

甚可敷七八九次瘡小只敷一次可愈猪腰子不

發熱勿治矣

治心胃前有漏孔久不愈并治胃癰并疽心肝癰

鹿茸去毛酥炙微黃 附子炮去皮臍 鹽

右三味各等分爲末用棗肉去皮核爲丸每服三

十九空心酒下

發腎煎藥

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 金銀花

連翹 生地 白芍 山梔 黃芩 天花粉

桔梗 防風 青皮 菖葛 麥冬 鼠黏子

右水煎服各加官桂夏加黃芩再加澤瀉

六皮四子湯

治發肚毒

陳皮 青皮 腹皮 五加皮 薑皮 茯苓皮

花粉 蘇子 萍子 甘草 莢蓼子 車前子

右水煎服

壯瘧方

厚朴 砂仁 半夏 陳皮 人參 白茯苓

青皮 茴薑 木香 枳殼 甘草 甜瓜子

黃芪 白朮

右水煎服

內托流氣飲

治肋肚癰

人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇葉

桔梗 枳殼 官桂 檳榔 烏藥 天花粉

芍藥 白芷 川芎 防風 當歸

右薑三片棗一枚水煎服

薏苡附子敗醬散景仲

治腸癰有膿者

薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

右三味杵爲末取方寸匕以水一升煎減半頓服

小便當下

治前證

生地黃五兩 牡丹皮 甘草 敗醬 生薑

茯苓各二兩 桔梗 薏苡仁 麥門冬各三兩

丹參 茴薑各四兩

右十一味咬咀以水一斗煮取一升分三服日三

又方

治前證

薏苡仁一升 丹皮 桃仁各三兩 瓜瓣子一升

右四味咬咀以水六升煮取一升分再服

大黃牡丹湯

治腸癰

大黃四兩 牡丹三兩 芒硝二兩 瓜子一升

桃仁五十枚

右五味咬咀以水五升煮取一升頓服當下腹血

奪命丹

治諸般腫毒疔瘡惡瘻

硃砂三錢 白礬枯 寒水石 銅綠 滴乳香

明沒藥 麝香各一錢 蝎牛三十一粒另研

蟾酥 輕粉各五分

右爲細末丸如菜豆大如不就加好酒糊每服一

九生葱三五莖嚼極爛吐於手心包裹在內熱酒

和葱送下如重車行五七里許汗出爲效重者再

服一二丸

勝金丹

治前證

麝香 白砒製各五分 雄黃 辰砂 滴乳香

明沒藥 血竭各錢半 全蠍泡炙 穿山甲炙

天龍去頭足炙各三錢 白僵蠶炙去絲五錢

右爲細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下

取汗爲度



一粒金丹

治前證

沉香 木香 滴乳香各五分 巴豆霜錢半

右爲細末和勻用黑肥棗箇半去皮搗爛爲丸如

艾實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次

胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水

一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

一名真人活命飲治一切癰疽未成膿者內消已

成膿者卽潰止痛消毒之聖藥也

滴乳香研 防風 香白芷 赤芍藥 當歸尾

貝母 明沒藥研 皂角刺炒 花粉 甘草節

穿山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢

右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十

茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令

泄氣煎至三大鍾去滓作三次服接連不斷隨瘡

鐵器服後側睡覺痛定回生

治一切潰瘍并老弱人之病

人參 肉桂 生地酒洗蒸焙 川芎 白芍炒

白茯苓 白术土炒 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌

右作一劑木二鍾薑棗煎服

治一切癰疽 十宣散

厚朴 桔梗 官桂 白芷各一兩
右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數

服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下

封臍艾督脉同

治臍腹冷痛或泄瀉

陳艾葉 蟭牀子各一兩 木龍子二箇帶殼生用

右爲末和勻用綿包裹安在臍上以紙圈圍定以

熨斗火熨之爲妙

代灸塗臍膏 治下元虛寒臍腹冷痛

大附子 馬蘭子 蟭牀子 木香 吳茱萸

肉桂各等分

右爲末入白麪薑汁調稠作片貼臍上以帛包繫

定痛三香飲 治臍癰

乳香 香附 木香 延胡索 人參 黃芪

當歸 川芎 芍藥 防風 官桂 香白芷

桔梗 枳殼 烏藥 厚朴

右薑三片棗一枚煎服夏天去桂加乾葛黃芩生

地麥冬

治臍癰 何首烏

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花

枸杞子 苦參 威靈仙各半兩

右爲細末每服三五錢食後溫酒調下或茶清或蜜水亦得日進二服

單方

心腹冷痛男子病令女人取水一盃飲之女人病令

男子取水一盃飲之附後

薰油點火燒於點上清急

攬腸沙痛陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草

牽肚心痛畫地作王字撮取中央土水和升服良

急心痛五十年陳壁土枯礬一錢爲末蜜丸艾湯服

腸癰死人塚上土作泥塗之良方

中惡心痛鑄墨二錢熱小便調下千金

卒心氣痛鑄墨二錢熱小便調下千金

心氣刺痛自然銅火煅酢淬九次研末熱水一盞調下千金

即止衛生易

小兒腹脹肚皮青色並用胡粉鹽熬色變以摩腹上

血氣攻心痛不可忍蓼根剉酒浸服之差門

婦人心痛急者好官粉爲末葱汁和丸小豆大每服

七九黃酒送下卽止粉能殺蟲葱能透氣故也人方

痰結胸中不散密陀僧一兩酢水各一盞煎乾爲末

每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐

出痰涎爲妙方

心腹煩滿及胃脅痛欲死者比輪錢二十枚水五升

糞三升分三服附後

急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熱入酢一椀衝服方

中惡心痛或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服當吐惡物愈葛根葉性論

走注氣痛車缸燒赤濕布裹熨病上千金

心腹脹堅痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定

寒氣心痛三十年者射罔食茱萸等分爲末蜜丸麻子大每酒下二九日三服劉國英所祕之方范汪東陽方

男婦心痛用硃砂明礬枯等分爲末沸湯調服清元

心痛有蟲先花一兩酢炒雄黃一錢爲末每服一字溫酢湯下乾坤生意

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨

一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇燈上燒存性爲末溫酒服立效清元

諸心腹痛焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入皆

胃痛徹背心腹痞滿氣不得通及治癰嗽大苦姜去瓢取子炒熟和殼研末麵糊丸梧子大每米飲下二

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

三十九日一服杜王方

二日以飯飼之收糞曝燥爲末溫酒服方寸匕日三

心痛用豨莶草搗汁酢和服之效有人服此吐蟲二條終身不發

血痢腹痛膩粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和九葉豆大每服七丸或十九艾一圓水一盞煎

又方當歸爲末酒調服方寸匕外臺

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取七合食後服之錢

血痢腹痛膩粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和九葉豆大每服七丸或十九艾一圓水一盞煎

腸痛如打用大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

夏秋之交露坐夜久腹中痞如羣石在內用大豆半升生薑八片水三升煎一升已來頓服瘥經驗

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

心痛陳神鞠一塊燒紅淬酒一大椀服之清元

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

冷氣心痛燒酒入飛鹽飲即止

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

食積心痛陳神鞠一塊燒紅淬酒一大椀服之清元

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

服即止

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

陰毒腹痛燒酒溫飲汗出即止

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

附後

心腹宿積及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餌

女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈王機義

冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸麻子

大每服二十九食前石菖蒲生薑湯下直指

心痛氣滿心膈不利枳實一錢欃炒微黃爲末非時

以清粥飲調下二錢聖惠

卒熱心痛生麻油一合服之良方

胃痺氣滿心膈不利枳實一錢欃炒微黃爲末非時

以清粥飲調下二錢聖惠

心痛不瘥數十年者黍米淘汁溫服隨意經驗

心痛不瘥數十年者黍米淘汁溫服隨意經驗

蛔蟲心痛薏苡根一斤切水七升煮三升服之蟲死盡出也梅氏活人全書

腫滿腹四大肢枯瘦尿澀用甜葶苈炒蕷菜根等分

爲末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下只二三丸小便清十餘丸腹如故三因

心腹虛手不厭逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒爲末米飲服二錢一日二服

大有功效忌鐵器生冷普濟

腹脹黃腫用亞腰牽盧連子燒存性每服一箇食前

溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效簡便

心下急痛桑耳燒存性熱酒服一錢集備

胃痺痛如錐刺不得俛仰自汗出或微背上不治或

至死可取生韭或根五斤洗搗汁服之本草

心急痛牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮鬚搗膏以匙送入咽中灌以麻油四兩但得下咽即甦少

項蟲積皆化黃水而下未不再發累得救人

堂方

腹皮麻痺不仁者多煮葱白食之卽自愈

危氏方

心痛吐水不下飲食發止不定雖黃二兩酢一斤慢

火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下

聖惠

陰毒腹痛厥逆脣青卵縮六脈欲絕者用葱一束去根及青留白二十寸烘熱安臍上以熨斗火熨之葱壞

則易之良久熱氣透入手足溫有汗卽瘥乃服四逆

湯若熨而手足不溫不可治

活人

胃痛瘞而復發薤根五升搗汁飲之立瘥

附後方

奔豚氣痛薤白搗汁飲之

附後方

積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手見效濃羹

小蒜食飽勿著鹽會用之有效再不發也

血逆心痛生蒜搗汁服一升卽愈

鬼疰腹痛不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大搗和

醬汁一合頓服

鈴方

心腹冷痛小蒜酢浸至三四年蒜食至數顆其效如

乾乳香五分同搗丸芥子大每服七丸乳汁送下

得效

神方

臍下絞痛芥子末蜜丸梧子大井華水寅時下七丸

方

申時再服

千金

心腹積痛三月三日采桃花曬乾杵末以水服二錢

七良本草

腹冷氣起白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小豆大每薑湯吞十九甚妙

續傳

大每薑湯

方

卒患腹痛山豆根水研汁半盞服之

經驗

心腹惡痛艾葉搗汁飲之

藥性

心痞噦心下痞堅用生薑八兩水三升煮一升半

千金

夏五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再服

腹中賁滿綿裹煨薑內下部冷卽易之

梅師

凡心腎脅下有邪氣結實硬痛脹滿者生薑一斤搗

查留汁慢炒待潤以絹包於患處款款熨之冷再以

汁炒再熨良久豁然寬快也

陶華傷寒褪出

虻蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰乾方寸匕

日三服

外臺

心腹結氣杏仁桂枝橘皮訶藜勒皮等分爲丸每服

三十九白湯下無忌

王武

心腹脹痛短氣欲絕者烏梅二七枚水五升煮沸納

大錢二七枚煮一升半頓服之

附後方

卒然心痛桃仁七枚去皮尖研爛水一合服之

人有氣從臍左右起上衝胃滿氣促鬱冒厥者用梨

木灰伏出雞卵殼中白皮紫菀麻黃去節等分爲末

糊丸梧子大每服十九酒下亦可爲末服方寸匕或

血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子

曝乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十九

仲景

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之

候也大青爲末納口中以酒送下

保幼大

又方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神

九腫心痛及腹脅積滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟

盡研末酢煮麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒

全方

金

心氣疼痛白芨石榴皮各一錢爲末煉蜜丸黃豆大

水

研末每用二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服

金

大

中

醫

書

卷一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

一百四

醫

部

醫

門

第四百四冊

之〇四

藥

卷

汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽漿水下十九
又方用半夏酢煮過以皂角膏和勻入明礬少許以

柿餅搗膏丸如彈子大噙之名釣痰膏聖惠方

腹滿癆堅如石積年不損者必效方用白楊木東枝

去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋

盛津還納酒中密封再宿每服一合日三服外臺秘要易簡方

脾痛不止荔枝核爲末酢服一錢數服卽愈易簡方

傷寒痞滿陰病下早成痞按之虛軟而不痛檳榔枳

實等分爲末每服二錢黃連煎湯下宣明方

蛔厥腹痛已經汗下後者檳榔二兩酒一盞煎一盞

心脾作痛雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同

以水煎服之指直

天行病四五日結胷滿痛壯熱苦參一兩以酢三升

煮取一升二合飲之取吐卽愈外臺秘要

腹內虛冷生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐顏黑髮

明日令人思飲食指直

心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗卽

止孫真入方
神方

冷蟲心痛川椒四兩炒出汗以酒一椀淋之只服酒

清服水即止瑞竹堂方

陰證腹痛桑甚絹包風乾過伏天爲末每服三錢熱

和丸麻子大每服二丸吞下其痛卽止

卒熱心痛黃連八錢咬咀水煎熱服外臺秘要

肝火爲痛黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三

十九白湯下

又方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗爲二丸
服之取吐利附後

心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒孟試

心下大痛用川椒四十九粒乳香一錢研勻男用生薑女用當歸酒下毒城

又方用椒五分沒藥三錢研細分二服溫酒下楊氏產乳

心腹冷痛吳茱萸五合酒三升煮沸分三服楊氏產乳

冷氣腹痛吳茱萸一錢擂爛以酒一鍾調之用香油一杯入鍋煎熱傾茱萸酒入鍋煎一滾取服立止唐經驗

腸癰已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用括瓜子一合當歸炒一兩蛇蛻一條咬咀每服四錢水一盞半煎一盞食前服利下惡物爲妙聖惠方

腹中緊脹白糖以酒二升熬服之不過再服子母秘錄

急心疼痛用黃蠟燈上燒化九芥子大百草霜爲衣井水下三丸

陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白五十同研爲丸

男女右著手中握陰臥之汗出卽愈方下

心痛用五倍子生研末每服一錢鐵杓內炒起

煙黑色爲度以好酒一鍾傾入杓內服之立止經驗方

老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚而綠背者去瓢四兩分作四分一兩用蒼术一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼爲末以四味煎汁煮麪糊爲丸梧子大每食後米飲下五十九王氏易簡方

冷熱腹痛病刺不思飲食山梔子川烏頭等分生研爲末水糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯下博濟方

腹脅刺痛因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鉤子一合培

檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五

沸分二服聖惠方

酒下取汗方集簡

卒脅痛根實搗末湯服方寸匕日三夜一劑附後

蛇咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十寸剉以

水一石煎至一斗去滓煎如餚隔宿勿食空心服一

升蟲卽下也仍常煮汁作飯食

心脾痛芭蕉花燒存性研鹽湯點服一錢華日

傷寒後卒脅膈癆痛枳實麴炒爲末米飲服一錢日

亦可爲末聖惠方

產後腹痛枳實麴炒芍藥酒炒各一錢水一盞煎服

亦可爲末聖惠方

老幼腹脹氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚而綠背者去瓢四兩分作四分一兩用蒼术一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼爲末以四味煎汁煮麴糊爲丸梧子大每食後米飲下五十九王氏易簡方

冷熱腹痛病刺不思飲食山梔子川烏頭等分生研爲末水糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯下博濟方

腹脅刺痛因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鉤子一合培

檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五

沸分二服聖惠方

卒心刺痛榔李仁三十七枚嚼爛以新汲水或溫湯下

須臾痛止却呷薄荷鹽湯至寶方

胃脅氣逆張滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎

清服水即止瑞竹堂方

卒忽心痛二年頭帶沸湯淋汁飲之以錠覆頭於閑

地周時卽愈方

聖惠

惡氣心痛破網巾燒灰一錢猫屎燒灰五分溫酒服

馬氏

諸蟲心痛吐清水鰻鱺淡煮飽食三五度卽差

外臺

心脾氣痛氣實有痰者牡蠣殼粉酒服一錢

丹溪

心法

心氣疼痛真蛤粉炒香附末等分白湯淬服

聖惠

心脾痛不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可

以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以

孫

烏沉湯寬中散之類調服二錢不傳之妙

集

膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢

酒下

甚效

氏

卒然心痛白雞一頭治如食法水三升煮一升去雞

煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香

二豆許頓服之

附後

陰毒卒痛用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取汗

寒

要 蔡
陰毒腹痛雞糞鳥豆地膚子各一把亂髮一團同炒

煙起傾入好酒一椀浸之去滓熱服卽止

生

今

硬物三四日立效

集 童

心氣作痛雞子一枚打破酢二合調服

附後

心氣口吐清水以雞子一枚去黃納好漆入雞

子殼中和合仰頭吞之蟲即出也

古今

陰證腹痛面青甚者鳩子糞一大抄研末極熱酒一

錢

劉

蟲和勻澄清頓服卽愈

劉

蟲腹痛白鵝屎研飲和服之

外臺

要

冷氣心痛鴿屎燒存性酒服一錢卽止

血氣刺痛用五靈脂生研三錢酒一盞煎數沸熱服

靈苑

卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾薑炮三分爲末熱酒

方

石菖蒲調服三錢作餅用豬肉一二片

海上

仙方

心脾蟲痛不拘男女用五靈脂檳榔等分爲末水煎

服立愈

廣記

菖蒲調服三錢作餅用豬肉一二片

附後

人

蛔蟲攻心刺痛吐清水草龍膽一兩去頭剉水一盞

奏

一盞隔宿勿食平旦頓服之

聖惠

急心疼痛猪心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

中蟲腹痛支太醫祕方以猪肝一具蜜一升共煎分

二十服或爲丸服

附後

方

胃腹冷痛猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三

服

攬腸沙痛用母猪生兒時拋下糞日乾爲末以白湯

調服

脾胃虛冷腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥

頻食一兩頓

鏡

心

血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕刷開

以籠子排丸菜豆大蛤粉滾過每服四十九以鐵淬

酒送下痛立止

方

經驗

心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒

灰酒服未斷根

集 放

蛹蟲心痛用六畜心生切作四瓣縱橫割路夾硃砂

方

附

急肚疼病用本人頭髮三十根燒過酒服卽以水調

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

乳汁調下

聖惠

芥子末封在臍內大汗如雨卽安

談

坐

翁

絞腸沙痛童子小便服之卽止

聖惠

小兒腹痛廣蟲炙芍藥芎藭各二錢爲末每用一字

</

脾寒氣發歇痛不可忍者茱萸桃仁各一兩和炒令

茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖
煨以酒浸溫分三服容驗方

心痛累效方冰梅一箇去核生硫黃爲末相和搗勻
以可丸爲度作一丸白湯下立愈病不再作

治內癰未作頭者用伏雞屎服之卽瘥千金方

脾冷腹痛嘔吐乾薑炒三錢甘草炙半錢棗一枚同

煎服或爲末和飲服直指方

又方七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕

日三卽瘥氏崔

疰心痛用桃白皮煮汁空腹以意服

暴心痛苦參十斤㕮咀以水一石煮取二斗去滓下
苦酒一斗更煮取五升加大黃末熬和汁中煎令可
丸併手丸之如梧子大每服以酒一升進三四十九
日一當倒腹吐不吐下利更酒漬苦參二斤浸久彌
佳非止暴痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷血結
陰癖頻用有效大良

又方桂心一兩㕮咀以水四升煮取一升半分三服
蟲心痛用鶴蠚爲末蜜丸如梧子大服四十九蜜湯

下日一服可加至五十九慎酒肉

腸癰雄雞頂上毛并屎燒存性爲末空心酒服之
又方截取檐頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血

凡陽癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞
臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方
用馬蹄灰以雞子白和塗卽拔氣不過再取愈

內癰馬牙灰以雞子白和塗之乾則易

腸癰瓜子仁三升搗末以水三升煮取一升五合分
寸白蟲心胃痛狼牙五兩搗末蜜九麻子大隔宿不
作三服

夜食明日以漿水下一合服盡愈

一切心痛無問新久生地黃一味隨人所食多少搗

汁搜麪作餌或冷淘食良久當利出蟲海上方



南京中醫藥大學圖書館版權所有
中醫藥大學 1951

胃腹門六

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百五卷

醫部彙考一百八十五

胃腹門六

鍼灸

素問曰中滿者瀉之於內

心病者胃中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛虛則

胷腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下

血者其變病刺郄中血者

病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之

肺絡季脅引少腹而痛脹刺諭譜

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒取其經厥陰與少陽

脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陽

腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風虛則胷中陰血者

痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者

陽明之厥則癲疾欲走腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言太陰之厥則腹滿脹脹後不利不欲食食

則嘔不得臥少陰之厥則口乾渴亦腹滿心痛厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼溲不利好臥屈膝陰縮腫脢內熱盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之

厥陰厥逆急擊心痛引腹治主病者

厥陰厥逆腰痛虛滿前閉讞言治主病者

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

靈樞經曰心痛引腰脊欲嘔取足少陰

心痛腹脹嗇然大便不利取足太陰

心痛引背不得息刺足少陰不足取手少陽

心痛引小腹滿上下無常處便溲難刺足厥陰

心痛但短氣不足以息刺手太陰

心痛當九節刺之按已刺按之立已不已上下求之得之立已

厥心痛與背相控善控如從後觸其心僵僂者腎心

痛也先取京骨崑崙發鍼取然谷

厥心痛腹脹脅胷滿心尤痛甚胃心痛也取之大都太白

厥心痛甚者脾心痛也取之然谷太谿

厥心痛如以錐刺其心心痛甚者脾心痛也取之行間太衝

厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也取之

厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心

痛也取之魚際太淵

厥心痛不可刺者中有盛聚不可取於肺

腹中常鳴氣上衝胷悶不能久立邪在大腸刺盲之邪在腎則病骨痛陰痹腹脹腰痛大使難取之湧泉崑崙視有血者盡取之

邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也

原巨虛上廉三里

厥逆腹脹滿腸鳴胷滿不得息取之下脅二脅欬而動手者與背脰以手按之立快者是也厥而腹嚮嚮然多寒氣腹中穀穀便溲難取足太陰腹滿食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰蛟蛇也以手按聚而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼也慈腹懷痛形中上者小陽控牽引腰脊上衝心邪氣盛則厥逆上衝陽胃當脅而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過得取委中央三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留卽爲脹取委陽邪在脾胃則病肌肉痛陽氣不足陰氣有餘則寒中邪在肺則病骨痛陰痹腹脹腰痛大使難取之湧泉邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也

腹中常鳴氣上衝胷悶不能久立邪在大腸刺盲之邪在腎則病骨痛陰痹腹脹腰痛大使難取之湧泉崑崙視有血者盡取之

原巨虛上廉三里

厥逆腹脹滿腸鳴胷滿不得息取之下脅二脅欬而動手者與背脰以手按之立快者是也厥而腹嚮嚮然多寒氣腹中穀穀便溲難取足太陰腹滿食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰

邪之所在皆爲不足中氣不足漫便爲之變腸爲之苦鳴補足外踝下留之

甲乙經曰胷滿痛璇璣主之

暴張胷脅滿足寒大便難面脣白時時嘔血太衝主之

胷脅滿痛引胷中華蓋主之

胷脅滿惡聞人聲木音巨虛上廉主之

胷脅滿喘逆不適呼吸少氣喘息不得舉臂步廊主之

胷脅滿痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之

胷脅背相引痛心下胷中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胷脅滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胷脅背相引痛心下胷中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胷脅滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胷脅滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胷脅滿寒如風吹狀俠谿主之

胷脅滿却引背痛臥不得轉側胷鄉主之

大氣不得息息卽胷脅中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之

胷中痛天容主之

胷脅滿勞宮主之

胷脅滿不得息頭領腫陽谷主之

胷脅滿頭痛項內寒熱外丘主之

胷脅滿凍瘻引臍腹痛短氣煩滿巨闕主之

胷脅滿不得息欬逆乳癰灑浙惡寒神封主之
胷脅滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步廊主之

胷脅滿惡聞人聲木音巨虛上廉主之

胷脅滿喘逆不適呼吸少氣喘息不得舉臂步廊主之

胷脅滿惡聞人聲木音巨虛上廉主之

胷脅脹滿喘息不知食味氣戶主之

頭痛食不下腸鳴臍脹欲嘔時泄三焦俞主之
腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中脘主之
腸鳴相逐不可傾倒承滿主之
腸中常鳴時上衝心灸臍下

腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中脘主之
多臥善睡胷滿陽鳴三間主之

腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠脣急大樞主之

腹中腸鳴盈盈然食不化胷痛不得臥煩熱中不嗜食胷脅滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽面黃骨立主之

頭痛食不下腸鳴臍脹欲嘔時泄三焦俞主之
腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中脘主之
腹脹腸鳴盈盈然食不化胷痛不得臥煩熱中不嗜食胷脅滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽面黃骨立主之
通谷及章門及曲泉與膈腧期門食竇陷谷石門等

主胃脅支滿

大杼及心俞主胃中鬱鬱

本神及顙息主胃脅相引不得傾側

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主胃腹中大熱不安腹有大氣暴張滿脅閉淫滌

神堂主胃腹滿

三間主胃滿腸鳴

陽谿及天容主胃滿不得息

期門及缺盆主胃中熱息貴脅下氣上

曲池及人迎與神道章門中府臨泣天池璇璣府輪主胃中滿

支溝主胃脅急痛

豐隆及丘墟主胃痛如刺

臨泣主季脅支痛胃痺不得息

陽輔主胃脅痛

然谷主胃中寒欬唾有血

環跳及至陰主胃脅痛無當處腰脅相引急痛

太白主胃脅脹切痛

大鍾主胃喘息脹

大包主胃脅中痛

膻中及天井主胃心痛

華蓋及紫宮中庭神藏靈墟胃臉俠谿步郎商陽上廉三里氣戶周榮上腕勞宮涌泉陽陵泉王胃脅扭

膻中及天井主胃心痛

大杼及心俞主胃痛不得臥胃滿嘔無所出

大包主胃脅中痛

膻中及天井主胃心痛

廉三里氣戶周榮上腕勞宮涌泉陽陵泉王胃脅扭

膺窓主胃脅難腫
乳根主胃下滿痛

雲門及中府隱白期門肺臉魂門大陵主胃中痛又云雲門主胃中暴逆

鳩尾主胃滿欬逆

巨闕及間使主胃中澹澹又云主胃癆背相引

大衛主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

梁門主胃下積氣

大泉主胃滿呼胃膺痛

魚際主癆走胃背不得息

經渠及丘墟主胃背急胃中膨膨

少衝主胃痛口熱凡胃滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗

心病支溝及太谿然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息者死又云然谷主心如懸少氣不足以息

大都及太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主胃脅心痛不得反側

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

通谷及巨闕及太倉與心臉膻中神府主心痛

通里主卒痛煩心心中懊惱數次頻伸心下悸悲恐

尺澤主心痛膨脹然心煩悶亂少氣不足以息

腎腧及復溜及大陵及雲門主心痛如氣

期門及長強及天突俠白中衝主心痛短氣

足蹠主心痛膨脹然心煩悶亂少氣不足以息

通里主心痛上擔心不欲食

腎腧及復溜及大陵及雲門主心痛如氣

大泉主心痛而嘔

少衝主心痛而嘔

大泉主心痛肺脅氣上逆

鳩尾主心寒脹滿不得食息貢吐血厥心痛善噦心痛太息

上脘主心痛三蟲多涎不得反側

中脘主心痛難以俛仰

不容及期門主心切痛喜吐酸

肓門主心下大堅

靈道主心痛悲恐相引瘧癰

間使主心懸如饑

鄒門及曲澤大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關主凡心實則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

腹病復留及中封腎臉承筋陰包承山大敦主小腹痛又云復留主腹厥

石門及商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹痞氣遊行五臟腹中切痛

關元及委中照海太谿主小腹熱而偏痛

膈臉及陰谷主腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲商曲主腹中積聚時切痛

四滿主腹僻切痛

天樞外陵主腹中盡痛

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

衝門主寒氣滿腹中積痛溼滌

隱白主腹中寒冷氣張喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分及石門主小腹中拘急痛

巨闕及上腕石門陰蹻主腹中滿暴痛汗出

行間主腹痛而熱上拄心心下滿

太谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆主脅痛如刺腹若刀切痛

中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中

腹脹

通谷主結積留飲癖囊脅滿飲食不消

上腕主心下堅積聚冷脹

胃脘及三焦俞主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不

消

三里及章門京門厲兑內庭陰谷絡郗崑崙商丘陰

谷曲泉陰陵泉主腹脹滿不得息又云陰陵泉主腹

中脹不嗜食脅下滿腹中盛水脹逆不得臥又云商

丘主腹中滿響響然不便心下有寒痛

期門主腹大堅不得息脹滿小腹尤大太陰郗主

腹滿積聚解谿主腹大下重又云解谿主厥氣上拄腹大

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月及大橫主小腹熱欲走太息甚痛作脹腫往來上下

巨闕及上管主腹脹五臟脹心腹滿

五里主心下脹滿而痛上氣

太白及公孫主腹脹食不化鼓腹腹中氣大滿
蠡溝主數嘻恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝鍼

入三寸氣至瀉之

灸臍中治腸中常鳴氣上衝心禁鍼

陰交主陽鳴濯濯如有水聲

陰都主心滿氣逆腸鳴

治腸中雷鳴相逐刺下灸承滿五十壯穴在俠巨闕

相去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各

開二寸半

漏谷主腸鳴強久心悲氣逆腹脹滿急

陷谷溫留漏谷復留陽綱主腸鳴而痛

膺窓主腸鳴泄注

太白公孫主腸鳴

灸腸癰法屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血

即瘥

李果十書曰脅痛取期門沿皮二十支溝膽俞沿

皮一寸五分

胃脘暴痛脣中堅痛取石門商丘陰谷大腸俞隔俞

朱震亨心法曰卒心痛不忍吐冷酸水及原臟氣

少灸足大指次指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥

醫學綱目曰內經灸刺脅痛有四其一取心經云心

痛者胷中痛脅支滿脅下痛膺臂肩胛間痛兩肘臂

內痛實則脅大脅下與腰相引而痛取其經少陰

太陽舌下血者其變病刺郗中血者是也

其二取腎經云腎虛則脅中痛大腹小腹痛取其經

少陰太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先取血脉後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者脅脅助辟膝外皆痛詳盛虛熱寒陷下取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當所過者車輪筋

前及脅痛息竇治在燔鍼刲刺以知爲數以痛爲輪

又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引脅痛治在燔鍼

刲刺以知爲數以痛爲輪也

其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者脅滿嘔逆飧

滯狐疝遺漏閉癃詳盛虛熱寒陷下取之也

其三取胃經云厥逆腹滿面腫脣漂漂然暴言難甚

則不能言取足陽明是也

傷寒結脅先使人刺心蔽骨下正使名曰雙關次刺

左行間左一壁結脅立效右畔依上法刺之慢慢呼

吸停鍼即時愈

心胃痞取涌泉太谿中衝大陵隱白太白少衝神門

結脅身黃取涌泉

胃脅痛不堪取期門四分章門六分灸七壯至七

壯又取行間丘墟涌泉

胃滿血膨取期門一分沿皮向外一寸五分瀉之

心痛引背灸刺法有四其一取足太陽經刺節云取

京骨崑崙者是其穴也蓋足太陽之正循督當心入

散絡故心痛引背取之也

其二取足少陰刺節云取京骨竈籥不已取然谷者

是其穴也又經云腎足少陰之脈所生病者煩心心

痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲

嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治

心痛引背也

其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不

已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又二焦

下俞曰委陽是足太陽絡足太陰循督當心入散絡

故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背與心相控而痛所治天突與

十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心

痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得

之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天

突者任脈也

心痛兼脹灸刺法有二其一取足太陰經云取大都

太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病

胃脘痛腹脹所生病者煩心心下急痛者視盛虛熱

太陰者是也蓋足太陰脈從貫上膈注心中故心痛

腹脹者取之也

其二取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲

食不下取之三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛

實非心痛也

九種心痛取間使靈道公孫太衝足三里陰陵泉

卒心痛不忍取上脘八分先補後瀉覺針下氣行如滾雞子入腹爲度次取氣海湧泉無積者刺之如

食項有積者先飲利藥刺之立已不已再刺間使支

溝二里

胃脘痛取足三里

病在膺必灸刺魂門

手心主之病實則心痛取內關

心脾痛取巨闕上脘中脘

蟲心痛灸上脘中脘陰都

蟲心痛取期門

內經刺灸腹痛有四法其一取脾胃經曰邪在脾胃

陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛皆調於三里

又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸實則

腹中切痛取之所別也又云腹痛刺臍左右動脈已

刺按之立已不已刺氣衝已刺按之立已是也

其一取大腸經云大腸病者腸中切痛而鳴濯濯感

於寒即泄當臍而痛取巨虛上廉是也

其三取督脈經云腎虛則胷中痛大腹小腹痛清厥

意不樂取其經少陰太陽血者是也

其四取任脈經云任脈之別名曰尾翳下鳩尾散於

絞腸沙手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病

者膝灣內拍打有紫黑處以鍼刺去惡血即愈

腹痛并氣塊痛取內關支溝照海

氣痛并積痛食不化取氣海一寸半灸五十壯中脘

二寸半灸十壯隱白二分瀉之灸七壯

又法取巨闕足三間怪穴

腹痛腸鳴取氣衝入二十全灸五十壯

臍腹痛取陰陵泉太衝三里支溝不已取中脘關元

繞臍痛公孫三陰交陰谷

內經鍼灸陽鳴有三法其一補脾經云脾虛則腹滿

腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也

其二補足太陽經云中氣不足腸爲之苦鳴補足外

踝下留之申脈穴也入五分

其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胷邪在太陽刺

肓之原巨虛上廉三里是也

導引

保生祕要曰心邪用一指認真尻尾穴而行泄法後

二指用胷至脅分之

運功守黃庭或歸元注念太乙救苦默呪以正其心

邪自不見

心痛其機在目兩眼看湧泉念或從痛處推下大腸

九曲去

心頭冷積想兩手用力推開心頭至臍轉行周天法

即愈

胃管疼痛於足三里掐之九九擦之九九

運功行歸元逐痛處流行胃火自然發散

胷腹脹悶雙手交叉低頭觀臍以兩手貼胷口自效

往下不論數推拂能寬脹止腹疼兼後運動自效

運動先定歸元後行斡旋至胷前推散左右分開如

未通暢以艮背佐之無不效矣

腹痛先念痛處想火燒之

腹熱或疼痛臍圈自小而大又自大而小圈於臍上

腹皮痛患處先推散兩旁然後想水洗之復行周天

古今圖書集成

中華書局影印

法

中脘氣脹須簡煩省思去怒便不滯於胃膈而火自然流行如不進飲食須降氣安心而食自進或病後而發遇熱渴飲之太多二者不能以前法議只可通其一便或開其腠理微洩汗亦消水脹之疾通便之法須摩臍輪井摩腎臍二處仍吹噓其氣十二編

醫案

瘡瘍全書曰一人腹中如鐵石臍中出水旋變作蟲行之狀繞身匝臍癢痛難忍扒搔不盡濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮加麝香水調服之瘧儒門事親曰沈丘王宰妻脅膈不利口流白沫自言咽下胃中常雷聲心間作微痛又復發昏倒乳之間灸癥如碁化瘀利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人吐糞無損來求之一涌而出雪白蟲一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忿而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮痕一同蟲出立安

小便不利有一工治之謂下元虛冷便投緩藥十數服其病不愈又一醫所論與前亦同又投緩藥五七日其證轉加困弱余審問日數飲食大小便何似小便赤色大便黑色此乃傷寒瘀血之證宜用大黃芍藥湯二劑次日用犀角地黃湯一劑後日用通經丸一服換過大便黃色以爲效驗此藥服十餘貼方可獲瘥可誤用緩劑哉

酒官楊仲仁病心氣痛此人喜好飲酒初飲二三杯必奔走三五十次其酒稍散方能復席飲至前量醉後至明日嘔清黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人曰宜吐乃吐蟲一條青黃色長六七寸口目鼻俱全二目膜瞞狀如蛇類楊醜示人

李杲十書曰一婦人重娠六箇月因慟哭口吸風寒忽病心痛不可忍渾身冷氣欲絕曰此乃客裏犯胃

故胃脘當心而痛急與草豆蔻蔻半夏乾生薑炙甘草益智仁之類或曰半夏有小毒重妊娠服之可乎曰乃有故而用也岐伯曰有故無殞故也服之愈

朱震亨心法曰監縣之閭年五十餘春未心脾疼腹脹滿手足寒過肘膝須綿裹火烘胃襟畏熱却喜掀露得風涼則快脈皆沉細而澀稍重則絕輕取似弦而短口渴乾而喜熱飲穀肉全不食遂以草豆蔻丸三倍加黃連滑石炒神麆爲丸白朮爲君茯苓爲佐陳皮爲使作湯送下一百丸服至二斤諸證皆愈

許文懿公因飲食作痰成心脾痛後觸風雪腿骨痛醫以黃芽歲丹烏附治十餘年艾灸萬計又冒寒而痛加膀胱閉合脾疼時膀胱輕膀胱痛則脾疼止此前人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立

一人病心胃痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大

津液不通痰飲注入胃節往來如潮湧上則爲脾疼降下則爲膀胱痛須湧泄之以甘遂末一錢入猪腰子內煨食之連泄七行足便能步後嘔血大作不食煩躁氣弱不語記金匱云無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其痼疾之勢無他少制御之藥故也仍以吐劑達其上焦太第及其中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥俱吐不透而嘔躁愈甚乃用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方

陳皮連白朮桃仁榔李仁澤瀉每日服之湧出酸苦黑水并如爛木耳者服至二百餘貼脈濶退至添純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參

木歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸橘下

咽忽運厥須臾而甦大汗痛止

因中脘有食積痰飲續冒寒濕鬱遏經絡氣血不行

一人病心胃痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大

津液不通痰飲注入胃節往來如潮湧上則爲脾疼降下則爲膀胱痛須湧泄之以甘遂末一錢入猪腰子內煨食之連泄七行足便能步後嘔血大作不食煩躁氣弱不語記金匱云無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其痼疾之勢無他少制御之藥故也仍以吐劑達其上焦太第及其中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥俱吐不透而嘔躁愈甚乃用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方

陳皮連白朮桃仁榔李仁澤瀉每日服之湧出酸苦黑水并如爛木耳者服至二百餘貼脈濶退至添純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參

木歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸橘下

咽忽運厥須臾而甦大汗痛止

因中脘有食積痰飲續冒寒濕鬱遏經絡氣血不行

一人病心胃痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大

津液不通痰飲注入胃節往來如潮湧上則爲脾疼降下則爲膀胱痛須湧泄之以甘遂末一錢入猪腰子內煨食之連泄七行足便能步後嘔血大作不食煩躁氣弱不語記金匱云無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其痼疾之勢無他少制御之藥故也仍以吐劑達其上焦太第及其中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥俱吐不透而嘔躁愈甚乃用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方

陳皮連白朮桃仁榔李仁澤瀉每日服之湧出酸苦黑水并如爛木耳者服至二百餘貼脈濶退至添純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參

木歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸橘下

咽忽運厥須臾而甦大汗痛止

因中脘有食積痰飲續冒寒濕鬱遏經絡氣血不行

一人病心胃痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大

津液不通痰飲注入胃節往來如潮湧上則爲脾疼降下則爲膀胱痛須湧泄之以甘遂末一錢入猪腰子內煨食之連泄七行足便能步後嘔血大作不食煩躁氣弱不語記金匱云無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其痼疾之勢無他少制御之藥故也仍以吐劑達其上焦太第及其中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥俱吐不透而嘔躁愈甚乃用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方

陳皮連白朮桃仁榔李仁澤瀉每日服之湧出酸苦黑水并如爛木耳者服至二百餘貼脈濶退至添純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參

木歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸橘下

咽忽運厥須臾而甦大汗痛止

因中脘有食積痰飲續冒寒濕鬱遏經絡氣血不行