

丹溪先生心法卷五

新安吳勉學

校

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血

六陽經六陰經有多氣少血

者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若

夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之書

未開諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多

氣少血肌肉難長瘡久未合必成死症遠用驅毒利

藥以伐其陰分之血禍不旋踵陽滯於陰脉浮洪

弦數陰滯於陽脉沉細弱濡陽滯以寒治之陰滯以



丹溪先生心法卷五

新安吳勉學

校

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血

六陽經六陰經有多氣少血

者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若

夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之書

未開諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多

氣少血肌肉難長瘡久未合必成死症遠用驅毒利

藥以伐其陰分之血禍不旋踵陽滯於陰脉浮洪

弦數陰滯於陽脉沉細弱濡陽滯以寒治之陰滯以



熱治之

人中年以後不可生癰纔有痛脉參之脉

証但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常

熱拔毒紓氣之藥虛虛之禍如指諸掌內托之法

河間治腫燔于外根盤不深形証在表其脉多浮病

在皮肉非氣盛則必侵於內急瀕內托以救其裏宜

復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料

飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱

已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能

內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於此

小瘡與冬月時今即可若潰瘍於夏月用之其桂林

之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚杖
一婦年七十形實性急而好酒腦生疽僂五日脉
且瀉急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌入
參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而止半身
汗睡覺病已失此內托之意又一男子年五十形
實色黑背生紅腫及脾骨下痛其脉浮數而洪緊
亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蒌子
甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此
正內托之法非精要內托散乳香萊豆等藥想此方
專為服丹石而發疽者設不因丹石而發恐非必用



之劑。瘡先發為腫，氣血鬱積，蒸肉為膿，故其痛多。
少瘡之始作時也，膿潰之後，腫退肌寬，痛必漸減。而
皮痛者，此為虛，宜補。亦有穢氣所觸，宜和。解風寒逼
者，宜溫散。

○腸癰 大腸有痰積，死血流注。桃仁承氣湯加

連翹、秦艽、近肛門破入風者，難治，防風之類。

○乳癰 乳房陽明所經，乳頭厥陰所屬，乳子之母

不知調養，怒忿所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，以致厥陰

之氣不行，故竅不得通而汁不得出。陽明之血沸騰

故熱，蒸而化膿，亦有所乳之子隔有滯痰，口氣炊熱。

或時而腫熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍指
操令稍軟晚令汁透自可消散失此不洽必成癰癰
治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行
汗燭之血以生甘草之節消腫導毒以瓜蒌子或加
凌藥青橘葉七角刺金銀花當歸或湯或散或加威
隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於
腫處其効尤捷不可輒用針刀必至危困若不得於
夫不得於鼻姑憂怒鬱悶斯久積累脾氣消阻肝氣
橫逆遂成隱核如大棋子不痛不痒數十年後方為
瘡腫若曰妳若以其瘡形■凹似岩穴也不可治矣

若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

乳癰方

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節

破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰妳勞燉腫

石膏煨

樺皮燒瓜蒌子

甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核



南星

貝母

甘草節

婁絲

連翹半兩

一右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節

乳岩小破如柴胡川芎

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢甘草三錢當歸三錢



南京中医药大学图书馆版权所有

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹煉

金銀花

大蕎麥

紫葛藤等分

右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦

可

乳栗破

少有破必大補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節

右以水煎服

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破當
養血初腿腫以大參黃連茯苓各二錢瓜蒌子
十八粒作二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月
加條子芩體虛者加牛膝以生甘草為使大料煎
入姜汁帶辣食前飲之病深者恐木栢桂枝十數
貼者不動加少麻黃二三貼又不動恐癰將成矣
急掘地坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被
席圍抱下截使熱氣重蒸腠理開氣血暢而愈



中醫藥大學圖書館藏

鉄圍散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥半兩 大黃

黃柏

黃連

南星 三 半夏

防風

皂角

木鱉子 瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠

圍藥

諸般癰疽傳上消散

右為末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌



阿膠

皂角刺

石研為細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒

園藥鉄井欄

貝母

南星各七錢連翹

五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右藥為細末用水調傅四向腫處止留中間一竅

出毒氣

隔反取膿法

馬蹄

細切

蕎麥麵一兩白塩半兩草烏四錢

升... 卷五

右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末
醋調成膏目白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫

自退

騎馬癰

用大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙
水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頓服效

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

又疽癰方

草烏

黃連

紫荊皮

白芷



大黃

芙蓉皮

煨礞石

糯米各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調

黃末圍定瘡

穴大小前後敷前藥末

一人肚門生瘡久不收口有針竅三孔勞力

則有膿

黃芪

條芩

連翹

秦艽

右為末神麴糊為丸

取朽骨久痕及痔漏者有之

取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火

煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸

如粟大以帛纏送入孔中竅內更用膏藥貼之



便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸 五分

瓜蒌仁 三錢

代赭 一錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌

桃仁

草龍膽

右吹咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服一方加酒大黃

附方

消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸

大黃 甘草節 瓜蒌仁 等分

咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提製

立效

機要內托復煎散 癰疽托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 白芍

人參 黃芪 白朮 桂枝

甘草 防已 當歸 防風 三兩

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去木入



前十二味再煎至二四盞取清汁分三四次終
日飲之又煎蒼朮粗為湯去粗依前又煎前十
二味粗分飲之

內疎黃連湯

治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便秘結

洪寶者

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草

略一連翹

二兩

大黃

二兩半

右以咀每服一兩入姜煎

疔瘰八十六

