

葛仙翁肘後備急方

二



葛仙翁肘後備急方卷之三

陞三

葛仙翁肘後備急方卷之四

陞四

上海商務印書館五洲書局本




曹山館外新書卷之三



上海涵芬樓影印正統道藏本

曹山館外新書卷之四



葛仙翁肘後備急方卷之三

陸三

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和未

發時服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割合

容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾

以火炙之取可熟搗爲三丸未發前服一

丸不止復與一丸



又方取蜘蛛一枚盧管中密塞管中以綰頸  
過發時乃解去也

又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日  
叉手當閉氣以青墨注其管兩耳中各七  
注又丹書舌上言子日死畢復再拜還去

陸三

勿顧安卧勿食過發時斷即差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚並石飴中合丸吞之

又方臨發時搗杏仁下篩以苦酒和之塗

背上





葛仙翁肘後備急方

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服  
便斷即差

又方常山搗下篩成末三兩真丹一兩白蜜  
和搗百杵丸如梧子先發服三丸中服三  
丸臨卧服三丸無不斷者常用効

又方大開口度上下唇以繩度心頭灸此度  
下頭百壯又灸脊中央五十壯過發時灸  
二十壯

又方破一大豆去皮書一片作日字一片作  
月字左手持日右手持月吞之立愈向日



服之勿令人知也

又方阜莢三兩去皮炙巴豆一兩去心皮搗丸如大豆大一服一枚

又方巴豆一枚去心皮射蔕如巴豆大棗一枚去皮合搗成丸先發各服一九如梧子

陸三

二

大也

又方常山知母甘草麻黃等分搗蜜和丸如大豆服三丸比發時令過畢

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮取半升先發時一服比發令三服盡

葛仙翁肘後備急方

又方常山三兩剉以酒三升漬二三日平旦  
作三合服欲嘔之臨發又服二合便斷舊  
酒亦佳急亦可煮

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取  
三升分之服至發時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘  
草一兩半合以水六升煮取二升分再服  
當快吐仍斷勿飲食

老瘡久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻  
一兩附子一兩烏賊骨一兩以酒六升清





之小令近火一宿成服一合比發可數作

又方藜蘆皂莢各一兩炙巴豆二十五枚並

搗熬令黃依法搗蜜丸如小豆空心服一

丸未發時一九臨發時又一丸勿飲食

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有

三

酒氣不即斷更作不過三服而止

又方末龍骨方寸七先發一時以酒一升半

煮三沸及熱盡服溫覆取汗便即效

又方常山三兩甘草半兩知母一兩搗蜜丸

至先發時服如梧子大十九次服減七丸

葛仙翁肘後備急方

八九後五六丸即差

又方先發二時以炭火床下令脊脚極暖被覆過時乃止此治先寒後熱者

又方先炙鯨甲搗末方寸七至時令三服盡用火炙無不斷

又方常山三兩搗篩鷄子白和之丸空腹三十丸去發食久三十九發時三十九或吐或否也從服藥至過發時勿飲食

治溫瘧不下食知母鯨甲炙常山各二兩地骨皮三兩切竹葉一升切石膏四兩以水



魚

七升煮二升五合分溫三服忌蒜熱麪猪

治瘴瘧常山黃連豉熬各三兩附子二兩炮  
搗篩蜜丸空腹服四九欲發三九飲下之  
服藥後至過發時勿喫食

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香豉各  
二兩並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十九  
日再服飲下

無時節發者常山二兩甘草一兩半豉五合  
綿裹以水六升煮取三升再服快吐



葛仙翁肘後備急方

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩

酒一斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服

八合比發時令得三服熱當吐冷當利服

之無不差者半料合服得

勞瘧積久衆治不差者生長大牛膝一大虎

陸三

口以水六升煮取二升空腹一服欲發一

四

服

攘一切瘧是日抱雄鷄一時令作大聲無不

差

又方未發頭向南卧五心及額舌七處閉氣



書鬼字

呪法發日執一石於水濱一氣呪云咎咎圓  
圓行路非難捉取瘡鬼送與河官急急如  
律令投於水不得迴顧

治一切瘡烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人

參桂心肉從蓉知母牡丹各二兩常山升

麻桃人去皮尖熬烏豆皮熬膜取皮各三

兩桃人研欲丸入之搗篩蜜丸蘓屠白搗

一萬杵發日五更酒下三十九平旦四十

九欲發四十九不發日空腹四十九晚三



十丸無不差徐服後十餘日喫肥肉發之也

凡見瘡白驢蹄二分熬大黃四分菜豆三分末砒霜二分光明砂半分雄黃一分搗蜜丸如梧子發日平旦冷水服二丸七日内

陸三

五

忌油

附方

外臺祕要治瘡不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服

聖惠方治久患勞瘡瘡等方用鱉甲三兩塗





酥炙令黃去裙爲末臨發時溫酒調下二錢七

治瘡用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢九如梧子大每服三九當發日面北用溫酒

吞下如不飲酒井花水亦得五月五日午時合忌鷄犬婦人見

又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚爲度丸如鷄頭大候乾每服一九新汲水下面東服至妙



葛仙翁肘後備急方

治卒發癲狂病方第十七

治卒癲疾方  
灸陰莖上宛宛中三壯得小便  
通則愈

又方灸陰莖上三壯囊下縫二七壯

又方灸兩乳頭三壯又灸足大指本聚毛中

七壯灸足小指本節七壯

又方取葶藶一升搗三千杵取白犬倒懸之  
以杖犬令血出承取以和葶藶末服如麻  
子大一丸三服取差

又方葶藶子三升酒五升漬之出曝乾漬盡



酒止搗服一錢七日三勿多益狂

又小品癲狂葇荳散葇荳子三升末之酒一  
升漬多日出搗之以向汁和絞去滓湯上  
煎令可丸服如小豆三丸日三口面當覺  
急頭中有蟲行者額及手足應有赤色處

世三

六

如此必是差候若未見服取盡矣

又方末房葵溫酒服一刀圭至二三身潤又  
小不仁爲候

又方自縊死者繩燒三指撮服之

凡癲疾發則仆地吐涎沫無知彊掠起如狂

