

临證指南

卷五



臨證指南醫案目

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室



北京中医药大学图书馆版权所有

婦科指南醫案卷九

丁丑茗溪漫士臨本

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲書

姪旦玉掌

調經

熱鬱
氣血
滯

張二經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利後來不
生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而
脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴

婦科有火此味至

右者無此不用

脈數者不宜用桂枝
建中湯多
脈逆而設
多

後則
傷
久咳
肺氣
虛

扶苓

生香附

南山查一益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪

桂枝

白芍

炙草

南棗

飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則
咳嗽此則久嗽背寒晨汗至是肺氣受傷而經事日
遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火
也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之饑已甚
可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣



肝犯

而桂枝白芍。非斂陰和血之妙品乎。

秦二氣衝心痛嘔涎氣墜小腹為瀉經來後期其色或淡或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治。

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治。

此皆學醫之病不宜相煩

川連

小茴

川棟子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

三鬱傷肝脾。是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱滯宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法。歸脾湯

向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒小



婦人全以
血為主治
法亦當以
血為事

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆

肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆重

極之徵為肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用

矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢脈清脫悶減食經水來遲腹痛墜

此皆無用藥

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又諸恙未減腹但痛不墜逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許以經閉寒熱便溏腹痛加味逍遙散去山梔



不用柴詩
豈非夢增

血絡
鬱熱
腹痛

奇脈
虛寒
滯

某 血虛肉熱經不至 加味道遙散去朮

經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

孫仁奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商入脈治

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸芪建中土薑

謝三能食不運痕泄經事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心辣入脈奇經交病

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡薤蓉

淡骨脂

肉桂

當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脈右緩左瀉經水色淡後期嘔吐痰水食少舉咽三載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通後陽明厥陰立一方。

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又三月中用辛溫宣鬱方痰癰目下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養衝任栽培生氣方法

入珍去朮草地加小茴肉桂

蘗艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛寒

朱

二經水一月兩至或幾月不來五年來並不孕育下

此宜溫

肢體常冷是衝任脈損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參

河車膠

熟地

砂仁製

歸身

白芍

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

肝腎虛陰

程

三十三年不孕育其中勾病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脈絡牽掣痠楚不得舒展凡女

人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脈也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛



肝腎
奇脈
陰虛
朱

損或見病治病之候有終身不育淹淹之累肝血陰虛
木火內寄古人溫養下焦必佐涼肝堅陰勿執經後期
為氣滯亂投破氣剛藥功陰

尚書書用中藥

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

經云陽維為病苦寒熱緣上年冰雪甚少冬失其藏

春半潮濕地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生方淺

不必云六脈口蓋任可也

入脈隸乎肝腎一身綱維入脈乏束固之司陰弱內熱

陽微外寒矣膺脊常痛經事愆期血海漸涸久延虛怯

情景已露局方逍遙散固女科聖藥大意重在肝脾二



經因鬱致損木土交傷氣血痺阻和氣血之中佐柴胡
微升以引少陽生氣上中二焦之鬱勃可使條暢全則
入暮病劇天曉安然顯是肝腎至陰損傷八脈不為納
束故熱無汗至陰深遠古人謂陰病不得有汗也當宗
仲景甘藷之例勿取氣辛助陽可矣

此方無考

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

陰虛
某

陰虧內熱經事愆期

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

菟藟子

女貞子

桂圓

痛經
傷血
氣滯

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

張四寒熱間日經來腹痛

宜用清熱之藥不可用下藥其說有

小生地 丹皮 知母

生薑 澤蘭

花粉

某二先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病
與下焦痕泄則異

川芎 當歸 香附

煨廣木香

查肉 茯苓

某三寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱
傷氣血入脈主病姑先與澤蘭湯



請身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

北方無著

周七十室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日
為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴多瀉忽
結究脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而
奇經衝任躋維諸脈皆肝胃屬經脈不循序流行氣血
日加阻滯失治心結癰聚些痞之累

南山查

生香附

延胡

當歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川棟子

澤蘭

肉桂

炒小茴

葱白汁丸

弱 經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆
病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟 一錢
丹皮 三錢
炒查 一錢
胡連 八分

延胡 一錢
澤蘭 二錢
歸身 二錢
生白芍 一錢

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脈痛經 此衝任脈有寒

川芎
當歸
香附
小茴

烏藥
茯苓
紅棗

貫 經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷

形瘦目減脈來右大左弱上部火升下焦冷敬骨中隱



海味
 異人
 氣分
 朱
 此老不遇
 一以異欺人
 送開後日
 庸醫之門
 取種種不
 入藥之食
 物入藥成
 氣血

陽飛遠焉得孕育開醫都以補血清劑宜乎

陽攝陰法。宜用溫經法。

鮑魚。內經用此。生地。

淡菴蓉

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗。斬艾湯法丸。

脈數右肩痛。痿經不調。經來氣攻。觸背性躁。氣分有

熱

細子芩

白芍

黑山施

釣藤

茯苓

當歸

香附

羌蔚子

桑枝

酸。滴入裏氣血呆鈍。痛自心胸。脹及少腹。昔經行三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

以此風口
立而荷葉
邊豆殼螺
殼核白批
肥核查核
淡菜五筋
一切神農
本草及方
書所棄之
物收用不
道丹此醫
道之一變

陽虛

胃湯

濕滯
腹痛

臍滯當停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減硬澹浮腫無清熱

通經之理扶持中土望其加穀四君子湯

效者不宜

某三

經閉兩月脫痺嘔惡此氣窒不宣胃陽礙鈍使然

用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣

