

临床外科多选题解答

广西百色地区医学情报研究所

临床外科多选题解答

中国协和医科大学出版社

临床外科多选题解答

黄惠赐 陈明辉 陆钦尧 译
崔群飞 梁培茂 雷一鸣
沈康年 审校

广西百色地区医学情报研究所

译 者 的 话

医学多选题问答是发达国家考核医务人员常采用的办法之一。采用这种办法，可促进医务人员博览群书、扩大知识面，充实理论知识。

《临床外科多选题问答》译自1980年出版的英文医学书。

全书分临床外科绪论、热带外科、测验等共999个题解。内容丰富、知识面广、编排新颖。是外科不可多得的参考书之一。为便于外科临床工作者、医学院校师生学习，我们翻译了这本书，奉献给读者。

本书经广西医学院外科教研组沈康年副教授审校。由于我们翻译水平有限，可能有错译之处，敬望读者批评指正。

译 者

目 录

(一)

第一 临床外科绪论.....	(1)
第二 头 颈.....	(7)
第三 躯 干.....	(28)
第四 腹 部.....	(38)
第五 四 肢.....	(63)
第六 上 肢.....	(75)
第七 下 肢.....	(83)
第八 某些病人的常规检查.....	(93)
(一) 部分答案.....	(95)

(二)

第一 临床外科绪论.....	(102)
第二 头 颈.....	(109)
第三 躯 干.....	(136)
第四 腹 部.....	(147)
第五 四肢——总论.....	(175)
第六 上 肢.....	(190)
第七 下 肢.....	(202)
第八 某些病人的常规检查.....	(221)
(二) 部分答案.....	(224)

(三)

热带外科.....	(233)
(三) 部分答案.....	(246)
测验一.....	(247)
测验二.....	(259)
测验三.....	(272)
测验一答案.....	(279)
测验二答案.....	(280)
测验三答案.....	(281)

(一)

第一 临床外科绪论

1 乳癌病人的乳头比较起来，患侧的可呈

- A 后倾状
- B 退缩状
- C 抬起状
- D 凹陷状
- E 起皱纹状

(答案见后，下同)

2 老年弓见于

- A 非洲人
- B 中风
- C 糖尿病
- D 高血压
- E 较年老的人

3 红鼻可能表示

- A 酒精中毒
- B 肾炎
- C 酒渣鼻
- D 白血病
- E 红细胞增多症

4 关于牵涉痛，下列说法之一是不正确的

- A 舌病变可牵涉耳痛

- B 阑尾病变可牵涉脐部痛
 - C 肾病变可牵涉睾丸痛
 - D 胰病变可牵涉肩痛
 - E 髌部病变可牵涉膝痛
- 5 波动和液体冲动传导比较起来
- A 它们是相同的事物
 - B 波动正常可见于大腿
 - C 对于测试大包块的波动, 应使用三个指
 - D 对于测试小包块的波动, 应使用二个指
 - E 在同一平面的液体冲动传导是没有意义的
- 6 透光的阴囊肿物可以是
- A 水囊肿
 - B 婴儿的腹股沟疝
 - C 睾丸肿瘤
 - D 血性囊肿
 - E 睾丸扭转
- 7 就关节的摩擦音而论
- A 微细者表示骨关节病
 - B 微细者可见于类风湿性关节炎
 - C 粗糙者表示类风湿性关节炎
 - D 粗糙者表示骨关节病
 - E 单一的卡塔声表示脱位
- 8 脐周静脉扩大表示
- A 肠梗阻
 - B 门静脉阻塞
 - C 肝疾患

- D 肾疾患
- E 胆石症
- 9 外科病人的打呃可以
 - A 是正常的
 - B 是腹膜炎的证据
 - C 表示小肠扩张
 - D 置之不理
 - E 表示血的尿素含量高
- 10 呕吐物应仔细地检视。下列说法之一是不正确的
 - A 含有不消化食物的呕吐物会使石蕊试纸变为红色
 - B “咖啡色”呕吐物表示有变化了的血液
 - C 如呕吐物中有胆汁，它是呈黄色的
 - D 绿色的呕吐物表示它是上段小肠的内容物
 - E 棕色的臭的呕吐物表示它是低位小肠的内容物
- 11 黑便可能表示
 - A 内痔出血
 - B 病人正在服用含铁的药物
 - C 高位消化道出血
 - D 低位消化道出血
 - E 脂肪痢
- 12 皮脂性囊肿的特点为
 - A 肿物位于皮内
 - B 肿物位于皮下
 - C 通常呈现波动
 - D 罕有斑点
 - E 极常有斑点

- 13 脂肪瘤从来不
- A 是分叶状的
 - B 是深及深筋膜的
 - C 是有疼痛的
 - D 是有蒂的
 - E 具有斑点
- 14 排空征见于
- A 动脉瘤
 - B 动静脉瘤
 - C 血管瘤
 - D 淋巴管瘤
 - E 脑膜瘤
- 15 化脓性肉芽肿主要地出现
- A 于脐
 - B 于肛门
 - C 于手
 - D 于口唇
 - E 于舌
- 16 若肿物能使之凹陷，它一定含有
- A 粪块
 - B 液体
 - C 空气
 - D 血液
 - E 软糊状物
- 17 弯甲是指
- A 向内生长的趾甲

- B 松动的甲
 - C 鸡眼
 - D 足底的疣
 - E 弯曲的过度生长的甲
- 18 下列疾患之一不累及皮肤 C
- A 丹毒
 - B 类丹毒
 - C 蜂窝织炎
 - D 炭疽
 - E 疔
- 19 下列之一是不符合蜂窝织炎的 C
- A 无边缘
 - B 无波动
 - C 无热
 - D 无脓
 - E 无界限
- 20 以下那种情况是完全符合拇趾滑液囊肿的名词
- A 由痛风所致的
 - B 拇趾单纯性炎症
 - C 炎症合并拇外翻
 - D 拇外翻浅面的滑囊炎症
 - E 拇外翻浅面有滑液囊
- 21 溃疡的边缘如下
- A 上皮癌有硬的外翻的边缘
 - B 静脉曲张性溃疡有整齐的边缘
 - C 结核性溃疡有潜行性的边缘

- D 侵蚀性溃疡有斜坡状的边缘
E 梅毒瘤性溃疡有稍微高起的边缘
- 22 引起硬性下疳是由于
- A 结核病
B 放线菌病
C 炭疽
D 麻风
E 梅毒
- 23 以下哪一项是正确的
- A 瘻管是开口于皮肤上面的盲管
B 窦道是连接两个上皮性表面
C 肛门附近开口一般是藏毛窦
D 窦口处多量肉芽组织一般表示有异物
E 下颏多发性硬的窦道表示麻风
- 24 疤痕疙瘩多见
- A 于非洲人
B 于中国人
C 于清洁的手术创后
D 于感染了的手术创后
E 于甲状腺切除术的衣领式切口后
- 25 瘤引起疼痛 C 2
- A 是通常的
B 是罕有的
C 当有骨转移时
D 当有脑转移时
E 当感觉神经受到浸润时

第二 头 颈

26 头皮的柯克氏 (Cock's) 特异瘤*是

- A 上皮瘤
- B 血肿感染
- C 额窦感染
- D 皮脂腺囊肿化脓
- E 颅骨复合性骨折所致

27 前囟通常闭合于D

- A 3个月
- B 6个月
- C 12个月
- D 18个月
- E 3岁

28 柏哲 (Paget) 此名与以下有关

- A 骨疾患
- B 结肠疾患
- C 阴茎疾患
- D 手指疾患
- E 乳房疾患

29 波特 (Pott) 此名与以下有关

- A 骨折

* 头盖隐皮脂腺囊的败血性溃疡, 同时引起皮瘤——译者注。以下凡正文以外的用“*”表示的为译者所注。

- B 脊柱结核病
 - C 踝关节结核病
 - D 颅骨疾患
 - E 乳房疾患
- 30 第Ⅴ对脑神经损害时有
- A 斜视
 - B 一侧颜面麻痹
 - C 舌不能伸直
 - D 丧失听力
 - E 不能收缩嘴唇肌咬紧牙齿
- 31 面神经麻痹是通过以下来证明的
- A 嘱病人伸舌
 - B 检查瞳孔的对光反应
 - C 检查瞳孔的调节反应
 - D 检查脸部的针刺感觉
 - E 嘱病人露齿
- 32 你想检查第Ⅱ对脑神经时，则嘱病人
- A 伸舌
 - B 说“阿”
 - C 露齿
 - D 咬牙
 - E 耸肩
- 33 颅底骨折时
- A X线总是显示骨折
 - B X线从不显示骨折
 - C X线常常不显示骨折

- D 从脑脊液从耳流出来证实诊断
E 从不呈现脑脊液从鼻孔流出
- 34 一病人的头受伤后神志清醒，但 1 小时后转为昏迷。你更加认为是
- A 颅顶骨折
B 糖尿病性昏迷
C 酒醉
D 后颅窝骨折
E 脑膜中动脉破裂出血
- 35 头受伤后瞳孔的变化通常是由于
- A 缺氧
B 视神经损伤
C 第Ⅲ对脑神经受压
D 第Ⅵ对脑神经受压
E 颅内高压
- 36 颧弓骨折的特点包括
- A 复视
B 不能开口
C 鼻衄
D 脑脊液耳溢
E 眼睑皮下瘀血
- 37 一病人患脸、眼眶、咽喉或耳的严重感染。以下何种表现使你怀疑是海绵窦血栓性静脉炎
- A 发热
B 严重头疼
C 眼睑水肿

- D 心动过速
- E 颈强直
- 38 眼睑黄斑瘤常与以下情况有关
 - A 血的尿素含量高
 - B 血的胆固醇含量高
 - C 慢性贫血
 - D 痛风
 - E 糖尿病
- 39 术语泪溢表示
 - A 泪腺炎症
 - B 新生儿眼炎
 - C 液体从有结膜炎的眼渗出
 - D 睑腺炎
 - E 泪液因阻塞而溢出
- 40 格雷夫斯 (Graves) 病*是
 - A 续发性甲亢
 - B 甲状腺癌
 - C 原发性甲亢
 - D 某种甲状腺炎
 - E 突眼性甲状腺肿
- 41 涉及眼眶的最常见的肿瘤为
 - A 泪腺瘤
 - B 视神经胶质瘤
 - C 骨瘤

* 突眼性甲状腺肿

- D 继发性肿瘤
 - E 恶性黑色素瘤
- 42 有关痛风结节肿的以下说法是正确的
- A 累及手指的腱鞘
 - B 见于耳
 - C 累及第 I 趾——趾关节
 - D 累及髌前滑液囊
 - E 主要发生于女性
- 43 椰菜耳 (Cauliflower ear)
- A 继发于反复损伤后
 - B 继发于冻疮后
 - C 是痛风所致
 - D 可并发血友病
 - E 是以炎症起始的
- 44 外耳和听道的炎症性疾病可导致以下淋巴结肿大
- A 颌下区的
 - B 耳前区的
 - C 称为扁桃体的
 - D 锁骨上的
 - E 乳突区的
- 45 林尼氏 (Rinne's) 试验* 于以下疾患时呈阳性
- A 感觉性耳聋
 - B 外耳炎
 - C 中耳炎

* 音叉试验 (检查音传导障碍的)