

翁仲仁幼科

錦章圖書局印行 八

死先腹痛後止可用助血氣藥以救之

發熱時身無大熱腰腹不痛過三日後見點壅硬時手者吉

發熱時頭面一片紅如塗胭脂者六日後死

發熱時渾身溫熱不時發熱者自心經而出也為吉可治而愈

發熱時用紅紙條蘸麻油點照心頭皮裏若有一塊或遍身皆有成塊紅者八九日後死

紫痘三朝生死

發痘時頭面稀少胸前背後皆無根紫紅潤而尖碍手如水珠光澤者上吉也不必服藥

發痘時煩躁不安腰腹痛不止口氣大臭出紫點者死

發痘時痘色白皮薄而先振葉全無紅色或根帶一線紅三五日即長如菜豆大此症決不能收發久後必成一色清

水擦破即死不可因其好者妄與下藥

發痘時全不起頂如湯泡及燈草火燒者十日後毒竭而死

發痘時起紅斑如錦紋者六日死過身如蛇皮者死

發痘時黑斑如瘰狀肌肉成塊黑者即死

起服三朝生死

起服時遍身痘項皆陷下其中有眼如針孔者紫黑者死頂陷者可用助血氣藥湯不止用退火回生散

起服三日之後痘當逐漸起服若根紫紅微頂肥滿光潤澤者生

起服時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫如瓜之狀者死

起服時腰腹或痛或止遍身紫點如蚊蚤所咬全不起發者死

起服時痘伏陷不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死略能飲食用清腸藥治之

起服時遍身黑陷胸臍不寧神昏氣憤者死

起服時根紫黑色乾燥不潤全不起發者死

貫膿三朝生死

貫膿時根窠紅潤貫膿充滿如黃褐色二便如常飲食不減者吉不必服藥

貫膿時純是清水皮白而薄與水泡相似三四日後遍身抓破而死

貫膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死除二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

貫膿時二便閉目閉聲啞腹中脹滿肌肉黑者死

結膿三朝生死

結膿時色轉蒼膿一二日從口唇四邊結膿由胸腹收至兩腿然後脚背和額上一齊結膿然而愈者吉

結膿時遍身發痒抓破無膿皮卷如豆壳乾者死

結膿時遍身臭爛如餅餅臭不可近目中無神者死

結膿時寒戰手足顫掉咬牙噤口者死

落屬之後疤痕雪白全無血色者危急宜補氣血養脾胃庶幾可治

附遺證治

發熱之初或吐或瀉而精神不減者無害此熱從內解但不宜久見恐耗氣耳

發熱時聲音逆變者宜清肺飲甘桔湯加鼠粘刺芥或元參

小兒出痘凡裏有大熱當利小便使心火有所引導雖不用涼藥其熱自泄去矣宜導赤散

凡裏有小熱不宜利小便當解毒若小熱利其小便恐損其氣耳宜犀角地黃湯消毒飲

起脹時頂雖起而四圍淡白枯澀者屬血虛有四圍雖收暈而頂陷者屬氣虛頂陷白色氣血俱虛宜保元湯加芍藥

肉桂木香之類用人乳汁好酒以進之

起脹時諸痘未起而其中有先起痘大色如金黃者名曰賊痘大而黑者名曰痘打以銀簪刺破口含清水吸去膿血

用紫草膏或油胭脂加血餘炭珍珠末填入瘡內則諸痘自然起發矣起脹時痘上有小孔不黑不白名曰痘瘡此因

膿理不密而有是瘡大泄元氣不治則凶用保元湯加丁香肉桂其孔一密而痘自起矣

貫膿時痛不止者氣滯也用保元湯加木香山查以行滯氣痔瘡不止者血盛也血味鹹鹹嗽皮肉作痒用保元倍加黃芪芍藥以制血盛若膿足以痒不妨

之
貫膿時成片作爛膿水不乾內以大補氣血外用散草敷之如頂平脚爛發不滿足用十全大補湯加木香干姜治

之
貫膿時色白如水晶內無膿者宜內托散加丁香干姜或木香散加糯米乳酒歌曰痘色虛明似水晶是將此症看為輕十二三日防痔瘡十四五日命頂頭

痘疥貫膿已滿熱毒已解至收膿時有數日不焦者只看痘色如初此亦無妨用八珍湯加木通牛膝補脾利水而通自飲矣凡當膿不壓泄瀉不渴寒戰咬牙屬虛寒也用木香干姜理者如白注當歸歸脾退

咽喉腫痛聲啞在初出之時為毒壓氣道宜甘桔湯加元參牛蒡在起脹貫膿之時因內毒長大以致氣道窄狹而有此症不治自愈在膿後而喉痛啞者凶

膿後身弱坐立艱難宜八珍湯加黃芪知母渴加麥門冬時渴者以八珍湯加肉苁蓉木通
痘痂當落不落者乃大痼也用藥茶湯洗砂六一散外以蜜水調滑石末敷之

孕婦出痘先後宜安胎為主參苓白朮艾葉砂仁血虛者以四物湯再加托藥

附遺凶症
發熱時頭溫足冷昏悶如痴渴飲者凶
婦人經水不止者重墮胎血不止者山胎不墮大熱不退者山自腰下見點腰上不出者不治

斜視之臉如橘皮不分肉地者死
起脹時色如白紙平塌不起者死若此者乃毒盛血滯不可認以虛寒之症

起脹時有六七粒細而成塊中有一大者扁潤歪斜若此不治
痘後慢驚目無神而面色青者死

胎毒蓄積發為痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽主水起於丙火後歸陽明血水化為膿漿若無眉髮如反掌欲知表裡虛實須明寒熱溫涼症候殊形臟腑異狀肝火激成水泡肺主涕而膿漿心經紅紫脾乃赤黃腎經居下不受污濁為變黑而可防觀其外症惟何內臟呵欠煩悶分肝木之因咳嗽噴嚏子肺經之受面目帶赤而驚悸分心火炎於胸膈手足厥冷而昏睡子脾土困於中央耳尻屬腎溫煖如常二處灼熱痘症乘氣先分部位次察災祥明從目落鼻太陽形於頭上心火炎熱則鼻乾面赤肺金鬱結則胸膈先傷手足屬乎脾胃肺肝主脇肋之傍頭項三陽交會腰背統乎膀胱外症三陽明用心想像泄瀉者邪甚於下嘔吐者邪甚於上氣逆而眼脹睛隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚搐胃邪實而顛口燥咽乾肺受火邪而液竭使秘溺滋腎固火旺而津亡欲識痘之輕重當觀熱與形狀毒甚乎心如焚火勢微乎內外清涼寒熱往來神氣安定知痘出必預詳數番漸出于春回寒谷一齊湧出千火烈萬同蚊迹蚤斑刻期而歸陰府蛇皮蚤種引引而返泉鄉雖怕紫紅史嫌灰白最宜淡紅滋潤切忌黑陷乾紅色要明潤分猶恐薄嫩之易破痘貴乾結今又恐弄爛之難當面頰稀而磊落清安可保胸膈密而連串吉凶難量項要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空倉皮毒老而慈嫩膚交活而怕光結實高聳始終無慮丹浮皮肉必主形傷各面預腫子八九如何可過腰肢胃爛今一七定受火殃痘堆口舌毒鐘頸項咽喉腫飲食難當瀉利血熱毒甚無漿人力難盡天命匪長痘瘡焦落辨別陰陽人中上下元屬為良若是足腰先屬黑多山少吉要隄防

金鏡賦

痘毒未出之初宜開和解之門既出之後當塞走泄之路是故壯熱腮紅便服升麻面青神慢急進寒蘇氣粗熱癰心煩小便秘便煩和解升麻芍藥前羌防芷柴葛絕勝喘呼腹脹甘服肥浮肌燥急宜疎散麻黃乾葛芍升麻甘桔氣粘最宜及夫痘出之門既開則熱蒸之毒自解未見點前惟茲一法既敷瘡後別有奇方稀疎而氣血和平煩知要表和中之理歸芍芍木荅甘草腹正血元湯子緊密而不脹重仕當感內外分銷之妙則起歸地芍紅芍通用小連翹飲愈未赤色見焦枯約用清涼而解毒紅斑赤紫荅連犀柏同施身熱燎火乾葛前胡並用氣粗而腹脹腸鳴遲遲枳腹不通血痺而腹疼陣陣玄胡查芍木香若遇色未紅潤便宜撤去煎煎如見二便清泄縱是生歸俱免加入白木茯苓白古更名平劑精神倦而飲食少進以人參出不快而痘不振早查晚初皆紫紅稠密甚幸用之無疑如見毒微色微鼠

結通之何害是故三日以前即許通斯而用糖是以往不可一創而施瘡端放白勢若行漿者內外虛實之異酌以
溫平表補之宜若神壯而氣盛能食而便實者瘡雖發密只用中和表發防甘查芍結歸芪催膿而已若精倦而神衰
減食而瘡陷者毒則繁多却用重劑補益參芪甘草芍歸結梗為先立此二方乃作膿膿之具膿胞未滿不可輕易去
方瘡或變遷不一另設便宜妙用至於漿或飢足毒已盡行拘化法當新進於清涼氣血回元復位不可重榮于表補
參芪切勿多食胖甚恐難收拾故夫便食而能食壯熱而不退者便宜疎利為先升麻乾葛四順清涼便瀉而減食壯
熱而不渴者則以健脾為資本投通歸防風並芍如違內外症平不必過令服餌直至結痂而後再觀餘毒有無當疎
利便宜疎利當調補兼調補身熱煩渴便赤者大連翹飲氣粗壯熱結者四順清涼泄瀉則益黃理中瘡癰則升麻
乾葛如若別無餘症安養氣血而已

節制賦

夫病深而藥淺終見無功病淺而藥深反增他劇勢緩而投急則急則拂亂其經病劇須用切藥緩則投挫不及以本
為而治本病病去便當行別議防變症而用聖藥變症難逆學將來故偏行補法未必盡為怯弱執用平溫豈應機是
虛寒合用而用當去則去為隨病更凡要在我故升麻連翹芥連瀉則許疎通投補劑而胸膈減食內熱便宜清利多
弱而可用身無壯熱休加乾葛柴胡臉不紫紅勿進芥連瀉則許疎通投補劑而胸膈減食內熱便宜清利多
從藥而表爛瘡疼熱鬱心煩不休煩知患目便瀉胃弱芥連瀉則許疎通投補劑而胸膈減食內熱便宜清利多
熱瀉溫補其宜所宜瀉泄清稀涼藥終為不合胃虛弱而補陰忌增泄瀉三焦擁而益陽虛發狂煩喘滿便清雖虛煩
而可補氣粗腹脹加秘結而可通暖暖有痰切勿亂投半夏熱沖作嘔且教慢入乾姜氣不抵則參芪秦捷脾胃虛寒
則桂附成功設使渴煩喘秘用此反生跋扈苓連解熱毒於未解劑粗清血熱於血泡若違勢在行數此輩皆為所叱
是故六七日內不起保元十奇無禁八九日外變生本者真攻何違補法不宜早加溫約必須在後發散乃作先鋒溫
補縱為截陣連斯節制庶不誤人識此玄機用之無窮

權宜賦

症有緩急治宜權宜且如紅紫嫩腹兮涼血為上灰台平怕兮補氣最良山不快兮為表實而發散可用二便閉兮是

理數而疎利何妨毒不能以速散毒甚者令微汗之發越熱不能以盡除熱劇者使小便之清長三陰甚而多寒必投辛熱三陽實而多熱無過苦涼是故補元氣參芪白朮養榮血歸芍地黃養氣末邪重按烏而輕桂枝疏通實熱微枳壳而其大黃解熱毒參連梔子快斑疹葉華防風牛薢連翹唐中之要領甘草乃藥中之君王玄參桔梗能治咽痛不通車前利其膀胱氣逆分陳皮青皮胃寒分丁香木香泄瀉分訶子豆蔻嘔吐子砂仁藿香祛風熱分蠅退白芷定驚搐令天麻養髮頭痛子川芎薑朮蔓荊可用腰痛子杜仲牛膝玄胡堪當麥門訖為清心熱而止煩渴厚朴腹皮癰水腫而消腹脹五味杏仁潤肺止咳而定喘山查枳實消食行滯氣為良半夏南星貝母汗泌羌獨活蘇麻黃紅花牡丹皮可除血熱虎骨穿山甲能起癰瘡食積神曲麥芽草葉後重枳壳檳榔木香厚角於羊解平心肺之熱藜花香附退平脾胃之黃乳香沒藥止痛就女附子回陽前胡蘇子能消痰嗽諸苓澤瀉茯苓清利小腸此乃藥味加減之權宜若病之輕重各有主方

指南賦

人參益肉甘草和中用黃芪而定陰得蟬蛻而開肌紅花有活血養血之功生地有涼血行血之功症若乾紅便宜加入紫草滑肌通竅毒癰瘡行熱癰症之而有益虛寒誤用以瀉使山查善過癰瘡能消食積魚理滯氣於補益方中且解鬱積於透肌湯內輕其表而涼其內功在則翻疎其肌而發其機妙在蟬蛻利咽喉而清氣道能於微而透開提功必資子桔梗分清濁而利小便消瘡毒而去腸脹功莫大於腹皮川芎引清陽而透表勿缺於未清之前少酌散陰氣以濟陽可多於散足之後壯丹皮去血中之毒壯熱紫紅為聖藥地骨皮去氣中之毒毛茛藪甚是良工官桂有鼓動陽氣之能神倦而不振者用之以收定効丁香有發助元陽之力肉虛而不起者得之以奏奇功木香順氣而理脾寒泄瀉湯中必用乾薑療肌而退胃熱渴煩方內須加白朮茯苓能健胃佐參芪而益氣當歸生地補陰氣居枳壳而潤堅解熱毒於犀角黃連惟熱甚則前後堪用定心煩於麥門五味有滯症則始終宜加大附子反本回元能理虛寒而收戰慄天花粉消痰清胃且收肺氣以發聲音白芷疎風祛毒憑之而發散紫蘇流氣定邪賴是以驅除元否有連毒走表之功防風有散邪逐毒之妙姜盞則利於肌膚損風定痒如神枳壳能平于胸膈下風寒中氣遠開膈定喘於麻黃應遵憑之而散散平胃溫中於胸膈腹脹用是以消磨龍骨枯雞樗行流泄諸苓澤瀉暫用安便乾姜溫中氣而止

嘔吐是山胃寒而虛瀉者宜用則用大黃湯腸胃而潤燥堅是以熱藥而使秘者當加即如鼠粘子通肌滑竅外致表虛內動中氣外增滑瀾。紫草性寒如誤用瀉便。白朮多用恐能燥瀉使潤瀉之氣不行則痘難成漿。茯苓猪苓燥瀉滲泄能令水氣下行小便多用恐津液耗散外不行致內防發渴。訶子龍肉枯礬皆能阻塞肌竅氣虛之症用此毒愈不能前進雖能流泄甚不可施凡治虛症泄瀉只宜補益為妙。車前滑石性猛利水極速傷脾胃脾土一傷則中氣必敗而塌陷雖之內攻外刺百變俱生。山梔性寒降大虛症便赤必非實熱。大黃湯滌汗極耗胃氣性寒潤下雖熱渴便實皆不可用。生地性寒涼血亦能潤腸。枳殼下氣寬腸多用則瀉。天花粉解內熱。乾葛發表熱性涼外防表虛內恐傷胃況太涼則痘不長。烏梅酸收。砂仁散氣。山查散血解結多用則內虛。半夏性悍多用則消渴。麻黃開竅走泄恐成表虛氣脫。

虛狂禁用藥性

蟬蛻能開通肌竅惡成表虛耗元氣。鼠粘子通肌滑竅外致表虛內動中氣外增滑瀾。紫草性寒如誤用瀉便。白朮多用恐能燥瀉使潤瀉之氣不行則痘難成漿。茯苓猪苓燥瀉滲泄能令水氣下行小便多用恐津液耗散外不行致內防發渴。訶子龍肉枯礬皆能阻塞肌竅氣虛之症用此毒愈不能前進雖能流泄甚不可施凡治虛症泄瀉只宜補益為妙。車前滑石性猛利水極速傷脾胃脾土一傷則中氣必敗而塌陷雖之內攻外刺百變俱生。山梔性寒降大虛症便赤必非實熱。大黃湯滌汗極耗胃氣性寒潤下雖熱渴便實皆不可用。生地性寒涼血亦能潤腸。枳殼下氣寬腸多用則瀉。天花粉解內熱。乾葛發表熱性涼外防表虛內恐傷胃況太涼則痘不長。烏梅酸收。砂仁散氣。山查散血解結多用則內虛。半夏性悍多用則消渴。麻黃開竅走泄恐成表虛氣脫。

麻疹附餘

夫麻疹之與痘瘡始似而終殊原同而症異痘瘡發于五臟麻疹發於六腑熱麻疹一症先動陽分而後歸於陰經故標屬陰而本屬陽其熱也氣與血分相搏故血多虛耗其治也先導散行氣而後滋陰補血凡動氣燥悍之藥皆不可下也。

一發熱之初增寒壯熱鼻流清涕身體疼痛嘔吐泄瀉咳嗽氣急腮紅眼赤多是麻候宜服升麻葛根湯表之得汗則皮膚通暢脈理開豁而麻疹易出也於發散藥中用葱白生薑使孔竅中微汗潤澤免熱閉發搐之症。

一發熱咳嗽之時既明麻疹有出不快者用麻黃湯羌活湯消毒飲發散解毒之劑外以羌萎酒糟蒸熱擦之自頭上

手足麻痺面紅多者為佳

凡者麻症之發多于耳後項上腰眼先見其項大而不長其形小而勻淨既出之時如色紫紅乾燥暗晦乃火盛毒熾宜用六一散解之四物湯換生地加紫胡黃芩乾葛紅花牛蒡連翹之類滋陰涼血熱自止所謂養陰退陽之義也如麻疹出後見風沒早未清者宜清毒飲加散之藥雖不復出亦尋愈矣有麻出三日不沒者乃內有實熱宜四物湯加清利之藥則熱自解而麻自消矣神注麻症宜

一麻後瀉利者乃積熱移于大腸宜四苓散加水通麥連白芍芍藥或蓮芩丸香連丸之類

麻後痰嗽不止四物合二陳加瓜蒌桔梗五味湯如麥門枳殼喘加蘇子桑皮

麻後牙疳紅腫者清胃湯合甘桔湯加牛蒡則亦至矣胃爛者不治之症也

一孕婦出麻以四物湯加白朮條芩艾葉砂仁以安胎清熱為主則胎不動而麻自愈矣麻症正出之時不進飲食者但得麻色淡紅潤澤亦無害也乃熱毒未解內經實熱故不食耳麻退不食者用四物湯加神麴砂仁一二貼自能食矣凡出麻疹之時大忌常規生冷宜避風寒暑溼苟有不慎最為害患戒之慎之

麻疹辨疑賦

麻雖胎毒多帶時行氣受臨熱傳染而致其發也與痘相類其變也此痘雖經先起於陽後歸於陰毒甚於脾熱流于

心臟肺之傷肺則尤甚然始之變腎則無症初則發熱有頸傷寒眼胞困倦而難起鼻流清涕而不乾咳嗽少食煩渴

難安邪目視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其形若疥其色若丹出見三日漸沒為安隨出隨沒喘急須

防根窠若腫寸疹而兼癰皮膚加赤令疹尤大斑似錦而明兮不藥而愈如爆而黑千百無一全瘡疹既出調理甚難

臥欲暖飲食宜淡咳嗽延遲未不禁酸鹹忽生喘急肺受風寒心脾火灼口舌生瘡脾胃熱津液常乾有此變症治

法不同微汗毒解熱勢少山二便清調氣行無壅脹理拂鬱平即當從散腸胃秘結平急與疎通異與者不必憂治邪

從明解自行者不必遠止毒以利散麻後多劇于熱毒移于太陽咳嗽喉痛寸脈氣滯於心胸口渴心煩法在生津奉

血飲食減少治宜調胃和中諸症無常臨期變通此則麻之大旨妙用存乎一心神注麻症宜

麻疹輕重不治要訣

或熱或退五六日而後出者輕。淡紅滿潤面勻淨而多者輕。發達三日而暫沒者輕。頭面不出者重。紅紫暗燥者重。咽喉腫痛不食者重。胃風沒早者重。移熱大腸變利者重。黑暗乾枯一出即沒者不治。鼻唇口張目無神者不治。鼻清黃黑者不治。氣喘心前吸者不治。麻後牙痛具爛者不治。

治痘合用藥性

夫藥有寒熱溫平之性酸苦辛淡鹹甘之味氣味陰陽不同浮沉升降各異早甘發散氣為陽酸苦湧泄味為陰濁者走於五臟清之清者從其腰理清之濁者四肢可實濁之清者六腑壅至淡則水而酸則收早散可議鹹則軟而苦則泄甘緩須知橫行直達治法不同稍降根升製宜尤異故藥性為立方之大旨治病之樞機也開具於後

升麻。苦辛微寒解熱毒發散瘡疹初熱時用。柴胡。苦平性寒解肌表熱毒用之托痘。麻黃。苦甘性溫發熱惡寒者用散寒邪見瘡不用。紫蘇。辛溫痘前乾熱無汗暫用。葛根。甘平寒解肌表熱口乾渴者可用見瘡不用。前胡。苦微寒傷風咳嗽痰涎可用解熱。羌活。苦甘溫感風邪遍身肢節痛太陽表裏熱俱用。防風。甘辛微溫風熱瘡者可用。白芷。辛溫去頭痛皮膚之風除熱毒瘡之瘡。桔梗。苦辛溫寬胸膈理咳嗽利咽喉為諸藥舟楫。蟬退。甘溫退風熱解毒發痘紅紫熱甚者可用。紫草。苦寒痘紅紫熱甚者可用能散血解毒起痘。陳皮。辛苦溫健脾胃溫中化痰理氣退熱俱可用。半夏。辛溫化痰涎和脾胃止嘔吐俱用。白茯苓。甘淡溫利水除溼益氣和中痘後泄瀉亦用。厚朴。苦辛溫消腹脹健胃寬中泄瀉亦用。人參。甘溫止渴生津痘後元氣虛弱補則必用。黃芪。甘溫實脾理肺補氣虛痘後托裏必用。甘草。甘平生瀉大解熱毒安健脾胃諸藥可用。白朮。甘溫健脾消痞止瀉補虛熱甚煩渴必用。川芎。辛溫行頭痛補血虛血滯者可用。當歸。辛溫養血行血虛內血虛血熱多用渴不用。青皮。苦寒破下焦滯氣退熱消食。砂仁。辛溫止嘔吐消食健胃止腹痛孕胎痘必用。藿香。甘溫止嘔開胃進食溫中。紅花。辛溫治痘中血熱多則行血少則引血歸經。牡丹皮。辛苦寒去腸胃積血痘紅盛者用以涼血。地骨皮。苦平寒治骨蒸之熱。大腹皮。辛微溫消浮腫治腹脹散毒氣。蘇子。辛溫寬胸下氣止嗽消痰。白芍藥。苦酸微寒破堅癥補血伐肝消癥毒止腹痛。牛蒡。辛寒治喉痛解風熱毒痘紅紫熱甚者可用。細辛。辛溫開竅止嗽癰疽痛散頭面諸風。瑾麥。鹹辛微溫除風

然解毒症用和血丹定痔。川山甲。辛微寒解毒大能起痘防燥咽。皂角。辛微溫解毒毒用之引諸約直達瘡所。桑皮。甘寒瀉肺定喘下氣寬胸。大附子。辛大熱轉成逆痘寒不起泄瀉不止暫用。香附。辛微熱開鬱行滯氣消食助胃。黃連。苦寒瀉心大厚腸胃止驚悸痘中必用。黃柏。苦寒補腎虛降龍雷之火。山梔。苦寒涼心腎治細血散鬱熱癰瘡。犀角。苦酸鹹去心火之熱毒痘血熱者磨用。生地。苦甘寒涼心火之血熱瀉脾土之溼熱。熟地。甘平滋腎水補血益真陰痘中必用。滑石。甘溫燥脾去溼消食寬中。金銀花。甘平解諸熱毒痘紅紫毒盛者可用。丁香。辛熱脾胃氣或吐或瀉痘白者可用。乾姜。辛熱脾胃虛寒嘔逆痘白身涼可用起痘。肉桂。辛熱表症虛寒痘白不紅可用。訶子。苦溫腸胃虛寒泄瀉不止者可用。山查。甘溫行氣化痰起痘消食有製桑枝之功。大黃。苦大寒通大腸燥結瀉諸實熱暫用。滑石。淡大寒利小便解心火之毒熱閉者可下。木香。苦平溫和胃健脾痘痢散諸滯氣如神。肉豆蔻。辛溫內虛胃停食渴不止者可用。木通。甘平利水行氣熱閉不通者可用。連翹。苦平退五心煩熱散痘中熱毒。瓜蒌仁。苦寒潤肺下氣寬胸膈止嗽定喘。菊花。甘平治痘入目紅絲翳膜。杏仁。苦溫潤肺止嗽潤大腸。羚羊角。苦寒清肺肝解熱毒痘紅潤者可用。赤芍藥。苦酸微寒攻血痺止腹痛解熱毒。象牙。走鹹能起痘眼中有痘磨水搽上妙。枳殼。苦酸微寒破滯氣大腸熱甚者可用。枳實。苦酸鹹寬胸下氣小腸熱者可用。元參。酸苦微寒清熱毒治頸中瘰癧退無根之火。麥門。甘平止口乾煩渴退肺中伏火及心熱。荆芥。辛苦溫疎風退上焦火為主要治發狂瘧語。薄荷。辛溫清風熱清頭面之腫。貝母。辛苦微寒消痰止咳利心肺除風熱。胆星。苦辛除風痰利胸膈破堅消腫。乳香。辛苦溫調血氣定諸經之痛痘餘毒用。沒藥。苦辛平破血理氣止痛癰瘡後餘毒用。鹿茸。甘溫痘色灰白不起用之亦能行氣貫膿。牛膝。苦酸平活血生血引諸藥下行。何首烏。苦溫溫治痘血熱毒瘡。天麻。辛甘治風熱頭眩癰瘡癰癰。檳榔。甘苦溫降帶氣治後重如神大便秘者暫用。石膏。鹹辛寒降胃火消痰止煩渴。知母。苦寒滋陰補腎散下焦之火邪。葶藶。甘鹹利水通淋滋陰補血。麥芽。甘溫消食健脾。神麴。甘溫開胃進食中焦停滯可用。水片。辛熱狂燥甚者用一二厘以指尾血丸服。硃砂。甘微寒散狂言可用少許安神。射香。辛溫辟穢氣開竅少用藥內能起痘。

牛黃。苦寒解心火之毒發狂瘧結可用。人牙。淡鹹及白黑陷大瓶一二厘加射香起瘰。龍膽。苦寒解煩熱
利小便散熱毒。骨蒸。苦寒瀉肺火解毒上焦熱者可用。五味。酸溫能收肺氣消痰止咳滋腎水生津止渴。
苡仁。甘微寒除風溼理脚氣。山藥。甘溫補脾除痰。雞冠血。宛項血至清高屬真風和以酒發易化。蘇
桑虫。大能散瘰癧隨出隨沒者用之。糯米。甘溫滋脾之中氣制繁草之餘寒。黃米。甘溫益真氣而和胃氣。
生薑。半溫止嘔和中助陽發表又助參芪之力。大棗。甘溫安中養脾助十二經平胃氣生津液。

增補五寶金鑑其本卷之四

信州 翁仲仁 編著

錢塘 仇天一 參閱

治虛常用湯散歌

十神解毒壯丹紅桔梗生歸赤芍芩天腹相通燈草共三朝血熱毒奇功。凡治散鬱生肌黃耆桔梗甘地骨同大腹
氣結防燈草氣粗氣湧顯神通。保和湯內地赤紅紫結靈草不通結木燈心與姜水十神服後用雀巢。連服
與保和同紫結靈草不通結木燈心與姜水十神服後用雀巢。連服
足後調停血氣是良方。保元湯用草參芪白朮益歸無地隨芍藥川芎桑寄生六朝不起用無疑。大連細散防
風赤芍歸靈草木通滑蛇黃芩旋子共室質加入最有功。四順清涼草大黃當歸赤芍共枳良氣粗結木燈心與姜水
濕透須入木香。木香散用桂枝桑寄生前草草丁姜水共煎溫服後表虛內泄少通靈。異功散用桂枝桑寄生
歸陳木香丁附半為臣姜共煎溫足冷妙如神。泄瀉須知用理中人參白朮草參司四肢厥冷急煎神方
始奏功。泄瀉須用益黃膏陳河勒草丁香及加肉蔻木香等藥是向愈是神方
參芪散即古方保元湯

專治元氣虛弱精神倦怠肌肉消瘦面色晄白飲食少進睡臥室靜而不寐者不分已出未出皆治
人參一錢黃芪二錢甘草五分切細生用出定久用

楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋為元氣虛弱者立也後世治虛者多主之不分元氣虛實之異概用於血
熱毒排之症是為以實攻實並不識哉右用水一鍾姜一片煎四五分不拘時服

參芪飲加減集忘法

如前虛症辨認不差以此方為主前後始終皆不可易中間症象見雖或不同要皆氣虛所致則以本方參酌而
加減之毋得過投致散苦寒之劑初起未出之劑只可少濟以開提勻氣之功如桔梗川芎之類發足之後助以收
斂如白朮芍藥茯苓等耳

出不快加川芎 芍藥 茯苓 用神效 人參

小便赤加大腹

葉用神效 人參

大便澀加

禁用人參

小便澀加

禁用人參

大便實秘加

禁用人參

泄瀉加

禁用人參

嘔吐加

禁用人參

煩渴加

禁用人參

減食加

禁用人參

傷食加

禁用人參

喘急在三四日

禁用人參

痰則後痰治

禁用人參

實喘不道是毒

禁用人參

下氣等約六七日

有虛症見者決非

虛之極也加人參

禁用人參

寬中下氣等約六七日

有虛症見者決非

否亦有傷於生冷

禁用人參

外感用

禁用人參

熱四五日間手足厥冷

禁用人參

四肢不起

禁用人參

官解川芎

禁用人參

咳嗽加

禁用人參

癰疽加

禁用人參

癰疽加

禁用人參

十神解毒湯

古方

癰疽加

禁用人參

專治身發壯熱

禁用人參

癰疽加

禁用人參

皆治之

禁用人參

癰疽加

禁用人參

生地 紅花 桔梗

連翹 川芎

赤芍 牡丹皮

大腹皮

此方治血熱

禁用人參

癰疽加

禁用人參

細壯丹皮有解毒之良用

禁用人參

癰疽加

禁用人參

毒湯恐驟用寒涼不惟水伏熱毒

禁用人參

癰疽加

禁用人參

此方用之為穩當若不得已而用黃連

禁用人參

癰疽加

禁用人參

十神解毒湯加減法

禁用人參

癰疽加

禁用人參

身熱壯甚加

禁用人參

癰疽加

禁用人參

身熱壯甚加

禁用人參

癰疽加

禁用人參

身熱壯甚加

禁用人參

癰疽加

禁用人參

大便黑加

吐血乾嘔加

使紅加

小便赤加

小便短澀加

小便澀加

大便澀加

大便結加

煩燥加

煩燥狂亂澀加

咽乾痛加

泄瀉加

嘔加

以上并用燈心十四根水煎服

血熱症亦禁

血熱症疹熱毒癰疽發毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以寒泄使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則症雖從客亦能消散自易變而易化也所謂經其表而涼其內此方益得安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者清之實者平之此方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之症愈具辨認不差並以本方處治之切勿不得下參芪白朮茯苓補氣之藥于熱症未發之前如誤而用之是謂以實攻實腹脹氣喘狂亂澀澀咽喉腫痛口舌生瘡變症百出所謂邪得瀉而愈盛也嘔吐泄瀉俱不得用半夏丁桂乾姜木香藿香訶子肉果如誤而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽痛狂亂失血便秘無所不至矣至於龍骨枯礬帶澀之物且能使氣道阻塞是欲其出而閉之門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之及至血已成氣血定位頭項白光熱將行漿又宜易方另行別議

羌活散鬱湯

專治實熱推盛鬱遏不得達表氣粗喘滿腹脹燥狂言譫語睡臥不寧大小便秘毛豎面浮眼張若怒並有神效並為風寒外搏出不快者同治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮 大腹皮 川芎 連翹 甘草 紫草 鼠粘子

右為粗散水一鑊燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣未盛或為寒所抑或肌肉粗厚致腠理閉肌裏不通經絡阻滯使毒氣不能引毒達表猶竅而出則熱毒壅遏於內為腹脹為喘急為狂語為狂瀉為黃痞為失血皮燥毛直面急眼張睡卧不安驚悸多哭

此熱毒癰毒之症辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不凝而其出自易矣若活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勻氣之能則芥連胡鼠粘善解鬱熱地骨皮清熱於筋骨之間且能清肺解紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱毒之症效大而功用極妙若驟用寒涼如蒼連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越逆經絡為疽癰為癰者有之水火硬閉者有之至於人參黃芪白朮茯苓溫補之劑誤用則其癰或禍不旋踵如丁桂木香是附之類以熱攻熱殺人立至元宜戒慎故發熱之初至見熱之後並宜以本方處治依後法而加減之

羌活散鬱湯加減法

初發身熱壯甚腮紅面赤毛焦皮燥咳嗽喘急者加升麻煖湯君如天花粉子葛根脹喘急鼻塞面赤若惡毛直皮枯加麻黃便秘加當歸枳殼甚則加大黃嘔吐加藜蘆全瀉五倍皮禁用生薑丁香木香厚夏潤泄加升麻禁用白茯苓喘嗽惡風加桑皮蜜麻失血加犀角地黃黃連黃連斑加黃連黃連山梔小便赤澀加滑石山梔地黃芍藥黃連加黃芩犀角驚悸加木通山梔橘加青皮不思飲食加山查傷食加山查神機參黃見點二三日間出不快利加鼠粘山查蟬退名貴散皮急肉緊身熱壯甚加葛根黃連胡蘆紅赤色加生地紅花牡丹皮白芷防風見點三日之內並依本方加減及三日之後痘瘡出齊血泡已成而前症悉平不得復用此方恐發太過難于行漿另有方約在後其禁用藥劑並從血熱痘症法而裁治之故此方不立禁忌辨

太乙保和湯又名葉草透肌湯

專治血熱痘症眼十神解毒湯後熱症悉去內外和平見點三日之後不易長大粗肌者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參 紅花 生地 甘草 糯米五十粒

右用燈心七根姜一片水七鍾煎六分溫服

便瀉腹脹加大風玄繁紅不潤加當歸蟬退出不快加鼠粘子陷塌加黃芩漏加白朮不自加防風水泡加白朮芍藥加五味子冬馬加參門冬