

故脈濇者死也

汪琥曰日晡所發潮熱者府實燥甚故當其經氣王時發潮熱也獨語者卽譫語也病人自言爲譫獨語如見鬼狀乃陽明府實而妄見妄聞劇者甚也成註云熱甚昏冒正氣故不識人循衣摸牀者陽熱偏勝而躁動於手也惕而不安者胃熱冲膈心神爲之不寧也又胃熱甚而氣上逆則喘直視則邪干臟矣故其生死之機須於脈候決之

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞢故也以忘津液胃中乾燥故令大便鞢當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

註

陽明病本應自汗出醫誤以爲風邪更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞢故也然無或滿或痛之苦者以重汗亡津胃中乾燥故大便鞢本無宿食也則當問其小便

日幾行若本一日三四行今日祇再行可知
大便不久則出蓋小便數少則津液當還胃
中故知不久必大便自出不須藥也

集註

方有執曰水穀入胃其精者爲津液粗者成
櫧滓水精滲出腸胃之外清者爲津液濁者成
外而爲汗下而爲小便故汗與小便過多者
皆能奪乎津液所以櫧滓之爲大便者乾燥
結硬而難出也然二便者水穀分行之道路
此通則彼塞此塞則彼通小便出少則津液

還停胃中必大便潤而自出也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大豬胆汁皆可爲導

註

此承上條詳其義以明其治也陽明病自汗出或發汗小便自利者此爲津液內竭雖大便鞭而無滿痛之苦不可攻之當待津液還胃自欲大便燥屎已至直腸難出肛門之時則用蜜煎潤竅滋燥導而利之或土瓜根宣

氣通燥或豬膽汁治熱潤燥皆可爲引導法
擇而用之可也

集註

成無己曰津液內竭腸胃乾燥大便因鞭此
非結熱故不可攻宜以潤藥外治而導引之
張璐曰凡係多汗傷津及屢經汗下不解或
尺中脈遲弱元氣素虛之人當攻而不可攻
者並宜導法

程應旄曰小便自利者津液未還入胃中津
液內竭而鞭故自欲大便但苦不能出耳須

有此光景時方可從外導法瀆潤其腸腸潤
則水流就濕津液自歸還於胃故不但大便
通而小便亦從內轉矣

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀
攬之勿令焦著欲可丸併手捻作挺子令頭銳
大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀
道中以手急抱欲大便時乃去之

內臺方用蜜五合煎凝時加皂角末五錢蘸捻

作挺以豬膽汁或油潤穀道內之

豬膽汁方

大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

內臺方不用醋以小竹管插入膽口留一頭用油潤內入穀道中以手將膽捻之其汁自入內此方用之甚便

土瓜根方

缺

接
土瓜卽俗名赤雹也肘後方治大便不通採

根搗汁用筒吹入肛門內此與上豬膽汁方
同義內臺方用土瓜根削如挺內入穀道中
誤矣蓋蜜挺入穀道能烊化而潤大便土瓜
根不能烊化如削挺用之恐失仲景製方之
義

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便
難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

註少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜大
承氣湯者乃因勢甚速消灼腎水津液不

能到咽故不必待其有可下之證而急下之
是下其熱以救將絕之水緩則腎水乾竭陽
必無依躁冒自焚而死也目中不了了而睛
和者陰證也睛不和者陽證也今傷寒六七
日目中不了了睛不和者是腎水爲胃陽所
竭水既不能制火則火上熏於目而眸子朦
朧爲之不了了也此熱結神昏之漸危惡之
候也雖外無陽證惟身微熱內無滿痛祇大
便難亦爲熱實故曰此爲實也急以大承氣

湯下之瀉陽救陰以全未竭之水可也。睛不和者謂晴不活動也。

集註

方有執曰：了了猶瞭瞭也。素問曰：陽明主內其脈俠鼻絡於目靈樞曰：足陽明之正上循咽出於口還繫目系合於陽明也。又曰：足陽明之筋其支者上頸上俠口合於頰下結於鼻上合於太陽。太陽爲目上綱陽明爲目下綱所以目中不了了，睛不和，知胃實也。急下者任脈循面入目督脈上繫兩目中央諸脈。

皆屬於目而人之精神注焉是以宜急下也
喻昌曰少陰有急下三法以救腎水一本經
水竭一木邪涌水一土邪凌水陽明亦有急
下三法以救津液一汗多津越於外一腹滿
津結於內一目睛不慧津枯於中合兩經下
法以觀病情生理如身在冰壺腹飲上池矣
張錫駒曰陽火亢極陰水欲枯故使目中不
了了而睛不和急下之所以抑亢極之陽火
而救垂絕之陰水也

魏荔彤曰陽明燥屎應下胃實應下俱詳考
其脈證矣乃有表裏無他證獨於陽明胃脈
所發見端倪處體認其證如傷寒六七日太
陽已罷陽明已成其目昏暗朦昧若隔雲霧
而不了了明白者此證名爲睛不和也陽明
熱盛循經絡而發其昏朦之象以致睛失其
光此內熱盛而爲實其機已兆兼以大便軟
而難身有微熱者則胃實已真故曰此爲實
也急下之宜大承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

註

陽明病之人小便自利大便當鞭小便不利大便不鞭是知鞭不鞭不在熱不熱而在液之竭與不竭也今小便不利而大便乍難乍易者蓋熱將欲作結而液未竭也有時微熱者熱入裏也喘者熱乘肺也冒者熱乘心也不能臥者熱併陽也此皆一派熱結便鞭之徵神昏譫狂之漸雖無滿痛亦必有燥屎宜

大承氣湯下之自愈也

集註

王三陽曰此證不宜妄動必以手按之臍腹
有鞭塊喘冒不能臥方可攻之何也乍難乍
易故也

林瀾曰旣微熱時作喘冒不能臥則有燥屎
已的自宜下逐裏實爲急安可復以小便利
屎定鞭始可攻之常法拘哉

汪琥曰此條病未經下而有燥屎乃醫人不
易識之證或無已云小便利則大便鞭此有

燥屎乃理之常今病人小便不利大便乍難
乍易何以知其有燥屎耶蓋大實大滿之證
則前後便皆不通大便爲燥屎壅塞其未堅
結者或有時而併出故乍易其極堅結者終
著於大腸之中故乍難燥屎結積於下濁氣
攻衝於上以故時有微熱微熱者熱伏於內
不得發洩也後條辨云濁氣乘於心肺故旣
冒且喘也不得臥者胃有燥屎所擾卽胃不
和則臥不安也凡此者皆是有燥屎之徵故

云宜大承氣湯

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此
有燥屎故使不大便也

註

病人不大便五六日繞臍痛者是腸胃中燥
屎結無去路故繞臍痛也煩躁發作有時者
是燥屎穢熱上攻則煩躁不攻則不煩躁故
發作有時也不須以小承氣湯試之直以大
承氣湯下其燥屎大便利自可愈也

註集方有執曰病人謂凡有病之人而證犯如此

者則皆當如此治之此示人辨凡百胃實之大旨也

程應旄曰攻法必待有燥屎方不爲誤攻所以驗燥屎之法不可不備無恃轉失氣之一端也病人雖不大便五六日屎之燥與不燥未可知也但繞臍痛則知腸胃乾屎無去路滯濇在一處而作痛煩躁發作有時者因屎氣攻動則煩躁發作又有時伏而不動亦不煩躁而有繞臍痛者斷其不大便當無差矣