

神鑒本經會通

神農本經會通卷之三

菓部

橘皮

橘核

青橘葉

柚

香椽子

青皮

杏核仁

杏花

杏枝

杏實

大棗

生棗

棗葉

梅實

白梅

梅葉根核

桃核仁

桃花

桃梟

桃毛

桃蠹

桃莖白皮

桃葉

桃膠

桃實

桃符

藕實莖

即蓮

藕



藕節

荷鼻

蓮花

鷄頭實

蓬蘽

覆盆子

枇杷葉

李核仁

李核皮

李根皮

李實

荔枝子

栗

栗殼皮

葡萄

芰實

橙子皮

柿

附諸

椑柿

芋

烏芋

甘蕪

沙糖

石蜜

安石榴

梨

豆蔻

木瓜實

橄欖

林檎

胡桃

海松子

榛

山楂子

楊梅



南京中医药大学图书馆所有

柰

植實



南京中医大
版权所有

本
禁

誠實

務實

創

新

開拓

進步



神農本經會通卷之三

果部

橘皮○臣也。陳久者良。十月採。

味辛氣溫無毒○湯云氣溫味微苦辛味厚陰也。

○東云可升可降陽中陰也留白者補胃和中去

白者消痰泄氣○又云開胃去痰導壅滯逆氣○

珍云破滯去寒邪益肺開腃膈有草有木益脾胃

多用獨用損脾胃○走云寬膈快氣消痰止嘔治

腰痛膀胱腎氣兼療嗽吁欬逆。

本經云。主胷中痰熱逆氣。利水穀下氣。止嘔欬。除停水。五淋。利小便。主脾不能消穀氣。衝胷中。吐逆霍亂。止洩。去寸白虫。久服去臭。下氣通神。輕身長年。○陶云。此是說其皮功爾。以陳者爲良。其肉味甘酸。食之多痰。恐非益也。○藥性論云。臣味苦辛。治胷膈間氣。開胃。主氣痢。消痰涎。治上氣欬嗽。○孟詭云。橘止泄痢。食之下食。開胷膈痰實結氣。下氣不如皮穰。不可多食。止氣性雖溫。止渴又乾皮一斤。擣爲末。蜜爲丸。每食前酒下三十丸。治下焦。

冷氣取陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖熬。加少蜜爲丸。每日食前飲下三十丸。下腹臍間虛冷。氣脚氣衝心。心下結硬。悉主之。○日華子云。橘味甘酸。止消渴。開胃。除胷中膈氣。○又云。皮暖。消痰。止嗽。破癩。瘕。痃癖。○蜀經云。古今方書用之最多。亦有單服者。取陳皮擣末。蜜和元。食前酒吞三十丸。梧桐子大。主下焦積冷。亦可并杏子入合丸。治腸間虛冷。腳氣衝心。心下結硬者。悉主之。○象云。能益氣。加青皮減半。去滯氣。推陳致新。若補脾胃。不去

白若理胷中肺氣須去白○心云導胷中滯氣除客氣有白术則補脾胃無白术則瀉脾胃然勿多用也○珍云益氣利肺有甘草則補肺無甘草則瀉脾○能除痰解酒毒海藏治酒毒葛根陳皮茯苓甘草生薑湯手太陰氣逆上而不下宜以此順之陳皮白檀爲之使其芳香之氣清竒之味可以奪橙也○丹溪云陳皮治高青皮治低氣虛弱者少用治脇痛須醋炒爲佳○集云去白理肺氣消痰留白理脾胃消食○剗云陳皮味苦性辛溫留

白和脾健胃經。去白消痰能泄氣。膈間痰熱氣須憑。○局云。橘柚元來是橘皮。寬中下氣更溫脾。消痰治咳除煩嘔。青者須知破積宜。○橘皮則下氣寬中。消痰止嗽更宜止吐定嘔。除膀胱留熱停水。

橘核

味甘酸無毒。○又云治腰疼疝氣。

蜀經云。凡橘核皆治腰及膀胱腎氣。炒去皮酒服之良。肉不宜多食。令人痰喘。人乳柑。橙子性皆冷。並其類也。多食亦不宜人。今人但取其核作塗面。

藥餘亦稀用。故不悉載。○丹溪云。炒去殼爲末。酒
調服。治腎疰腰痛。膀胱氣痛甚痛。○日華子云。核
治腰痛。膀胱氣瘤。炒去殼酒服良。橘囊上筋膜。治
渴。及吐。酒炒煎湯飲甚驗也。

青橘葉

集云。導胃腸逆氣。行肝氣。乳腫痛。及腸癰。藥中用
之以行經。

柚

味辛氣溫無毒。

陶云。柚子皮。乃可服。而不復入藥用。此應亦下氣。
○唐本注云。柚皮厚。味甘。不如橘皮味辛而苦。其
肉亦如橘。有甘。有酸。酸者名胡甘。今俗人或謂橙
爲柚。非也。○陳藏器云。橘柚本功外。中實橙。酸者
聚痰。甜者潤肺。皮堪入藥。子非宜人。其類有味柑。
乳柑。黃柑。石柑。沙柑。橘類有朱橘。乳橘。楊橘。山橘。
黃淡子。此輩皮皆去氣調中。實總堪食。就中以乳
柑爲上。○日華子云。柚子無毒。治妊娠人喫食少。
并口淡。去胃中惡氣。消食。去腸胃氣。解酒毒。治飲

酒人口氣。○蜀經云。閩中。嶺外。江南。皆有抽。比橘黃白色而大。襄唐間。柚色青黃而實小。皆味酸皮厚。不堪入藥。今醫方乃用黃橘青橘兩物。不言柚。豈青橘是柚之類乎。然黃橘味辛。青橘味苦。本經二物。通云味辛。又云一名橘皮。又云十月採。都是今黃橘也。而今之青橘似黃橘而小。與舊說大小苦辛不類。則別是一種耳。收之。並去肉。暴乾。黃橘以陳久者爲良。古今方書用之最多。○丹溪云。橘柚屬木而有土與水。本草於條下叙功用。至五十

餘字皆言橘皮之能。非橘柚之謂也。橘柚并有穰
有漿者而名之。大者曰柚。則厚於橘。衍義以柚爲
橘。有無窮之患。何至是之甚耶。

香櫞子

蜀經云。又有一種枸音鈎櫟音公。如小瓜狀。皮若橙而

光澤可愛。肉甚厚。切之如蘿蔔。雖味短。而香氣大

勝甘橘之類。置之衣笥中。則清香馥馥數日不歇。

古作五和櫟素感切。所用陶隱居云。性溫宜人。今閩

廣江西皆有。彼人但謂之香櫞子。或將至都下亦

甚貴之。

青皮

味辛氣溫無毒。○湯云。氣溫味辛苦而辛性寒。味厚陰也。足厥陰引經藥。又入手少陽經。○東云。沉也。陰也。破滯氣愈低而愈効。削堅積愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分。下飲食入太陰之倉。○又云。快膈除膨脹。且利脾胃。○珍云。破堅癖滯氣。左壁積氣。下焦濕氣。無氣用之。損元氣。厥陰少陽有病。皆須用。臨病用時。尤當慎之。○捷云。削堅積攻滯。

氣安脾下食。厥陰經藥治下尤良。○蜀經云。主氣滯。下食破積結。及膈氣方用之。與黃橘全別。○象云。主氣滯。消食破積結。膈氣去穠。○心云。厥陰經引經藥也。有滯氣則破滯氣。無滯氣則損真氣。○液云。主氣滯。下食破積結。及膈氣。或云與陳皮一種。青皮小而未成熟。成熟而大者橘也。色紅故名紅皮。日久者佳。故名陳皮。如枳實枳殼一種。實小而青未穰。殼大而黃紫色已穰。故殼高而治胷膈。實低而治心下。與陳皮治高。青皮治低。同意。又云。

陳皮青皮二種。枳實枳殼亦有二種。○丹溪云。苦辛鹹陰中之陽。主氣滯。破積結。少陽經下藥。又消食也。陳皮治高。青皮治低。氣虛弱者少用。治脇痛須醋炒爲佳。○治小腹痛。須用之。瀉肝氣勿多服。損人真氣。○創云。青皮苦寒。攻滯氣。削堅積。治下宜良。厥陰經藥斯能引。下食安脾得此強。

杏核人。○惡黃芩。黃芪。葛根。解錫毒。畏蘿蔴。○得火良。湯浸去皮尖。熬令黃。兩仁者殺人。用須去之。可毒狗。○五月採。仍用家園種者。山杏不堪入藥。