

先生外科證治全書

癰疽總論

一毒由心生心主血而行氣氣凝血滯而發毒患盤踞徑寸者
癰按之陷而不即高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成按之隨指而
膿當攻托醒消一品立能消腫止疼為療癰之聖藥白陷稱症
氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏
白毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未
凝既出膿後癰有熱毒未盡宜托疽有寒凝未解宜溫既患
然陰虛陽實之治迥別古書未詳因立其首備覽焉諸疽白陷
陽和通泰何能解其寒凝已潰而陰血乾枯非滋陰溫暢可能
不能化毒者陽和一轉則陰分一結之毒自能化解血毒
可通以膝裏之藥仍不可緩一容一縱毒即逗遛一解
猶無米之炊也滋補而不兼開膝僅可補其虛弱則
以助盜糧矣滋補不兼溫暖則血凝氣滯孰作醒
一知一榮清火以解毒殊不知毒即是寒解寒而
血之化必由溫也豈可涼乎況清涼之劑僅可
行清解也傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒
止則惡自脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤

陰疽論名

陰毒之證皆皮色不異然有腫與不腫者有痛與不痛者有堅鞭難移有柔軟如縣者不可不堅痛而難忍者流注也腫而堅鞭微痛者貼骨鶴膝橫痃骨槽等類也不腫而痛骨節麻木也堅鞭如核一經不起不痛者乳岩瘰癧也不痛而堅形大如拳者惡核失榮馬刀也不痛不堅也不痛而堅堅如金石形大如升斗者石疽也此等症候盡屬陰虛無論年塌大小毒發初起疼痛者易消重按不消者毒根深固消之不易治之之法集有一定之方在焉

部位論名

毒生頭頂有髮疽之名頸項有落頭對口腦疽之號鴨卵因毒火於腋中魚肚緣患生於腿肘夾疽雙瘡喉側突棍原因脚骨潰有驢眼之稱牛程毒匿脚皮正有湧泉為號腹癰指腹筋袋父母指之爛名扁擔怪肩穴中之癰毒鬚前疽耳後發腿曰腿癰下稱跨馬白謂冬瓜手發背脚又號懸癰漏稱海底指說蛇頭中謂甲疽膝蓋腫云鶴膝臂子癰云子癰馬刀癰於臉上骨槽曰疽患登心口貼骨疽毒路環跳臂尖毒則曰臂疽臂上癰乃云臂毒諸名由部位以推治法務須潰當觀現在之形已潰潰久虛悶初起之色初起色紅仍施癰藥初發色白當用丹疽奏效如世人多投火炭災草或用半災半生殊不知托裏散內用人漫者並非以漫補虛不過以漫力卻無補毒之害災炭止補氣而不能托毒災草止補中而不能解毒倘毒氣未盡誤投十全等湯致毒反得補助毒攻內腑則如之何凡遇初潰大癰宜止其痛痛息則毒散其虛年老耆投漫草皆災也如體旺家貧者無漫亦易收功

治法

爛潰不斂治法如爛潰不堪之患以洞天救苦丹三服每服三錢陳酒送服醉蓋取汗隔後再服醒消丸兩日又送一服再隔兩日再送一服所空隔之兩日以醒消丸每日一服服早晚各進五錢最急險者可奏奇效

患乳毒根治法
三日前者六七日不愈又起名曰落貼餅去毒之效速也獨不知弱

毒氣攻心治法
錢氏云凡受降藥甘毒一致兩煎濃汁調未令病者時刻呻吟至失半日然止
神氣未

癰癤治法
凡患色紅腫痛根盤十餘者是癰發毒三四日尚未作膿以嫩膏圍外內以醒
三錢即止其痛夜間得睡次日患皮起皺再服全消如過四五日患將作膿亦以醒

陰疽治法
 亦醒點四
 早消分腫
 晚九許難
 初輪亦穿
 肝起服早之痛
 毒之如晚以洞毒
 攻內開盤敗天散
 腑大不毒膏速
 神平滿湯貼平
 昏塌一輪不此
 即根寸送幾以
 死盤亦一日大
 夫敷紅次收變
 色腫慢皮功之
 不者皺如法
 腫痛自盤患
 明不痛再敷
 而散色疥服
 漫者丸穿者
 明梅瘡或頂
 乃亮花倘取
 氣血此潰背
 直舌即頭
 兩丹用膏
 虛最皆托
 也服消毒
 患腫腹腫
 之證醒
 不倘痛消
 痛誤丸
 而服寒
 平服涼
 者其色

石疳凝結之治法
治法一之
此解之法
日久氣非
起能黃
見如行不
出惡行能
核紅則開
弱凝凝其
則大結膝
不之如裏
合毒非
再急隨肉
以消桂
患陽炎
生和治
疳湯姜
片庫不
半方解
貴列悉
每之凝
日於結
之輪後
服照此
貴方味
消治醋
如無暑
血連不
至愈能
日大如
行如增
一斗減
也者定
膜見

其之內
外當服
皮膚陽
血和湯
舌金湯
口托雙
皮裏以
藥散活
中加薑
以熟陸
地根
農士棒
竹片爛
頭各加
日一食
兩鹽
煎前少
湯許
煎數
服敷
使十日
劇作
後養
日以半
陽月
和解
凝皮
膏敷
貼日三
滿輒
患而
上有
空膿
出染
穿下

惡核治法
大者名惡核
小者名痰核
與石疽可消
亦相類然其
凝結毒根最
深卻不易潰
未潰之內服
大補元等湯
外敷萬應膏
和九黃丸初
起其毒氣未
盡急投聖補
過數金消之
者大忌開口
則

口用大蟾
毒消殺之
流注治法
破肌刺數
膿腫痛者
是身也毒
陰分有麝
香孕婦忌
服溫補托
氣血虛寒
凝結一日
寒痰一日
氣毒其

此杜其初以續
心故乃大發
之變如皮
後五小色
下日之稍
內法變
仍如極
服患痛
小頂難
金輕忍
月即者
足十為須
丸穿服
以之陽
杜膿明
後多湯
之惡白
一接色
止所
厚用其
厚陽痛
黃和消
丸膏其
日未
和貼成
後湯之
腹前
者此之
下日症
早潰氣
晚後使
輪定已
服增成
使毒膜
毒疫者
破流至

六箇月其毒氣去盡而胎氣自安矣

上部治法

日初
石起
廊三
初月
起而
雨消
洞潰

即無熱毒之男

虫髮癰治法
油煎內服三

溫洗洗後以藥敷

頭面肥癢治法內油

因侯台去咽喉之地

腫繞外日前一氣短

侯
痺
台
去
痺
者
不
仁

或以生川附片

乳蟻治去其形

喉痛治法補用冰

梅比尋靈火不宜滿與刺炮然醫愈不除根

我亦屈注以下包好日易鳳仙遇時更甲換好

平部治去下部治去

上口鼻及乳吸相如藥盡未痊再如前法煎服重吸便可縮上倘不能復搗取草麻子一粒冷

魚肚癰
仁建生
每日早
晚服此
丸立消
切忌開
刀宜以
藥咬穿
庶不傷
筋而無
痛即之
箇色白
者應以
酒治之

胃之氣上逆則嘔吐

膿瘡治法
 生肌膏
 小兒因熱湯氣或食毒物或用瘡膏貼成一孔以金膏治之為金用局一破或

取三錢
光面熔
點化次
孔日煎
茶花地
下者湯
洗金頂
孔拉再
洗膏以
二鉛
次鎔
三澆
日薄
內加
毒水
紙片
煮照
盡患
色孔
變大
紅小
舌剪
以如
小膏
飛藥
犬一
龍方
收針
散刺
上二
乃三
月十

凡婦人須待月信之後方可貼起

驢眼治法
患生形如
脾骨呼夾棍
以疔未潰
色白以疔
起紅紅腫
以疔癰治
如爛潰

牛程蹇治法
 漆上底皮生一飽痛難步履
 速愈如患生脚底之瘡
 心名湧泉瘡當別紅白
 色磨台

流火治法復患生小紅腫熱以痛不化不爛世之內醫家惟以刀上鑲血結或一鱗魚血塗總無以全愈之日時常發作

日拂上二三三四日全愈
不復發時忌食猪肉

醫方

陽和湯
熟地黃一
麻黃五
鹿角膠三
白芥子三
肉桂一
生甘草一
包薑五
不用一
此方主治
骨節風寒

結石疳貼
 疳及漫腫
 無頭平塌
 白帶中一
 陰凝等
 疳及漫腫
 無頭平塌
 白帶中一
 陰凝等

陽和丸
肉桂一
麻黃五
細薑炭五
共研細末
麗水為丸

醒消丸
乳香一錢 藥末一錢 麝香一錢 雄精五錢
研和取黃米飯一兩搗爛入末再搗為丸如
蘭子大覆陀

醒消丸
內除雄精
西五
斗分
黃三錢
如（前
後法
用忌
飯烘
一每
兩服
為三
丸錢
凡熱
患陳
乳酒
壅送
服
嘔醉
痰蓋
枝取
汗
酒
醒
癰
消
痛
息

小金丹
白膠香
草烏
五靈脂
也龍
木
各製木一
皮與
昂
各爭末
七
等
水
三
二
錢

米粉一兩二錢為厚糊和諸末搗手捶為丸如芡實大此
一料約為二百五十丸

麝香錢五分
墨炭二分
麝香錢五分
墨炭二分

醉取汗如蒸初起一應入核應乳品橫症初起用服小消杯乃合止蓋功後不一能二時煎以銀及子者熱服之酒甚少服

如注等証成功將潰潰久者當以十九作五日早晚服則以杜流走患不增出但內有五靈脂與人參相

炭條陳年錠子鑿略燒存性所用

丁龍丸 甘遂 大戟 〇 必妥按法精製為粉白芥子炒磨為末各等分煉蜜為丸

觀音救苦丹 硫黃三錢 硃砂二錢 〇 共研細末入銅器燒火離火一粒久後要者頂上即然立刻燒過膏掩次日瘡

洞天殺苦丹 〇 性為未天有子蜂窠最如性悶息磨粉收每遇服久每服四錢黑煮湯送服

大棗丸 〇 以大山羊矢晒乾入核炒爛如性悶息磨粉收每遇服久每服四錢黑煮湯送服

回疔散 〇 泥裏火煨存性為末研和聽用條然後入前粉捶至成丸每服四錢黑煮湯送服

拔疔散 硃砂 白丁香 輕粉 乳香 蜈蚣各一 血竭 麝香各二 金頂硃六 〇 均製為末取蟾蜍一錢

奪命湯 銀花 草河車 赤芍 細辛 蟬蛻 黃連 殭蠶 防風 澤蘭 羌活 獨活 青皮 甘

草 等分

聖靈丹 真珠 西牛黃 冰片 錢各一 琥珀 錢四 硃砂 錢三 石鍾乳 錢二 〇 各製研粉入飛麴四兩研和每服取末五

三黃丸 熟大黃三兩 乳香 沒藥 各一 雄精 五錢 麝香 一錢 西牛黃 分三 〇 然後以乳末和入再搗千

五通丸 廣木香 五靈脂 麻黃 沒藥 乳香 各分末 〇 用飯搗爛入末再搗為丸如梧子大另以芎歸

蟾酥丸 寒冰石三 血竭 沒藥 膽礬 乳香 雄精 銅青 穿山甲 殭蠶 全蠍 酒炒各 硃砂 枯

梅角刺 水片 輕粉 紅硃 各三 蜈蚣 三錢 〇 各製為末用蠟牛二十一箇蟾蜍三錢酒化共搗為丸

梅花點舌丹 沒藥 礞砂 藤黃 熊膽 乳香 血竭 萼應 大冰片 沈香 各一 蟾蜍 麝香 各二

破大珠子 硃砂 牛黃 各二 〇 各製為末搗出蟾蜍以人乳化開入末和搗為五百九如綠豆大金箔為

取汗小癰初起服即全消白癰忌用

此要緊穴道將在發威之際服此甚效如與三黃丸開服更妙

此要緊穴道將在發威之際服此甚效如與三黃丸開服更妙

此要緊穴道將在發威之際服此甚效如與三黃丸開服更妙

此要緊穴道將在發威之際服此甚效如與三黃丸開服更妙

此要緊穴道將在發威之際服此甚效如與三黃丸開服更妙

千度
挫以
成老

千一

磨脂以研新脂

定情

膏消腫
每方金
兩止而

臨用

紅痛非

鯉魚膏

—

每取艾

卷之八

1

次加煎

仙囊

霜散

和痔藥

管方

和解凝

雨漫

天鮮草
斤入鍋

內執
入毒
黃瘡

紙貯
校資
傷瓶

芥子種

核膏

一兩攪勻退火攤貼凡瘰癧結核此膏貼暗消但毒根在內
白花膏 再下製一斤膏梔百段陸藥白蛇各三錢樟一水不發
極見 骨者 再下製一斤膏梔百段陸藥白蛇各三錢樟一水不發

紫微膏 香油四兩燭兩半黃蠟兩半真珠各五錢攪勻入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

麝蘇膏 麝香五錢兒茶六錢雄黃龍骨各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

時耳散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

消管方 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

鮮角膏方 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

喉證方 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

錢散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

真珠散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

赤霜散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

又方 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

南星散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

骨鯁方 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

刻歡丸 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

固齒散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

固齒散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

固齒散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

固齒散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

固齒散 凡耳內有膿作痛取新鮮乳白取各五錢至滴水不散入炒鉛粉三兩輕粉乳香阿魏白蠟沒藥

取齒丹○活脚魚一條每重十兩
毛用雞毛拂下以少許
舌上出血或鼻衄方
生香附生毒塊不能食乳谷
小兒疳瘡方
即愈又天門冬連黃苓去心元參等分
口古藥方
一分元精石二兩研末刺出舌
楊梅瘡敷藥
一指頭髮瓦上炙存性研粉每
千金肉托散○人參黃芪防風官桂白芷厚朴川芎桔梗甘草不用

二陳湯○橘紅五半夏錢二茯苓錢一甘草一白芥子二錢炒研

四物保元湯○川芎當歸白芍熟地人參黃芪炙草

又保元湯○肉桂生黃芪生甘草

加味四物湯○川芎當歸白芍熟地黃生甘草炒白芷茯苓五味子人參肉桂

十全大補湯○人參白朮炒茯苓炙甘草熟地白芍川芎當歸黃芪肉桂

六味地黃丸○熟地山藥澤瀉山萸肉茯苓丹皮

龍膽瀉肝湯○龍膽草當歸尾錢二銀花花粉黃苓連翹各錢半知母甘草丹皮防風木通

敗毒湯○連翹赤芍銀花歸尾黃苓花粉錢各草節錢一煎湯送醒消丸唯疔毒忌酒此小兒減半

外科之治法並藥方業已和盤托出尚有雜證亦藥到病瘳萬無一失盡錄於左

調經種子方○當歸身川芎吳茱萸各一錢香附各一錢五分白芍茯苓丹皮各八分延胡索廣陳皮各用

七分若經水先開者必色紫加蘇八分過期者必色淡加官桂乾薑熟艾各五分不論先期

雜證

九煎服化

錢各一

錢各一

錢各一

錢各一

錢各一

水金
藥愈
水不
酒生
冷海
寒冬
易羊
煎頭
出風
汁等
水證
再綠
煎心
煎竅
至中
無痰
味迷
去致
渣取
以橄
汁攪
共十
歸斤
一敲
鍋損
煎入
膿砂
成鍋
膏煮
用數
白滾
明去
楚核
八入
錢石
研白
粉持

入膏攪和每日早晚各取膏三錢開水送服或初起輕者取

吐血立效方○凡吐血多者口噴三錢開水送服或初起輕者取

醫家乃云吐血者其要為戒者吐血者其要為戒者吐血者其要為戒者

痰中有血方○活雄其時要為戒者吐血者其要為戒者吐血者其要為戒者

溺血頭痛如裂方○成歸一兩而日清晨空腹時不以血方乃止

偏身疼痛方○等分肉桂延胡索服即愈

手足骨節疼痛方○熟地兩錢桂心兩錢五靈脂兩錢冷酒入滴花燒酒二斤隔湯地過酒

箭風痛方○延胡索酒桂心兩錢五靈脂兩錢冷酒入滴花燒酒二斤隔湯地過酒

雷頭風方○炒藥錢愈之靈脂兩錢冷酒入滴花燒酒二斤隔湯地過酒

偏正頭風方○白芷三錢天麻三錢一服即愈

疳膨食積方○雞裏金十錢米糖化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

又方○少許淡白煮物金十錢米糖化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

閃脛促腰方○白杜仲厚朴桑白皮連骨鹽化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

赤眼淹纏方○白杜仲厚朴桑白皮連骨鹽化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

胃脘痛方○白杜仲厚朴桑白皮連骨鹽化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

又方○紅坊酒乳白杜仲厚朴桑白皮連骨鹽化與食食完全愈忌食炒豆熱油結鞭等物遲治傷目

夢遺方○熟地兩錢黃食花四錢再服十酒收水二痛息接服五性日全愈戒食生冷

白濁方○牛膝熟地黃食花四錢再服十酒收水二痛息接服五性日全愈戒食生冷

效嗽神效方○冰糖三錢共入蓋碗用泉水煎滾衝入蓋片刻俟溫連杏仁末服下早晚各一次為三服而愈如

煎無效