

S25-6

992

本足
丹溪心法附餘

海左書局印
王大錯署
二

SS71
055
172



丹溪心法附餘卷之一

外感門上

新安居士方 廣輯

中風 一 附中氣 預防中風

丹溪心法

中風大率主血虛有痰治痰為先次養血行血或屬虛挾火

一作痰

與溼又須分氣虛血虛

半身不遂大率

多痰在左屬死血少

一作痰

血在右屬痰有熱併氣虛 左以四物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁

右以二陳湯四

君子等湯加竹瀝姜汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用吐法一吐不已再吐輕者用瓜蒂一錢或

稀涎散或鯁汁以鯁半斤入醬葱姜等物料水煮熟先吃鯁次飲汁後以鵝翎探引吐痰用鯁者蓋引其風出耳

重者用藜蘆五分或三分加麝香少許薑汁調若口噤昏迷者灌入鼻內吐之虛者不可吐

初昏倒即搦人

中至醒然後用痰藥以二陳湯四君子湯四物湯加減用之

氣虛卒倒者用參芪補之有痰濃煎參湯加竹

瀝姜汁

血虛用四物湯俱用姜汁炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝姜汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝 肥

白人多溼少用烏頭附子行經凡用烏附必用童便煮過以殺其毒 瘦人陰虛大熱用四物湯加牛膝竹瀝

黃芩黃柏有痰者加痰藥 治痰氣實而能食用荊瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故也八四物

湯必用姜汁助之 遺尿屬氣虛以參芪補之筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治也 脈訣內言

諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛髮直項上竅面赤如裝或頭面青黑汗綴如珠

皆不可治

按內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守真作將息失宜水不能制火極是由

今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是溼土生痰痰生熱熱生風也邪之所轉其氣

必虛風之傷人在肺臟為多 許學士謂氣中者亦有此七情所傷脈微而數或浮而緊緩而遲必也脈遲浮

可治大數而極者死 若果外中者則東垣所謂中血脈中府中藏之理其放四肢不舉亦有與痰相類者當

細分之局方風痿同治大謬發揮其詳子和用三法如的係邪氣卒中瘳盛實熱者可用否則不可

大方

肥人中風口喎手足麻木左右俱作瘳治

貝母 瓜蒌 南星 荊芥 防風 羌活 黃柏 黃芩 黃連 白朮

陳皮 半夏 薄桂 甘草 歲靈仙 天花粉 多食淫麵加附子竹瀝姜汁酒三匙行酒

一婦手足左癱口不能言健啖

防風 荊芥 羌活 南星 沒藥 乳香 木通 茯苓 厚朴 桔梗

麻黃 甘草 全蝎

右為末湯酒下不効時春脉伏漸以淡鹽湯釐汁每早一碗吐五日仍以白朮陳皮茯苓甘草厚朴薑瀉日服二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂萊豆粉釐汁益湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木通粘子蒼朮姜南星牛膝茯苓為末酒糊丸十日後夜間微汗手足動而能言

一人癱左

酒連 酒芩 酒柏 防風 羌活 川芎 當歸 南星 蒼朮 人參

麻黃 甘草 三錢 附子 三片

右丸如彈子酒化下

一人體肥中風先吐後以藥

蒼朮 南星 酒芩 酒柏 木通 茯苓 牛膝 紅花 升麻 厚朴

甘草

附諸賢論

涉洄集曰人有卒暴僵臥或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治

之余嘗考諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方又曰風者善行而數變又曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風或為偏枯或為風其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺解之者曰偏枯者半身不遂風痺者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痺者痺類風狀金匱要畧中風篇曰寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即克不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等症固為因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代劉河間李東垣朱彥修三子者出所論始與昔人異矣河間曰中風癰瘰者非謂肝木之風實甚亦卒中之亦非外中於風由乎將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛或間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣溫而地多溼有風病者非風也皆溼土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎溼反以風為虛象而大異於昔人矣吁昔人也三子也果孰是歟果孰非歟以三子為是昔人為非則三子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人為是三子為非則三子已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因於風者真中風也因於火因於氣因於溼者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因溼而為暴病暴死之症與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉未嘗必因於風而後能也夫風火氣溼之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火

氣溼則從三子以治如此庶乎析理明而用法當矣惟其以因火因氣因溼之症強引風而合論之所以真偽不分而名實相紊若以因火因氣因溼症分出之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

附脈理

脈訣舉要曰中風脈浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危溼痰風未可疎

附諸方

通關散 治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛

洗去土葉

猪牙皂角

去子各一錢

右為末每用少許搐入鼻內候噴涕服藥 一方加半夏 一錢

不臥散

治中風卒倒不知人事用此搐鼻即甦

川芎

一兩半

石膏

七錢半

藜蘆

半兩

生甘草

二錢半

右為細末口擒水搐之

通頂散

治中風中氣昏憤不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆

生甘草

川芎

細辛

人參

各一錢

石膏

五錢

右為末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有嚏者可治無嚏者不可治

搐鼻通天散

治卒中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎

細辛

藜蘆

白芷

防風

薄荷

各一錢

猪牙皂角

刮去皮三箇

右為細末用蘆筒細藥每用少許吹入鼻中

破棺散

經驗方

治中風牙關已緊無門下藥

天南星末

半錢

龍腦

少許



右五月五日午時合每用半錢頻擦令熱牙自開

奪命散 楊氏家藏方

治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風症並皆

治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏 湯泡去滑 巴豆 去殼不去油各等分

右為細末每服半錢用生薑自然汁一呷調下牙關緊湯劑不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

解毒雄黃丸 和劑方

治中風卒然倒臥牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金 半錢 巴豆 去皮油 雄黃 研飛二錢半

右為末醋煮麵糊丸如菜豆大每服七丸用熱茶送下吐出頑痰立甦未吐再服如牙關急緊乾開灌下

稀涎散 治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮搐搦氣閉不通

光明晉礬 一兩 猪牙皂角 四箇肥實不蛀者去黑皮

右為末每服五分溫水調下風涎自出又云每服一錢至二錢不妨須要研勻調服吐出痰涎便醒

獨聖散

二聖散

三聖散

四靈散 以上四方並治痰涎壅盛口眼喎斜不能言者用此吐出痰涎稍醒方可進藥其四靈散又吐虛痰

之劑也 方見吐法

以上諸方開闔竅之劑

麻黃膏 宣明方 治中風不省人事卒然倒地

右須王相日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五七者可先煮五沸掠去滓逐漸添水盡至三五斗已來漉去麻黃淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取清者鐺內

再熬至一斗再濾再澄取汁再熬至升半已來為度只是勤攪勿令著底恐焦了熬時忌雞犬陰人澄時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水解熬再勻 凡中風卒倒用此膏加入湯藥內服或用此膏丸藥

小續命湯

按粹方

經云陽之氣以天地之疾風名之此中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰

之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此法當和藏府通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治法輕重有三治各不同中血脈外有六經之形證則從小續命加減中府內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦朮湯羌活湯美活湯主之中藏痰涎昏冒直至寶丹之類鎮墜若中血脈中府之病初不宜用龍射牛黃益射香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麵莫之能出又不可一概用大戟芫花甘遂瀉大腸大便損其陰血真氣愈虛和劑方云此藥治邪在血脈最妙

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏仁

去皮尖

麩炒

防己

肉桂

各一兩

防風

去蘆

附子

炮去皮

臍半兩

右咬咀每服一兩生薑三片水二盞煎至一盞去滓通口服如治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以續命湯加減隨證治之

麻黃續命湯

按粹方

治中風無汗惡寒

麻黃

防風

杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血崑崙舉踰

桂枝續命湯

按粹方

治中風有汗惡風

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯

按粹方

治中風身熱無汗不惡寒

石膏

知母

一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

葛根續命湯

按粹方

治中風身熱有汗不惡風

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

附子續命湯

按粹方

治中風無汗身涼

附子

加一倍

乾姜

加二兩

甘草

加二兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯

按粹方

治中風有汗無熱

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜針大谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯

按粹方

無此四證六經混淆繫於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命

八兩

羌活

四兩

連翹

六兩

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之

經絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸同象治法之大體也服法並如前

三化湯

按粹方

治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨症治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴

姜製

大黃

枳實

羌活

等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中

道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之



通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

潤腸丸 治證同前老人宜服

麻子仁

另研

大黃 酒煨各一兩半

桃仁泥

當歸尾

枳實 麩炒

白芍藥

升麻 各半兩

人參

生甘草

陳皮 各三錢

木香

檳榔 各二錢

右除麻仁桃仁外為末却入二仁泥蜜丸梧子大每服七八十九溫水食前下

大秦羌湯 按秘方

治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌

強不能言宜養血而筋自榮

秦艽

石膏 各三兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風 去蘆

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黃

熟地黃

白茯苓 各二兩

細辛 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨加生薑三大片如心下痞加枳實一錢煎

羌活愈風湯 按秘方

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風溼內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥

而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草 炙

防風 去蘆

黃芪 去蘆

人參 去蘆

蔓荊子

川芎

細辛 去蘆

枳殼 去穢

麩炒

地骨皮

麻黃 去根

知母 去皮

獨活

白芷

杜仲 炒斷

秦艽 去蘆

柴胡 去苗

麩炒

半夏 湯洗

厚朴 美製

防己

熟地黃

前胡 各二兩

芍藥 去皮

黃芩 去腐

白茯苓

各三兩

石膏

生地黃

蒼朮 各四兩

桂 一兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再服 常服之藥不

可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人參各二兩望夏穀雨之後加石膏黃芩知母各二兩季夏

之月加防己白朮茯苓各二兩望秋大暑之後加厚朴藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各

一兩當歸二兩

祛風至寶丹 拔粹方 治風中臟痰涎昏冒及治諸風熱

防風 芍藥 各一兩 石膏 黃芩 桔梗 熟地黃 天麻 人參

羌活 獨活 各一兩 川芎 當歸 各二兩 滑石 三兩 甘草 二兩 白朮 一兩 三錢 連翹 細辛

荊芥穗 薄荷 麻黃 去根不 去節 芒硝 黃連 大黃 黃柏

全蝎 各五錢 梔子 六錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨卧溫服

排風湯 和劑方 治中風邪氣入於五藏令人狂言妄語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮 一兩 當歸 去蘆二兩 肉桂 去粗皮 芍藥 杏仁 去皮共 白朮 二兩 麻黃 三兩 甘草

防風 去蘆各二兩 芎藭 二兩 獨活 茯苓 去皮各三兩

右咬咀每服五錢水一盞姜四片同煎溫服不拘時 廣按此方已上治風中血脈中府中藏之劑也

防風天麻散 宣明方 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘡難語內外風熱壅滯解頭目昏眩

天麻 防風 草烏頭 甘草 川芎 羌活 當歸尾 香白芷

附子 荊芥穗 各半 滑石 二兩

右為末熟酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或

半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣氣道如甚者更加防風通聖散

廣按此方以下開鬱行氣散風泛治之劑也

疎風湯 拔粹方 治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃 去節二兩 益智仁 杏仁 炒去皮 各一兩 甘草 炙

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服脚登熱水葫蘆以大汗出去葫蘆冬月不去

御風丹 聖惠方 治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

足本丹 漢心法附餘 卷一 中風 五 范江海左書局印行

川芎

白芍藥

桔梗

細辛

白殭蠶

川羌活

天南星

姜製各半兩

麻黃

去根節

防風

去蘆

白芷

各一兩半

乾生薑

甘草

炒各七錢半

硃砂

為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化下食前日三服神昏有涎者加硃砂二錢半

續命者散

大全良方

治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼闢動或時搖擗亡失津液渴欲飲水此藥能扶

榮衛去虛風中虛自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黃

遠志

去心

荊芥

各五錢

官桂

七錢半

半夏

五錢

汗多不止加牡蠣粉

右吹咀每服一兩生薑三片水二盞煎至一盞去滓通口服

獨活湯

大全良方

治虛風昏憤不自知覺手足癱瘓坐卧不甯或發寒熱若血虛不能服發汗藥及中風自

汗尤宜服之

川獨活

羌活

人參

去蘆

防風

當歸

細辛

茯神

去木

半夏

桂心

白微

遠志

菖蒲

去毛

川芎

各五錢

甘草

五錢

右吹咀每服一兩水二盞生薑五片煎至八分去渣食後溫服

防風湯

本事方

治中風內虛語言蹇澀

石斛

一兩半酒炒

乾地黃

杜仲

去皮切

丹參

各一兩三錢五分

防風

去蘆

川芎

麥門冬

去心

桂心

川獨活

各一兩

右吹咀每服八錢棗子二枚水二盞煎至八分去渣溫服不拘時

大防風湯

和劑方

去風順氣活血壯筋又治痢後腳痛緩弱不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯腊名

曰鶴膝風

熟地黃

酒洗

白朮

二兩

羌活

去蘆

人參

去蘆

川芎

酒洗

防風

去蘆

附子

炮去皮

臍

牛膝去蘆酒浸一兩甘草炙一兩川當歸酒浸二兩黃芪去蘆炙二兩白芍藥二兩杜仲去粗皮炒令

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至八分食後溫服

芎歸飲 治中風後人事虛弱

芎藭當歸去蘆酒浸防風去蘆各等分

右咬咀每服五錢水一盞煎至半盞不拘時服

以上諸方散風之劑

蘇合香丸 療傳尸骨蒸殭瘳肺痿症忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘡痞赤白暴痢癰血月閉瘧癰丁

腫驚癇及小兒吐乳大人狐狸等病 小兒用大緋絹袋盛當心帶之一切鬼邪不敢近 凡人瘴氣及中

風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州白丸子同丸生薑自然汁化下立効 產婦中風小兒驚風牙關

緊硬不開及不省者擦牙即開然後用風藥治之 小兒吐瀉驚疳先用火焙此藥然後用生薑葱白自然

汁化開白湯調灌 腳氣衝心用草麻子去殼搥碎和丸數貼腳心疼痛立止 心腹絞痛中滿嘔吐姜湯

化下 大人小兒傷風咳嗽姜葱汁白湯調下 中風狂亂如見鬼神者白湯調服

白朮 青木香 硃砂研水飛烏犀角 沉香 麝香研訶梨勒煨去丁香

安息香另為末用無反酒一升熬膏華撥 白檀香 香附子各二兩龍腦研薰陸香另研

蘇合香油內各一兩

右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大取井花水溫冷任意下四九老人小兒服

一九溫酒化服

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻手足癱瘓言語蹇澁者宜先服此藥疎

通氣道然後進以風藥氣升上為逆降下為順順氣者正所謂降氣也

麻黃去根節陳皮去白烏藥各二兩礬石去嘴炒川芎

枳殼去穰麩炒甘草

白芷

足本丹溪心法附餘二 卷一 中風 六 一 泥江海左書局印行

桔梗 各一兩 乾姜 炮半兩

八味順氣散 凡中風之人先服此藥順氣後進風藥

白朮 白茯苓 青皮 陳皮 白芷 烏藥 人參 甘草 各一分

每服六錢水一盞煎半盞溫服仍以酒化蘇合香丸間服妙

人參順氣散 和劉方 治感風頭疼鼻塞身重及一應中風宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥

乾姜 人參 各一兩 川芎 去蘆 甘草 炙 桔梗 去旁枝 厚朴 去皮姜製 白朮 去梗 陳皮 去白

白芷 麻黃 去節 各葛根 三兩半

右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚薄荷五葉煎至七分溫服

勻氣散 瑞竹方 治腰腿疼痛手足攣拳及治中風不語口眼喎斜半身不遂等證前代曾服有效

白朮 二兩 煨 天台烏藥 兩 天麻 半兩 沉香 青皮 去穢 白芷 人參 去蘆 甘草

紫蘇 木瓜 各二錢半

右吹咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

廣按中風中氣之證乃痰火鬱滯便用散風瀉火豁痰之劑卒不能開宜先用此等開鬱行氣之藥治之

鬱開氣行其病自已

以上諸方順氣之劑 中風先宜服 此兼治中氣

川芎石膏湯 宣明方 治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神爽志

宣通氣血治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎 芍藥 當歸 山梔子 黃芩 大黃 菊花 荊芥穗

白朮 以上各 滑石 四兩 寒水石 二兩 甘草 三兩 桔梗 二兩 砂仁 二錢半 石膏 一兩 防風

連翹 薄荷葉 各一兩



右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水調亦得忌姜醋發熱物

防風通聖散

宣明方

論曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂大熱陽之本也謂曲直動搖風之用

也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱怫鬱風火生於熱以熱為本而風為標凡言風者即風熱病也氣壅滯

筋脈拘攣肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽喘滿涕唾稠粘腸

胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃怫鬱結水液不能浸潤於周身而便為小便

多出者或溼熱內餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停

溼而泄或燥溼往來而時結時泄者或表之陽和正氣衛氣是也與邪熱相合併入於裏陽極似陰而戰煩渴者

表氣寒故戰裏氣甚則渴或虛氣又不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并出之於表則發熱大則病作離則病已或風熱走注疼痛麻痺者或腎水

真陰衰虛心大邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘡而不語語不出聲或暗風癰者或洗頭風或

破傷風或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘不能辨者或熱甚拂結而反出不快者或

熱極黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢

疹俗呼為肺風者或成風癘世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒

未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿澀痛

煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛

而昏者惡物過多而不吐者不宜服之兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因熾結大小便澀滯不通或腹

急痛腹滿喘悶者並皆治之

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝

將硝製過者是以上各半兩

石膏

黃芩

桔梗

各一兩滑石

甘草

三兩

荆芥

白朮

梔子

各二錢半

右為末每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽加半夏半兩姜製此藥不可無生薑同煎劉
足本丹溪心法附餘 卷一 中風 七 泥江海左書局印行

廷瑞方有縮砂無芒硝其餘皆同

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩燥之故也

當歸

川芎

施子

羌活

大黃

防風

龍胆草 各等分

右為末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

廣按此劑乃瀉肝火之藥蓋肝主風風動則木搖故以此藥主之又予嘗見中風之症多是老年因怒而成蓋老年腎水真陰衰虛火寡於畏適因怒動肝火火無所制得以上升心火得助邪熱暴甚所以僵仆不知人事也大載痰上所以舌強不語口眼喎斜痰涎壅盛也治法先吐痰火以治其標次則豁痰瀉火以治其本豁痰用星附湯省風湯瀉火用防風通聖散瀉青丸之類是也 左癱右瘓者因氣血虛而痰火流注也血虛則痰火流注於左而為左癱氣虛則痰火流注於右而為右瘓治法左癱宜補血藥兼散痰火藥右瘓宜補氣藥兼散痰火藥急治則可久則痰火鬱結難治也

愈風丹 治風痰常宜服此調理

防風

連翹

麻黃

黃柏

黃連 各半兩

川芎

當歸

赤芍藥

薄荷葉

石膏

桔梗

何首烏 各一兩

熟地黃

羌活

細辛

甘菊花

天麻 各一兩

黃芩 一兩半

白朮

荊芥 各二錢

梔子 七錢半

滑石 五兩

甘草 二兩

僵蚕 半兩

熱甚加大黃朴硝 各一兩 硃砂金箔為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒化下

龍星丹 治諸風熱痰涎壅盛

牛胆南星

硃砂 另研為衣 各三錢

片腦 另研三

牛黃 另研三

麝香 另研三

全蝎

防風

薄荷 各一錢

黃芩

黃連 各二錢

加青黛 另研一錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸噙化

廣按此方既治風熱又兼理痰之劑夫中風之證多是溼土生痰痰生熱熱生風也若是瀉熱散風而不豁痰則病何由而止哉此方但是風熱兼痰為病無不治也

清涼丹 治風熱癰實上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉瞤動而若虫行及治傷寒熱盛狂言昏冒剛瘕及一切風熱並皆治之

片腦

另研半兩

牛黃

另研三兩

蝎梢

去毒炒

石膏

各一兩

白花蛇

酒浸取肉

犀角屑

防風

甘草

炙

珍珠末

硃砂

大黃

各一兩

南星

半兩四兩兩製者

雄黃

去根節

白附子

炮

雄黃

龍腦

各半兩

琥珀

三錢

千金保命丹

徐同知方

治諸風癱瘓不能語言心忪健忘恍惚去來頭目昏眩胸中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心

精神昏憤又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒不時或發狂顛精神昏亂及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫

珍珠

二錢

南星

一兩

麻黃

去根節

白附子

炮

雄黃

龍腦

各半兩

琥珀

犀角

鎔

麥門冬

去心

枳殼

地骨皮

神糲

茯神

遠志

去心

人參

柴胡

各一兩

金箔

一百片

牛黃

牙硝

四錢

毫車

天竺黃

防風

甘草

桔梗

白朮

升麻

各一兩

蟬蛻

半兩

黃芩

二兩

荆芥

二兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下不拘時候忌猪羊鰕核桃動風引痰之物及猪羊血更加大川烏抱去皮臍姜製半夏白芷川芎各一兩猪牙皂角一兩和前藥丸服尤妙

真珠丸

本事方

治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守舍狀若驚悸

真珠母

三錢

當歸

熟地黃

各一兩

人參

酸棗仁

柏子仁

各一兩

犀角

茯神

沉香

各五錢

足本丹溪心法附餘

卷一

中風

八

卷一

中風

八

卷一

中風

八

卷一

中風

八

卷一

中風

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十九金錢薄荷湯食後吞下日三服

活命金丹 治中風神不清

涼膈散加青黛藍根

右為細末煉蜜為丸如彈子大硃砂為衣金箔蓋每服一丸清茶化開食後臨臥服

涼膈散見傷寒類

稀簽丸

濟生方

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手足緩弱

稀簽草

一名大熱草生於沃土間帶猪苓氣者是

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸九曝每蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久曝乾為末

煉蜜丸如梧桐子大每服百丸空心溫酒米飲任下

清陽湯

批粹方

治中風口喎頰顙緊急胃中大盛頭汗不止小便頻數

升麻

黃芪

當歸身

各二錢半

紅花

一分

蘇木

五分

炙甘草

一錢

酒黃柏

一分

生甘草

五分

桂枝

一分

右咬咀作一服酒三盞煎至一盞三分去渣溫服

雞舌散

聖惠方

專治中風舌本強硬語言不正

蝎梢

去毒二錢半

茯神

去木一兩

薄荷

焙一兩

一方無茯神

有茯苓

右為末每服一二錢溫酒調下或以擦牙頰間亦好

轉舌膏

治中風瘰癧舌塞不語

涼膈散加石菖蒲遠志

右為末煉蜜為丸如彈子大硃砂為衣每服一丸薄荷湯化開食後或臨臥服

涼膈散見傷寒類

柯子湯

治諸風失音不語

柯子

四個半

桔梗

生半兩

甘草

一寸半

生半兩

生半兩