

祛寒
清暑
利濕
潤燥

方合編
四

正和堂

正和堂

針灸
方合編

蓮子 甘溫而瀉脾之藥也脾者黃宮故醫方集解卷之四

能交水火而靖心腎安靖上下君相火

邪古方治心腎不交勞傷白濁有牙蓮子清心飲補心腎有瑞蓮丸益十

二經脉血氣瀉精氣厚腸胃除寒熱治

脾泄久痢白濁夢遺女人崩帶及諸血

病大便燥者勿服去心皮蒸熟焙乾

用得茯苓山藥白朮枸杞良黑而沉水

者爲石蓮清心除煩開胃進食治噤

口痢淋濁諸症石蓮入水則沉入鹵則

浮煎鹽人以之試鹵蓮王頂鹵乃可煎落田野中者百年不
得食之髮黑不老肆中石蓮產廣

醫方集解卷之四

祛寒之劑

寒中于表宜汗寒中于裏宜溫蓋人之一

其所則折壽而不彰寒者陰慘肅殺之氣也陰盛則

陽衰迨至陽竭陰絕則死矣仲景著書先從傷寒以

立論誠欲以寒病爲綱而明其例也其在三陽者則

用桂麻柴葛之辛溫以散之其在三陰者非假薑附

桂煎之辛熱參朮甘草之甘溫則無以祛其陰冷之

邪冷而復其若天與日之元陽也諸傷寒濕者皆視

此爲

治矣

理中湯仲景

治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹痛糞

溇脉沉無力或厥冷拘急或結胸吐蚘及感寒霍亂木

脾經也腹滿而吐食不下自利腹痛爲太陰病自利渴

者爲熱不渴者爲寒喜嘔腹痛便溇皆虛寒所致寒欲

于外則手足厥冷拘急寒凝于中則結胸泄瀉吐蚘霍

亂者陰陽不和而揮霍撩亂或吐或瀉亦有寒熱二症

上其味大
宜入藥
蓮心爲末米飲下療產

血渴

蓮莖鬚 甘溫而瀉清心通腎益血固精

烏鬚黑髮止夢洩遺精吐崩諸血略與

蓮子同功

藕節 瀉平解熱毒消瘀血止吐衄淋痢

一切血症和生地汁童便服良藕生甘寒涼血散

瘀宋大官作血蝕誤落藕皮血遂渙散不凝一人病血淋痛脹欲死李時珍

以髮灰二錢藕汁調服三日而愈止渴

除煩聖惠方藕汁蜜和解酒毒解毒

若陰寒所致者宜此湯。○三陽傳陰經而下利者爲協熱利。陰寒直中陰經而下利者爲寒利。外邪傳裏而腹痛者其痛不常。陰寒在內而腹痛者痛無休止。時欲作利。大腹屬太陰。少腹屬少陰。臍下屬厥陰。亦有挾食積與痰火者。三陽下利身熱。太陰下利手足溫。少陰厥陰下利身冷。其大較也。下利雖有表症不可發汗。以下利爲邪氣內攻走津液而胃虛也。

白朮陳壁土炒二兩人參 乾薑炮 甘草炙一兩 每服四錢自

利腹痛者加木香。不痛利多者倍白朮。渴者倍白朮。

益氣燥濕。跌臥沉重。利不止加附子。此兼少陰症。腹滿去甘

草甘令嘔吐去白朮加半夏薑汁。白米甘壅薑夏散逆臍下動氣

去朮加桂。白朮補氣桂泄奔豚悸加茯苓。飲停則悸茯苓利水寧心陰黃加茵

陳寒結胸加枳實。本方等分蜜丸。名理中丸。仲景曰大病瘥後喜

熱酒煮熟甘溫益胃補心多乳止瀉能實

大腸止怒久服令人懽益心生搗覆金瘡

傷折熟搗塗折裂凍瘡肘後方卒中毒

多益善孟詵曰產後忌生冷澄粉亦佳獨藕不忌為能散瘀血也

安神益胃

荷葉苦平其色青其形仰其中空其象

震震仰感少陽甲膽之氣燒飯合藥

助脾胃而升發陽氣潔古枳朮丸用痘

倒壓著用此發之痘垂等分為末胡

腦能散瘀血留好血治吐衄崩淋

唾久不了了胃中有寒宜理中丸溫之

此足太陰藥也人參補氣益脾故以為君白朮健脾燥

濕故以為臣甘草和中補土故以為佐乾薑溫胃散寒

故以為使以脾土居中故曰理中王海藏曰上吐下瀉

脈微細而弱者理中湯主之經又曰傷寒下之利不止

醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤

石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便○宋徽

宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊介進大理中丸上

曰服之屢奏介曰疾因食冰臣請以水煎此湯是治受病之源也果愈

本方三兩加附子一枚名附子理中湯亦可作丸即四

治中寒腹痛身痛四肢拘急漸傷曰傷卒中曰中有中

之殊治之當分微甚微則不換金正氣散加附子附子

五積散甚者臍腹痛四肢厥附子理中湯薑附湯入肝

產癰熬香末服一切血症洗腎囊風東垣

雷頭風症頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過處清震湯治之荷葉一枚升麻蒼朮各五錢煎服鄭奠一曰荷葉研末酒服三錢治遺精極驗

芡實一名雞頭子

甘瀉固腎益精補脾去濕

治泄瀉帶濁小便不禁夢遺滑精同金櫻膏

為丸名水腰膝痠痛吳子野曰人之食

陸二仙丹使華液流通轉相灌漑其功勝于乳

石也經驗後方煮熟研膏合粳米煮粥食益精氣蒸熟搗粉用瀉精藥或連殼用

李惟熙云菱寒而芡暖菱花背日芡花向日

加木瓜入肺加桑白皮入脾加木入心加茯苓本方加枳實茯苓蜜丸名枳實

理中丸崔行功治寒實結胸欲絕胸膈高起手不可近用

大陷胸不瘥者崔曰此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相搏結于胸者用此丸先理

其氣次療諸疾用之如神渴者加花粉自汗者加牡蠣本方去甘草加茯苓川椒

烏梅名理中安蛔丸陶仲文治胃寒吐蛔得甘則動故

靜得辛則伏故加椒梅本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不

解者欲解表裏之邪全藉中氣為敷布故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝者到底

先表之意也大抵陽熱為邪則腹滿而咽乾陰寒為邪則腹滿而吐利本方加黃連茯苓

名連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷生冷者非此不可本方加

甘肱 甘寒和中助脾除熱潤燥止渴消

渴 消痰解酒毒利二便外臺方嘔嘔或搗汁治發熱口

乾便 治嘔噦反胃梅師方蔗汁薑汁和服 大便燥

結 蔗汁熬之名石蜜即白霜糖唐犬曆間有鄒和尚始傳造法性味甘溫補

脾緩肝潤肺和中消痰治嗽多食助熱損齒生蟲紫砂糖功用畧同

等臍 一名烏芽 一名地桑 甘微寒滑益氣安中開

胃消食飯後宜食之 除胸中實熱治五種噎

膈憂膈患膈氣膈熱膈寒膈噎亦五種氣噎食噎勞噎憂噎思噎 消渴

黃疸血症未服能毀銅汪機曰合辟蠱能毀銅銅錢食之

化可見為消堅削積之物開五膈消宿食治誤吞銅也

菓 艾實 甘蔗 等臍

陳皮茯苓名補中湯治泄瀉瀉不已者加附子惡食食

不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川椒入薑煎

名溫胃湯治憂思鬱結脾肺氣凝脹滿上衝飲食不下

本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯海藏亦出理中例法 本方

加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再如乾薑一兩即通脉四逆湯 治三陰傷寒四逆湯為

少陰主藥然三陰通用之身痛腹痛下利清穀惡寒不

太陽症脉沉亦有用此者身痛腹痛下利清穀惡寒不

渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩燥裏寒外熱或乾嘔

或咽痛脉沉微細欲絕腹痛自利裏寒也三陰自和居多身凉脉靜者順身熱脉大者逆內寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脉凝滯陽氣不能敷布故一身盡痛而手足厥冷也反不惡寒

醫方集解 卷四 四逆湯

音枝
甘寒安中消暑止渴解

有兩角三角四角老嫩之殊武陵記以

三角四角者為菱兩角者為菱
菱花隨月而轉猶葵花之向日

西瓜 甘寒解暑除煩利便醒酒名天生

白虎湯西瓜甜瓜皆屬生冷多食傷脾助濕衛生歌云瓜桃生冷宜少

食免致秋來成瘧痢瓜性寒曝之尤寒
稽含賦云瓜曝則寒油煎則冷物性之

也異

穀菜部

粳米粳硬也糯糯也 甘涼得天地中和之氣和

胃補中色白入肺除煩清熱煮汁止渴

面赤發躁者陰盛格陽于外也寒留胸中故食入即吐
脉有寒飲故逆而乾嘔虛火上炎故咽痛脉沉者寒則
伏藏也按少陰脉有沉有緊有數而仲景統以微細言
之蓋沉必重按始得緊數亦在沉細中見不似陽症浮
大而緊數也薛慎齋曰人知數為熱不知沉細中見數
為寒甚真陰寒症脉當有七八至者但按之無力而數
耳宜深察之

附子一枚生用 乾薑兩 甘草炙二兩 冷服面赤者格陽於上

也加葱九莖以通陽喻嘉言曰陽虛之人雖有表症其汗仍出其手足必厥纔用表藥立

至亡陽不用表藥外邪不服故用前湯加葱為治 腹痛者真陰不足也加芍藥

二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利

止脉不出加人參三兩以助陽補氣血嘔吐加生薑三

兩以散逆氣以上皆通脉四逆湯加減法也

仲景白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯。並用之。以清熱補不足。張文潛粥記。粥能暢胃氣生津液。每晨空腹食之。所補不細。昂按。今人終日食粥。不知其妙。迨病中食之。覺與藏府相宜。迨非他物之所能及也。

粳乃稻之總

名。有早中晚三收。晚者得金氣多。性涼

尤能清熱。

北粳涼。南粳溫。白粳涼。紅粳溫。新米食之動氣。

陳

廩米冲淡。可以養胃。煮汁煎藥。亦取其

調腸胃。利小便。去濕熱。除煩渴之功。集

云。陳米飯緊作團。火煨存性。麻油

未之。調傳一切惡瘡。百藥不效者。

能。草名稻米。按詩黍稷稻粱禾麻

豈。八穀。此稻與禾所以異乎。

補脾。肺虛寒。堅大便。縮小便。收自

此足少陰藥也。寒淫于內。治以甘熱。故以薑附大熱之

劑。仲發陽氣。表散寒邪。

附子生用。亦能發表。

甘草亦補中散寒之

品。又以緩薑附之上僭也。

甘草為君。乾薑為臣。附子為佐。

必冷服者。寒

盛於中。熱飲則格拒不納。經所謂熱因寒用。又曰治寒

以熱涼而行之是也。

此奇制之大劑也。肝腎位遠。非大劑不能達。仲景云。傷寒醫下之續

得下利。清穀腹滿身痛者。急當救裏。宜四逆湯。清便自

調身痛者。急當救表。宜桂枝湯。蓋身痛尚屬表。症急則

先救裏。而後解表也。厥陰篇曰。人汗出。熱不去。內拘急

四肢痛。又下利。厥逆而惡寒者。四逆湯主之。按厥逆症

四肢厥冷。指甲青。脉沉遲。按之有力者。為陽厥。當下之

宜大承氣湯。如脉沉遲。按之無力者。則為陰厥。宜四逆

湯。更須速灸之。凡傳經熱邪。則為陽厥。溺赤而四肢熱

直中真寒。謂之陰厥。陰縮而四肢冷。程郊倩曰。世言傳

經為熱厥。直中為寒厥。斯言甚謬。三陽之厥。多傳于失

下。此為熱厥。少陰之厥。悉屬于寒厥。陰之熱厥。仲景書

龍骨。牡蠣。為粉。能撲汗。發痘瘡。解毒。然性粘滯。

及小兒忌之。糯米釀酒。則熱。熬餛。尤甚。餛即飴糖。潤肺。

其性化痰止咳。仲景建中湯用之。取其甘以補脾。緩中。多食發濕熱。動痰火。損齒。

甘溫開胃快脾下氣和中消食化

積炒用。

大麥芽。鹹溫。能助胃氣上行而資健運。

補脾寬腸和中下氣消食除脹散結祛

痰。鹹能化一切米麵菓食積通乳下胎。

外臺方。麥芽一升。蜜一升。服下胎神驗。薛立齋治一婦人。夜子乳脹。幾欲成癰。

僅有傷寒一二日。至四五日。而厥者。必發熱一條。果如傳邪之說。則在四五日。固得矣。論中何云。一二日不知何經之邪。而神速若此。其曰厥應下之者。下其熱。非下其厥也。遇發熱。則可下。遇厥。則萬不可下矣。推原其故。厥陰與少陽。一府一藏。少陽在三陽為盡。陽盡則陰生。故有寒熱之往來。厥陰在三陰為盡。陰盡則陽接。故有寒熱之勝復。凡遇此症。不必論其來自三陽。起自厥陰。只論熱與厥之多少。熱多厥少。知為陽厥。厥多熱少。知為陰厥。熱在後而不退。則陽過勝而陰不能復。遂有喉痺便血等症。厥在後而不退。則陰過勝而陽不能復。遂有除中亡陽等症。仲景所以調停二治法。須合陰陽進退之機。陽勝宜下。小承氣湯中。已去芒硝之寒。而有厚朴之溫。在厥陰中。破陽以行陰。陰勝宜溫。縱有陽邪。一見厥利。便宜烏梅丸。聚辛熱之品。而加苦寒之佐。在厥陰中。破陰以行陽。雖有上熱。如篇首消渴氣上衝心之症。亦不慮其為打格也。扶陽抑陰之旨微矣。又曰。烏梅丸。于辛酸入肝。藥中微加苦寒。納逆上之陽邪。而順之使下也。名曰安蛔。實是安胃。故併主下利。見陰陽不相順接。而下利之症。皆可以此方括之也。經曰。凡陰陽不相順接。便為厥。手足逆冷是也。方時行曰。三陰三陽之

單用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣如此良方云神麴亦善下胎皆不可輕用。**久服消腎氣**王好古曰麥芽神麴皮己腐熟水穀李時珍曰無積而服之消人元氣與白朮諸藥消補兼施則無害也。**炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味爲使**

小麥味甘微寒養心除煩利溲止血珍

曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木許慎屬金別錄云養肝與鄭說合思邈云養心與素問合當以素問爲準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地暖下濕能利北產之良仲景治婦人藏燥症悲嘗病六狀若神靈用大棗湯大棗十枚以黃一升甘草一兩每服一兩亦補脾陽止惡方小麥飯治煩熱少睡多渴

是穀 穀芽 大麥芽 小麥

脈俱相接于手足陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順按則手足厥冷也。附喻嘉言論桂附丸曰藏爲陰可勝純陽之藥府爲陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥

本方加白朮大棗名朮附湯金匱治風濕相搏身體煩疼

及止寒發厥心痛本方除甘草名乾薑附子湯仲景治下

後復汗晝躁夜靜不嘔不渴無表症脉沉微無大熱者

微無大熱陰氣獨治內係真寒也凡陰虛之極陽必厥陽虛之極陰必躁薑附直從陰中回陽不當心晝日煩躁而疑之矣。**又治中寒厥逆眩仆**

無汗或自汗淋漓中寒之症身強口禁眩運無汗或自汗者腠理素虛而陽微也傷寒發熱

中寒不發熱以此爲異仲景于傷寒則詳之而中寒未之及何也曰陽動陰靜陰寒既鬱而成熱遂從乎陽傳變不一靡有定方故極惟其病不得不詳也。不熱者除邪一定而不移則不變故不必詳也。**及外熱**

醫方集解 卷四 四逆湯

五

溫補虛養氣助五藏厚腸胃然能

參湯助濕發熱陳者良寒食日紙

不熱入藥尤良久浮小麥即水淘成

涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸汗為心液麥為心穀浮者

無肉故能涼心麥麩同功麥麩醋拌蒸能散血止

痛熨腰脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣互

易至汗出良麥之涼在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍痘瘡潰爛不能

着席者用麥麩裝褥臥性涼而軟誠妙法也

稷甘平益氣和中宜脾利胃陶弘景曰稷米人亦

不識書記多云黍與稷相似又註黍米付子乾薑入腎以解躁

煩躁陰盛格陽陰症薑附湯加當歸肉桂入蜜和服名

薑附歸桂湯喻嘉言曰服薑附湯後繼服此湯因薑附

桂逐營分之邪始得藥病相當也再加人參甘草名薑附歸桂參甘湯

加薑煎喻氏曰服前湯後繼當服此兼綿氣血本方除甘草加葱四莖名

白通湯復陽通脈再加人尿猪膽汁名白通加人尿猪胆汁

湯見後本方加人參一兩名四逆力人參湯景岳

脉微復利利止亡血惡寒脉微復利陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血與四逆溫

經復陽加人參生津益血再加茯苓六兩名茯苓四逆湯仲景治汗下

後病不解而煩躁過汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用

茯苓人參入心以除煩本方除乾薑加芍藥三兩名芍

宜命發宿病。詩云：黍稷稻粱，禾麻苽麥。此八穀也。俗猶不能辨證，此芝英乎。按黍稷，辨者頗多，皆無確義。時珍曰：黍稷一類二種，粘者為黍，不粘者為稷。此謂詩人既云八穀，何必取一類者？強分二種是。仍為七穀矣。蓋稭稷同音，故世妄謂稭為稷，不知稭乃黍類似粟而粒大疎散，乃北方下穀，南方全無，北方亦不之重。安能越處，粳糯而高踞八穀之上也？平陶氏所說，因是稭黍所以疑也。若稷當屬高大如蘆，世之所謂蘆稷者，實既香美，性復中和，幹又高大，所以能為五穀之長。而先王以之名官也。况稭黍所生不徧，而蘆稷薄海蕃滋，本草乃指蘆稷為蜀黍，其名義亦不倫矣。此實從末之誤，敢為正之，以質明者。又蘆稷最能和中，煎湯溫服，治霍亂吐瀉如神。昂嘗病腹中啾啾，經兩月，有友人見招飲，以蘆稷燒酒一醉而積疴。暢然性之中，和又可見矣。

藥甘草附子湯治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也

汗出表不解而惡寒，獨曰反其為過汗，陽弱可知。汗出為營虛，惡寒為衛虛，若重補其陰，則惡寒愈甚。但回其陽，則陰愈却矣。故用附子以回陽，而加芍藥以斂陰。此營衛兩虛之救法。李挺曰：汗後亡陽，惡寒者，表虛也。芍藥附子甘草湯，下後惡寒者，裏虛也。四逆湯，其有表邪未盡者，必兼發熱，故加桂湯。又有裏實熱伏于內，陽微于外，而惡寒使堅者，猶須下之，傷寒百問曰：汗後惡寒，人必虛，不後發熱，人必實是也。本方除附子用甘草四兩，乾薑二兩，名甘草乾薑湯，治傷寒脉

浮自汗，小便數，心煩微惡寒，脚攣急，用桂枝湯誤攻其

表得之，便厥咽中乾，煩躁吐逆，以此湯以復其陽。脉浮

便數惡寒，陽不足也。或表重虛其陽，得湯便厥，胃之津液傷也。故以甘草益氣，乾薑助陽，九慮辛熱有傷其陰

隨與白芍甘草湯益其陰血，復其津液。若厥愈足溫者，故症雖鄰于少陰，而不敢用四逆也。

書方集解卷四 四逆湯 六

粟 甘鹹微寒。養胃。益氣。治胃熱消渴止。

霍亂利小便。千金方。粟米粉。水九。梧子大者七枚。內醋中細香之。

治反胃。止食。即梁米。有青黃赤白黑諸色。

陳者良。

蕎麥麵 甘寒。降氣。寬腸。治腸胃沉積。孟詵

曰能鍊五藏步氣。泄痢帶瀉。便疳瘡潰。昂按亦能解酒積。

爛湯火灼傷脾胃虛寒。人勿服。

黑大豆 甘寒。色黑。屬水。似腎。腎之穀也。

豆有五色。故能補腎。鎮心。腎火足則明。

各入五藏。則腎水足。利水。下氣。單用或加他藥散。

更作芍藥湯以和其陰。其脚即伸。芍藥甘草各四兩。仲景

別見。相解門。本方加吳茱萸。名茱萸四逆湯。治厥陰少陰腹痛。

本方加當歸。木通。名當歸四逆湯。治感寒手足厥冷。脉

細欲絕。及男婦寒疝。臍下冷。引腰膝而痛。寒傷營血。故加當歸木通。

能通血脉。仲景當歸四逆湯見後。本方加茵陳。名茵陳四逆湯。治陰黃。

本方加生肌散。名生肌散。治一切瘡口不斂。

加官桂。良薑。半夏。名漿水散。治虛寒水瀉。冷汗。脉微。

甚者嘔吐。此為急病。漿水者。泄利漿水。澄澈清。今也。又曰加漿水煎之。

當歸四逆湯。付治厥陰傷寒。手足厥冷。脉細欲絕。成氏曰。手

足厥寒者。陽氣外虛。不溫。四末。脉細欲絕。者。皆主內弱。脉行不利。與此湯復陽生陰。

熱祛風炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及姪娠腰痛兼能發表

金云一以去風活血產書云熬令烟絕

一以消血結活血酒淋服下產後餘

解毒蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡

緊小者良小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水煮食補腎

畏五參龍胆猪肉忌厚朴犯之動氣得前胡

杏仁牡蠣石蜜諸胆汁良

赤小豆 甘酸思鮑色赤心之穀也性下

行通小腸利小便心與小腸相表裏行水散血

消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣昔有患脚

當歸 桂枝 芍藥 細辛三兩 甘草炙 通草即木通二兩 大

棗二十枚 仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸二升

薑半斤酒六斤和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

此足厥陰藥也成無已曰脉者血之府也諸血皆属于

心通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助心

血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急

急食甘以緩之大棗甘草通草以緩陰血四逆之名多矣而有因寒

因熱之不同此則因風寒中血脉而逆故以當歸辛

枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒桂枝散太

管衛不和而脉能通者故以芍藥以破阻滯而吸寒

本草精要 穀 栗 蕎麥 黑豆 赤小豆

醫方集解 卷之四 當歸湯

氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之遂愈
同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳

傳一切瘡症雞子白調末搗之性極粘乾則難揭入苧根末則不

粘宋仁宗患疥癩道士贊能取赤小豆

四十九粒呪之雜他藥傳之而愈中貴

任承亮親見後任自患惡瘡傳永投以

藥立愈問之赤小豆也承亮始悟道士

之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷

任曰莫非赤小豆耶醫驚拜曰用此活

三十餘口止渴解酒通乳下胎然滲津

願勿復宣

液久服令人枯瘦十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是

也按二藥未可言燥蓋取其行水之功

然以木通防己為通劑通燥二義似重

故本集改熟藥為燥

劑而以行水為通劑

綠豆甘寒行十二經清熱解毒一切草木金石

解表裏起見當歸四逆全從熱之味恐劫其陰也蓋少陰藏中通脈起見不欲入辛

邪不去厥陰藏中職司藏血不養血則真陽陽不固則

寒之人亦不用乾薑附子止用吳茱之走肝起即遇久

下生薑之辛散者

自內達外是矣

四逆散仲景此和解之寒劑因名四逆附次于此治傷寒少陰症陽邪入裏

四逆不溫或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下

重陽邪傳裏熱結于裏故四肢逆而不溫氣逆挾痰故欬氣虛挾飲故悸裏有結熱故小便不利腹痛下利

各傷寒邪在三陽則手足必熱至太陰則手足溫至少

陰則熱邪漸深四肢逆而不溫至厥陰則手足逆冷經

曰熱深厥亦深熱微厥亦微與此湯以散傳經之熱

柴胡芍藥枳實炒甘草炙等分為末水調飲欬

加五味子乾薑併主下利五味收逆氣乾薑散肺寒肺與大腸相表裏上欬下利治

利

與大腸相表裏上欬下利治

利