

草山 卷十三

本草綱目上

本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下三十九種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡

本經

防風

本經

獨活羌活

本經

土當歸

綱目

都管草

圖經

升麻

本經

苦參

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

水仙

會編

白茅

本經

地筋

州錄 即
菅茅

芋

拾遺

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

本經

木細辛附

及巴

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白微

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

釵子股

海藻

吉利草

綱目

硃砂根

綱目

辟虺雷

拾遺

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二

山草類下三十九種

黃連

本經上品

釋名

王連

本經支連藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解

別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根

弘景曰巫陽在達平今西間

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不准用之當布援去毛今如連珠保昇曰苗似

茶叢生一莖

生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江

左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及

杭州郴州者佳

顧曰今江湖荆夔州郡亦有而以

宣城九節聖重相擊

有聲者爲勝施點者次之東

陽歙州處州者又次之

之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者

根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗潔白微黃色大七月根繁始堪采叢日蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療癆大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者爲良藥物之與廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根脩治

敷日凡使以布拭去肉毛用漿水瀝一伏時瀝出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟

六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經爲治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以茱萸水則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以茱

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

肉止血下行熱疾止盜汗并瘡疥瘧肚蒸爲丸治

小兒疳氣殺蟲

大明

癰瘍氣急

藏器

治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿

元素

心病逆而盛心積

伏梁好古

去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒

珍時

發明

元素曰

黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

陰中陽也

入手少陰經其用有六滻心臟火

一也

去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四

也赤眼暴發五也止中部見面六也

張仲景治九

種心下痞五等瀉心湯皆用之成無巳曰苦入心

寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱或得

此亦可謂之苦寒之藥矣

此亦可謂之苦寒之藥矣

以導心下之虛熱或得

甘則動得苦則安黃連黃蘖之苦以安魄也好古
曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也
實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心
火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之
以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下
痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如
吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以
黃連爲治痢之最葢治痢惟宜辛苦寒藥辛能發
散謂通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已
諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘖性冷而燥能降火去
濕而止瀉痢故治痢以之爲君宗奭曰今人多用
黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄
微似有血便卽用之又不顧寒熱多少雖欲盡劑
由是多致逆膈若氣實初病熱多血痢服之便止
不必盡劑虛而冷者慎勿輕用某曰諸痛痒瘡瘍
皆屬心火兄諸瘡宜以黃連當歸爲君生草黃芩
爲佐凡眼癆發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以
酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或醇水煎湯熱洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神妙蓋眼目之病皆是血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓愈曰火分之病黃連爲主不但瀉心火而與芩藜諸苦藥列稱者比也比目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於墳刻入玉苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣自芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五疳此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及癩爲要藥古方治癩香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治目瘡用黃連細辛皆是——冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴
遠方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連
味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛
蹕上曼不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云
黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驛龍行
天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別
錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久
服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年
得仙竊謂黃連大苦大寒之藥引之降火燥濕
中病卽當止豈可久服使蕭殺之令常行而伐其
生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸
所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由
也王冰註云酸入肝爲溫苦入心爲熱辛入肺爲
清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之皆增
其味而益其氣故各從本臟之氣爲用所以久服
黃連苦寒反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏
勝卽有偏絕則有暴天之道是以絕粒服餌之人

不暴于者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心爲子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而權詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連卮藥四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣當以素問之言爲洪陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊二十二新四十

心經實熱

瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫

服小兒減之

卒熱心痛

黃連八錢咬咀水煎

和劑局方

熱服

外臺秘要

肝火

爲痛

黃連薑汁炒爲末糊丸梧子大每服三十粒

白湯下○左金丸用黃連六兩米葛一兩

同炒爲末神麌糊丸梧子大每服三十粒

白湯下○丹溪方

伏暑發熱作渴嘔逆及赤

服三十九丸白湯下○丹溪方

白癥消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

主之用黃連一斤剉以好酒二升半煮乾研糊

丸梧子大每服五十丸熟水下日三服和劑局方

陽毒發狂奔走不定宣

等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下○易簡方

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分則腹童子

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方

或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一箇洗淨

宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定數處五升梗米上蒸爛石臼搗千杵或入少敵同杵丸綠豆

大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥餒之

蓋小兒之病不出于瘡則出于熱瘡須識此

重指方

三消骨蒸黃連末以

本草綱目卷第
卷之三
黃連薑汁炒爲末糊丸梧子大每服三十粒
白湯下○左金丸用黃連六兩米葛一兩
同炒爲末神麌糊丸梧子大每服三十粒
白湯下○丹溪方

伏暑發熱作渴嘔逆及赤
服三十九丸白湯下○丹溪方

白癥消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸
主之用黃連一斤剉以好酒二升半煮乾研糊
丸梧子大每服五十丸熟水下日三服和劑局方

陽毒發狂奔走不定宣
等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下○易簡方

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分則腹童子
小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方

或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一箇洗淨
宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定數處五升梗米上蒸爛石臼搗千杵或入少敵同杵丸綠豆
大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥餒之

蓋小兒之病不出于瘡則出于熱瘡須識此

重指方

三消骨蒸黃連末以

汁浸一夜晒乾又浸如此七次爲末以冬瓜糞和丸梧子大每服三四十九大麥湯下尋常渴只一

服見効。

易簡方

消渴尿多

肘後方用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下。寶

鑑用黃連半斤酒

升浸重湯內煮一伏時取晒

爲末水

丸梧子大每服五十丸溫水下。

崔氏治

消渴小便滑數如油

黃連五兩桔梗根五兩爲末

生地黃

丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌

冷水猪肉

總錄用黃連末入猪

濕熱水病

未蜜

肚肉蒸爛搗

丸梧子大飯飲下

黃連五錢

丸梧子大每服二丸至四五

丸飲下日三四服

范汪方

破傷風病

酒一盞煎

七分入黃蠟三錢溶化熱服

小便白瀉

因心腎氣不足思想

之高文虎蓼花洲閣錄

分爲末酒糊丸梧子大

無窮所致黃連白朮等

每服三十丸煎補膏脂湯下日三服

普濟方

梧子大

兩木二升煮取半升露一

審

熱毒血痢

宣黃連

空腹熱服

臥時息一二日即止

于

下痢腹痛

赤白痢下令人下部疼重微名重下日夜數十行臍腹絞痛以黃連一升酒五

升煮取一升半分再服

當止絞痛也

附後方

治痢香連丸

李絳兵部手集治赤白諸

痢裏急後重腹痛

用宣黃連青木香等分搗篩白

蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下服再服其

効如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰兒
皆効○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麵煨一

兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟調子肉○又治小兒瀉痢加煨熟陳皮薑

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖

朱丹溪治禁口痢加石蓮肉

治久痢加龍骨○王氏治痢渴加烏梅

肉以阿膠化和爲丸

四分一分用酒浸炒一分用自然薑汁炒一分用

吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同研去益智研末

白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩麝米香
二兩爲末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸米飯食

前下日三服忌豬肉 傷寒下痢不能食者黃連一

冷水

韓氏醫通

傷寒下痢升烏梅二十枚去

核炙燥爲末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧子

大一服二十丸

日三服

又方黃連二兩熟艾如

鴨子大一團水

三升煮取一升

並荆後方

氣痢後重裏急或下泄

升頓服立止

並荆後方

氣痢後重裏急或下泄

薑連散用宣連一

一酒乾薑半兩各爲末收每服連

一錢薑半錢和

勺空心溫酒下或米飲下神妙

濟生方秘傳香連丸用黃連四兩水

香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞

煮焙研醋調倉米糊

爲丸如常日服五次

小兒下痢赤白多時體弱不

次子母祕錄

諸痢脾泄膿毒下血難治

水濃

煎和蜜日服五

六

大腸內紫定人砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末

大腸內紫定人砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末

揭腸和丸梧子大蜜服百丸米湯下極効

直指

潔痢腸風百子選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風子無用川黃連去毛吳茱萸

潔痢腸風百子選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風子無用川黃連去毛吳茱萸

潔痢腸風百子選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風子無用川黃連去毛吳茱萸

潔痢腸風百子選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風子無用川黃連去毛吳茱萸

潔痢腸風百子選方變通丸治赤白下痢日夜無

度及腸風子無用川黃連去毛吳茱萸

陽泡過各兩同炒香撈出各爲末以粟米飯和丸梧子大各收每服三十丸赤痢甘草湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方救人甚効。局方戊巳丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩爲木麴糊丸梧子大每服五十九米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸熟楊氏家藏方
大黃一兩梧子大無空心陳米酒糟下血黃連爲末獨丸梧子大每空心陳米酒糟下血黃連酒浸煮熟飲下四十丸濟生方酒糟下血爲末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方醫學集成雞冠痔疾黃連末傅之加赤小豆末用此寬腸黃連枳殼等用自然薑汁浸燒妙良方痔病祕結用此寬腸黃連枳殼等分爲末糊丸梧子大每斗門方