

驗方擇要卷二

鐵嶺儀臣鳳 岐韓

江夏蒔棠戚克昌

會稽炳侯陳邦輝

校

目錄

腿足

感冒風寒

夾色附

各種氣痛

中暑

驗方擇要

卷二

目錄

一



痧證

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

瘴癘

諸血

諸汗



南京中醫藥大學圖書館版權所印

風濕

癰疽論

癰毒治法

疔瘡

楊梅瘡

疥癬

癰瘤





南京中医药大学图书馆版权所有

腿足

腳氣腫痛

此證始於受溼以及酒色勞傷外感風寒暑熱忽然手足發冷發熱其氣從腳下而起上衝心腹作痛或頭疼身痛或脹悶或嘔吐或昏迷或大便閉塞或兩足脛紅腫寒熱如傷寒狀從此或一月一發半月數月一發漸漸四肢攣縮轉筋脚膝腫大此爲脚氣非中風寒也倘不知而誤以傷寒中風治之則爲害不淺矣

外治法

白礬

二兩

地漿水

十大碗

新杉木

三四片

煎六

七滾用杉木桶

新者更佳

盛一半浸脚留一半徐徐添入

上用衣被圍身使畧有微汗洗完隨飲薄粥如

未愈再洗二次照前方加硫黃

三錢

無不愈矣取地

漿法於淨土地上掘二三尺深用新汲水傾入攪濁

少俟澄定取半清半濁者吹去浮沫用之

又方 用鹽搽痛處少時用熱水洗之有人患脚氣

百藥不效後得此方除根

兩膝疼痛

名鶴膝風風勝則走注作痛寒勝則如錐刺痛溼勝則腫屈無力病在筋則伸不能屈在骨則移動維艱久則日腫日粗大腿日細痛而無膿顏色不變成敗證矣宜早治之用

新鮮白芷酒煮成膏收貯磁瓶每日取膏二錢陳酒送服再取二三錢塗患處至消乃止或內服陽和湯

見陰疽諸方

外用大戟甘遂二味研末白蜜調敷

或用白芥子末

酒調敷亦可

數日即消此林屋山人秘法也

白油膏

治癰瘡數十年不愈者數日即可收功捷

如影響並治禿頭瘡坐板瘡及一切年久溼熱諸瘡
膿血不止久不收口等證此方百發百中神妙非常
乃曠瘡第一方也用

真桐油

三兩

防風

白芷

各錢半

放油內泡一夜入鍋

器內慢火熬枯去藥漚淨渣將油再熬俟欲開時用

雞蛋

一個去壳

放油內炸至深黃色去蛋不用再將油用

火慢熬俟油色極明能照見人鬚眉入白蠟六分黃

蠟四分鎔化趕緊用竹紙十餘張乘熱浸入油內一

張一放一起冷透火氣須張張隔開風前吹透如放



在一處雖數日火氣難退貼上毒氣內逼難以收功
視瘡大小裁紙貼上頃刻膿粘滿紙棄去再換一日
換十餘次數曰膿盡肉滿生肌膿盡後不貼膿多者亦可生肌
黃蠟六分白蠟五分不生肌者用白蠟六分黃蠟五
分不得稍有增減

黃香膏 治臙瘡屢試如神並一切癰毒大瘡日久
不愈亦效用

松香白水煮透取出放冷水內搓洗數十下再煮再
洗如此九次倒地待冷取起每一兩加輕粉三錢

銀硃

一錢

白蜜少許鍊老成珠加菜油少許燉熱攪

勻看瘡之大小作餅置瘡上將細條紮住一周時取下用滾水搓洗極淨翻轉再貼周時取下再貼祇要一個藥餅直貼到好不須另換待瘡好將此藥餅洗淨收好如遇此瘡再與別人貼仍前一周時一洗一貼此餅若醫過三人之後貼上卽好若醫過十人貼上更能速愈奇絕妙絕

兩腿不能動作臥牀不起

此亦痿證如不起牀席已成廢人者內火熾盛以熬

乾腎水也苟不補腎惟圖降火亦無生機雖治痿獨
取陽明是胃火不可不降而腎水尤不可不補也今
傳一奇方補水於火中降火於水內合胃與腎而兩
治之自然骨髓增添燔熱盡散不治痿而痿自愈方
名降補丹

熟地

元參

麥冬

各一兩

甘菊花

生地

沙參

地骨皮

各五錢

車前子

二錢

台黨

一錢

水煎服此方降

中有補補中有降所以為妙胃火不生自不耗腎中
之陰腎水既足自能制胃中之熱兩相濟而兩相成

起痿之功孰有過於此者乎

又方

用栗子兩個

又名板栗要兩面俱扁者若於一面圓一面扁者食之不效

四更將盡初交五更時睡在枕上不必坐起先取一

栗緩緩細嚼不可吞咽口宜緊閉不飲茶水不可言

語嚼至融化如漿緩緩運氣吞下送至丹田

在肚臍下再

取一栗照前細嚼融化運氣送下食完聽其睡熟食

至半月後不必服藥自能漸漸行動百日内外平服

如常本年有浙江錢君福建吳君均患此證先經醫

治日久不效後各服栗三十餘枚至百日外全愈每

夜祇服兩個不可服多此神方也不可輕忽

足輒難行

足輒不能步履人以爲腎水之虧不知非腎也蓋氣虛不能運用耳方用

補中益氣湯

見內外備用諸方

加

牛膝三錢

蜜製黃耆

兩台黨三錢

水煎服四劑卽能行走此方內有石斛

一味經名醫刪去更見功效

脚丫奇癢難受

此有蟲而作癢也用火鑪放瓦一片撒韭菜子於瓦



上加入麻油兩足向上熏之用布圍住勿令透風少頃癢止有蟲落瓦上卽愈

又方 癢則用硫黃擦之擦後再用硫黃厚敷布包穿襪一日一換數日斷根切不可用手抓擦

脚趾縫中生毛拂著痛不可忍

真桐油煎熱滴一點於毛上毛卽脫落忍痛片時卽愈

脚根作痛

柳葉

一把

杏仁

三粒

枯礬

二錢

共搗爛敷極效

脚上生城音繭切忌用刀

葶薺半個貼患處過夜次晚再貼五六次其城連根

脫出

又方

葱頭葶薺共搗汁一碗煎再用

松香

四兩

麻油

半斤

熬至滴水成珠方入前汁攤膏藥貼上即

落

脚生雞眼

真烏梅肉搗爛入醋少許加鹽水調勻貼之自消

又方

葶薺

一個

蕎麪

一錢

共搗融貼上一晝夜自



落

又方 京城礪砂膏藥貼之亦能除根

行路脚底起泡

生灰麪水調敷一夜卽平

遠行健步

細辛 防風 白芷 草烏各等分共爲細末凡人

將行遠路者先將鞋底內用水微噴溼將此藥摻勻
於內雖日行數百里脚不腫痛

又方

蘿蔔子

炒研末

白礬

研末

共鋪鞋底內遠行脚



不作痛極效

驗方擇要

卷二 臍足

七



南京中醫藥大學圖書館版權所有