

痢疾論卷之三

諸證二十八門

噤口一

進繩云、痢不納食。或湯藥入口。隨即吐出。俗名噤口。多因邪留胃氣。伏而不宣。脾氣滯而不布。故嘔逆而食不得入也。有陽氣不足。胃中宿食未消。則噤而

後學楊大任占儀參關
黎水孔毓禮以立著輯
同邑陳元節菴全校
未邑陳馥柳田重刊



食不得下者。張石頑主枳實理中加砂仁有肝乘脾

胃發嘔。飲食不入。縱入亦反出者。石頑戊巳丸有

飲所停。氣急而嘔。穀不得入者。石頑曰水飲停聚

加薑有火炎熾。內格嘔逆而不得入者。石頑主黃連

加枳殼有胃氣虛冷。食入反出者。石頑論有胃中邪

熱。不入食者。石頑曰胃虛挾熱而有脾胃虛弱不欲

食者。石頑論有穢積在下。惡氣薰蒸而嘔逆。食不得

入者。石頑主大黃黃連脾胃不弱。頭痛心煩。手足溫

熱。未多服涼藥者。此乃毒氣上冲心肺。所以嘔而不



食石頑主甘草瀉心湯去大棗易生薑此症胃口有熱不可用溫藥

按張石頑遵正治準繩而代爲之擬治法而歸重于胃氣虛冷脾胃虛弱兩條曰丹溪用人參黃連陳法但石連子真者絕少乃粵中草實僞克大苦大寒子嘗以藕汁煮熟稍加砂糖頻服兼進多年陳米稀糜調其胃氣必效卽石連子之意也古治噤口痢多有黃連者苦而且降不能開提非胃虛所宜大抵初痢噤口爲熱瘀在胃口故宜苦燥若久痢口噤不食此胃氣告匱非比初痢噤口尙有濁氣可破積沫可



驅惟大劑參朮佐以茯苓炙甘草藿木香煨干葛之屬大補胃氣兼行津液乃可耳但得胃氣一轉飲食稍進便宜獨參湯畧加陳皮或製香附緩緩調補兼疏滯氣方爲合劑如茯苓之淡滲木香之耗氣干葛之行津皆當屏除也

朱丹溪用人參黃連粳米薑汁煎湯細細呷之神效如吐再作服之但得一呷下咽便開按此主治濕熱在胃者也楊仁齋用參苓白朮散加石菖蒲以道地粳米飲乘熱調下或用人參茯苓石蓮子肉入些菖

蒲與之。按此主治胃虛者也。戴復菴用治中湯加木香半錢或砂仁一錢。此主治胃寒而氣逆者也。準繩云在下則纏綿。在上則嘔食。當認其寒則溫之。熱則清之。虛則補之。

按痢疾不食。當初病時。右脉渾渾浮大。或浮弦。胸膈痞滿。乃濁氣上壅也。宜降逆氣。枳朴陳皮板榔之屬。有火兼連芩木香。有食加查麴。有表症者。合香蘇散。及對症發散藥。脉洪大急滑者。火也。清降之。芩連枳朴之屬。有痰加半夏生薑汁。脉滑嘔者。痰也。二陳湯。



加薑汁。虛加參朮。寒加乾薑。熱加苓連。右脈浮弱。沉細。或緩。胃虛也。異功散。加木香。少佐石菖蒲。若脈遲者。胃寒也。理中湯。加陳皮。虛而氣逆者。木香異功散。脈沉滑。或右關滯。噎不能食者。有宿食也。香砂枳實麴蘖。或大健脾丸。胃虛挾熱不食者。其脈稍急而無力。橘皮竹茹湯。冷熱不調者。連理湯。凡邪在胸膈。必然痞滿。虛亦痞滿。然總不若實滿之甚也。

周慎齋曰。下痢以胃氣爲本。胃失生長。故惡物而不欲食。無分何物。與之遂獲愈者。胃氣勝故也。有患

痢晝夜不及數度反發熱心下痞悶不能食而嘔其
有晝夜不止百度反脉靜身涼而能食何也曰痢之
邪客于下焦由橫連竟傳大腸原無反熱之理以中
焦無病雖下痢無度不碍飲食惟邪發于中焦由橫
連入胃以胃受病自不欲食也

發熱二

經云下利發熱死此言滯下症也仲景云下利手足
不逆冷反發熱者不死此言傷寒三陰寒症也寒症
嫌于無陽發熱者真陽未漓故曰不死滯下發熱嫌

于陽亢陰亡元氣無主一任邪氣之充斥必致內外
交困故曰死也丹溪曰經言身熱則死寒則生亦大
概言之必以兼症詳之豈無身熱生而身寒死者
按痢初起發熱多屬外邪其候頭痛身痛畏風寒或
熱或熱寒相兼撤其外邪其熱自退人參敗毒散倉
廩湯加減小柴
胡湯加味桂枝湯蔥豉益元散又有濕熱熏蒸發熱
五積散量虛實寒熱加減選用者其狀蒸蒸發熱亦能頭痛但不甚畏風寒或口渴
或汗多其脉滑數不似外邪之淫數弦緊清其內熱
則外熱自微不足深慮也

黃芩芍藥湯芍藥湯敗毒
聶氏方香連丸等選用



最忌先無熱或散之清之下之其熱已退入九日忽
又大熱多係陰傷陽亢之候爲可慮耳然審知腸胃
熱盛更宜清下者有之復感外邪更宜微汗者有之
又有陰虛痢疾熱在午後或夜盛晝輕其脉細急熱
甚者亦顯滑數以養陰清熱之藥調之湯劑詳陰虛痢疾門更
有過投苦寒攻伐虛陽外擾發熱者其脉空大無根
急用溫補收斂陽氣以上諸症未定卽死但對症投
劑而大熱終不退者爲必死也有外不甚熱自覺煩
熱難支欲去衣卧地者此陰陽離絕之候宜八味地

黃湯十全太補湯。然多不救。

發厥三

經言。痢疾身熱則死。寒則生。究竟死於發熱者。十之二三。死於發厥者。十常八九。蓋痢疾古名滯下。陽氣不得宣通。而治痢之家。知瀉而不知補。知寒而不知溫。知降而不知升。陽氣愈增。秘鬱不能分溫四體。甚至陽氣敗壞。週身冰冷。六脉沉細。十難救一也。予於此症。若見四末微清。卽慎寒涼。常見痢疾將厥。必先手足微冷。始則時冷時溫。次則冷多溫少。再則厥冷。

而不可治矣。故防厥逆者在將厥之時。先進溫補。然雖用溫補。亦有時欲厥。但不至于通身逆冷。汗注而或敗症間有厥回。而內有火者。不妨稍加清涼。以平之。若厥未迴。不敢輕用也。至于痢症初起。原係熱滯。未經疏散。清下。或早投補瀉。以至臟腑壅遏。經脈不通。而肢體逆冷。六脈糊塗者。有之。其症必脹痛逆迫。或寒熱舌胎。此則宜投峻攻。或表裏兩解等法。萬無有寒涼疊進。六脈沉細。猶謂之熱厥。猶謂之反兼勝已之化者也。然予於痢症發厥。每不敢投參附。以僥

易言
卷之三
二
讀益堂

偉功。非不欲救人于萬一。但恐投劑不效。或徒增

煩躁。反為若輩藉口。而熱厥之說。人愈深信不疑。耳

凡痢症。脉浮大者。不變厥逆。沉小者。不拘遲數。易變

厥逆。若四末微清。而時熱。脉弦浮急者。乃外邪未散

非厥也。以輕劑散之。加減小柴胡湯。加味桂枝湯等量。寒熱選用。手足微

冷。其脉滑數有力。證顯進迫。煩渴痞滿等候。四逆散加條芩。

板朴大黃之屬。皆可隨症加入。若通身逆冷。脹滿進迫。大柴胡湯去半夏。兼

外邪重者。防風通聖散。去石膏。寒涼誤投。而厥冷

無陽者。縱用參附。十難救一。若更厥冷煩燥。陰陽兩



敗矣。

附案○一涂姓痢下。二三日投枳朴青陳芩芍木香少佐黃連。而四末微冷。連投建中湯。而時冷時溫。連服溫劑。數日方得手足全溫。痢迸迫。脈弦急。改用芩芍而痢稍止。又用補氣血藥。或清補相間。二旬而安。

痢發厥。雖人事了了。能行走。俱不足恃。一涂姓早間發厥。能行走。夜忽死。○一何姓少年。脹痛迸迫。肢體厥冷。攻下而厥漸回。○按痢疾發厥。當溫補。

者十常八九。當攻下者十之二三。非症顯進迫痞滿煩渴等候。脉見滑數有力。四逆散中何敢加連芩枳朴大黃之屬。且不但不敢下。卽疏散外邪。必脉弦浮急。然後四末微清。而時熱乃爲表症。方可解表。表之一字。尙當審慎。漫言下乎。三案中宜溫者。按建中而僅得時冷時溫。連服溫劑數日。方得手足全溫。於此悟熱厥之症。必如何姓之脹痛進迫。方爲真熱厥也。

腹痛四

張景岳曰。腹痛有實有熱。有虛有寒。因食積者必多。脹滿堅硬拒按。因火者必多。內熱等症。因寒者經曰。痛者寒氣多也。有寒故痛也。凡生冷過度。及外受風寒。皆能致痛。因虛者。凡人元氣不足。雖無外因。而中氣不暖。亦寒症也。況瀉痢不止。胃氣既傷。膏血切膚。安能不痛。但察不實不堅。或可揉按。或喜暖熨。或饑不欲食。或胃脘作嘔。不見實熱等證。悉屬虛寒。準繩云。建中湯治痢。不分赤白。新久。但腹中大痛者。神效。其脉急。或濇浮大。按之空虛。或舉按皆無力。是

也。石頑曰。肉桂伐肝和脾最捷。腹痛者少加以和之。又云。下痢腹痛。脉沉緊無熱症者。先以薑桂之類溫之。後理積滯。上言腹痛之屬乎寒者。準繩又云。下痢膿血。粘腹。痛後重。身熱不除。脉洪疾者。黃芩芍藥湯。上言腹痛之屬乎熱者。

按痢疾腹中痛者。以芍藥甘草爲主。熱加芩連。寒加薑桂。痛在少腹者。更加吳萸。有積滯者。加厚朴枳櫚。青陳查麴之屬。胃虛挾滯者。大健脾丸。氣不調者。加木香。青陳香附。薑白之屬。血瘀者。加桃仁。玄胡。歸尾。

之屬久痢血枯加芩歸養之辨症如減無不奏效
門人問曰腹痛以喜按爲虛拒按爲實然否曰虛者
空虛無物也實者食積血蓄之類也火痛無形可
却非喜按虛挾寒邪逆氣亦拒按蓋寒邪逆氣亦實
類也可溫散不可寒散喜按喜熨者虛寒無疑拒按
者又有有物無物火逆寒逆之異記甲子秋月荷蘭
鄧兄下痢赤白左腹痛甚手不可近脉得沉緩弱小
無裏急後重一痛卽便便卽紅白相兼竟用薑桂佐
調氣藥及建中湯而痊