

校正醫宗必讀

却行

卷五

錦章圖書局

吳茱萸水石白歸附紫砂大龍口蜜良藥治心火燥渴而攻心腹之疾或冷散水頭
得疏肝氣有偏長症瘕附系相宜開導散虫至效

辛散燥熱獨入厥陰有力脾胃甚旁及者心東垣云獨陰不除則氣上逆其而脹滿非茱萸不可治也多用桂元氣

冠氏曰下氣散寒通腸虛人服之愈甚凡病非寒滯者勿用即生寒滯者亦當酌量虛實通事為效也

山茱萸水白歸附紫砂大龍口蜜治補腎助陽車腰膝之病不必慮心閉精縮小便遺瀉之證益足惠平月

事多而可以止耳鳴響而還其聰

四時之令春暖而生秋涼而殺萬物之性喜溫而惡寒人身精氣亦賴溫暖而後充足况督肝居至陰之位非得溫暖之氣孤陰無以生山茱萸正入二經氣溫而主補味酸而主收故精氣益而脾腰強也按強陽不痿小便不利者不宜用

檳榔水白歸附紫砂大龍口蜜治胸中懊憹而眼卧不瞞疏睛下血滯而小便不利清太陰肺經而上達漏三焦心屬曲而下行足陽明為水穀之海手陽明為傳道之官二經相為貢輸以運化精微者也二經病則癆瘕蟲瘻生焉辛能破滯苦能殺虫故主治如上按檳榔降諸氣至于下極氣虛下滿者忌

梔子水白歸附紫砂大龍口蜜治胸中懊憹而眼卧不瞞疏睛下血滯而小便不利清太陰肺經而上達漏三焦心屬曲而下行足陽明為水穀之海手陽明為傳道之官二經相為貢輸以運化精微者也二經病則癆瘕蟲瘻生焉辛能破滯苦能殺虫故主治如上按梔子本非吐药仲景為邪氣在上得吐則邪出所謂高者因而越之也亦非利小便拘急肺清則化行而膀胱津液之府奉氣化而出矣按大苦大寒能損胃伐氣虛者忘之心腹痛不因火者尤為大成世人每用治血不知血寒則疑反為敗証治寢火之吐血順氣為先氣行則血自歸經治虛火之吐血養正為先氣壯則自能攝血此治療之大法不可遺也

蕪荑水白歸附紫砂大龍口蜜治心下積痞

徐府積之要

諸虫之神制

幼科取高要高然久服多服有能傷寒

桔梗水白歸附紫砂大龍口蜜治心下積痞

心下痞滿

除心下積痞

破至高之氣除欬逆停痰助便導之官消水留脈滿

枳實水白歸附紫砂大龍口蜜治心下積痞

除心下積痞

除心下積痞

破至高之氣除欬逆停痰助便導之官消水留脈滿

枳實枳壳水白歸附紫砂大龍口蜜治心下積痞

除心下積痞

除心下積痞

破至高之氣除欬逆停痰助便導之官消水留脈滿

利氣而止渴。服之令人之一身當無病。人可必分上與下氣與血乎。但枳殼則
生之燒殺出其氣為確當耳。按枳殼於寢寢專主反氣大病。元凡氣弱脾虛以致停食居滿法當補中益氣則食
自化。瘧自散。若用枳殼枳塞是抱薪救火矣。腹滿因於寢邪者可用苦因土虛不能制水肺虛不能行氣而誤用之
則禍不旋踵。瘦胎飲用枳殼。在陽湖公主而說以彼奉養太過形氣肥寢故相宜也。若一概用之反致氣弱而難除。瀉
古枳朮丸用枳實為補滯者設種消去則脾胃自健故謂之補非有滯之外別有補益也。時醫不察虛寢不辨病瀉
往往概施損人真元為屬不淺雖以補制之亦難挽其剝削之害。歸脾丸則大抵皮肉片用姜半錢。石半錢能散風邪溫可解寒氣下氣消痰去寢滿而寬胸溫胃
厚模寒水石忌。大溫無毒。人脾胃二經既善為使惡事。確石半錢能散風邪溫可解寒氣下氣消痰去寢滿而寬胸溫胃
和中調胸腹而止痛吐利交濟。燒煩兵王。

溫氣之性長於散結去溼益胃緩脾故主食停痰而脹痛吐利等證然但可施於元氣未虛邪氣方盛或客散抗而
溼氣侵脾。若脾虛之人雖有如上諸證切勿沾唇或一吟未免其害而純清冲和之氣當傷耗多可不論諸
茶葉味苦微寒無毒入心肺二經消食下渴氣止渴醒睡解炙燄之毒消痔瘻之癟善利小便。曉齋頭痛。

寒土之清氣。兼得春初生發之意。故其所主皆以清肅為功。然以味甘不澀氣分如蘭色白王者為良茶。草天地
至清之氣。在於滑砂之間。專取茶葉之嫩芽不當纖塵之深穢故能清心降陽。胃為清貴之品。昔人多言其苦寒不利
利脾胃及多食發黃消瘦之說。此皆語其粗惡生澀者耳。故入藥須擇上品方有利益。

猪苓味甘淡平無毒入分消水腫淡分溼根

勿服。

猪苓感根之餘氣而成利水諸証無如此驗。按寇宗奭曰。多服猪苓久損腎昏目潔古淡殊燥亡津液無溼根

烏藥味辛溫性平入辛溫方酸為下氣溫中要藥。按氣虛及血虛內熱者勿用。

海桐皮味苦平無毒除風溼之藥理腰膝之疾。五臟亦治牙齒。

按海桐皮非風溼者不宜用。治牙須與他藥同行。

大活心水。附一劑。專開心腹之藥逐皮膚之水。

主用與相柳相柳但力少變耳。鳩鳥多集大臘樹上宜以大豆汁多洗之。汁去盡火焙用。按病涉虛者勿服。

合歡味甘性平無毒安和五藏歡樂忘憂

心為君主之官土為萬物之母二藏謂和則五藏自安神明白暢於腹養生論云合歡蠲忿正謂此也。一名夜合五倍子。本云味酸性平無毒散肺化痰故止咳有效散熱生津故止渴相宜上下之血皆止陰陽之汗咸利之。濕利久而能斷腫毒發而能消。控口瘡潰更可食先脫紅項刻能收染癰腫之白治目爛之毒。

按五倍子性燥急而專收斂。次收由於風寒者忌之。鴻刺非虛脫者忌之。款冬由於肺火寒者忌之。誤服反致壅滿以其收斂太峻火氣無從泄耳。

天竺黃味甘性平無毒解風熱鎮心安五藏大人中風不語小兒天吊竒癆。

竹之津氣結成與竹沥功用相倣故清熱養心豁痰利氣久用亦能寒中在於天竺國。

密蒙花味甘性平無毒入藥苦和血退翳明光大人目疾盜蓋明小兒痘疳攻眼。

獨入東方為溼氣和客一用故治目之用無他長也。

巴豆味辛性熱有大毒入脾胃大外陽五證丸死灰燄火散大黃湯通下瀉五藏除六腑。幾於煎屬刮胃攻堅積破瘀血直可斬關奪門氣血與食人而治瘧疾虫及水煩利而無遺胎兒立驅寒行毒旋抽。

生於盛夏之令成於秋日故味辛氣溫得引猛烈之用。蕩滌一切有形之物。按元素曰：豆不可輕用。醫書雖開真陰隨損以少許着肌膚須臾發泡況腸胃兼導之質無訛下後耗損真陰即減附破其裏灼能無清肅之患耶。萬不得已亦須炒熟去油入少許卯止不得多用。

蜀椒味辛性熱有大毒入脾胃三鹽仁為使溫脾土而擎三焦之冷端補元陽而蕩六腑之沉寒。欲解氣凝和水腫紫連奇功殺虫止嘔及陽虛恒收速效通血脉則逐寒消除行肢節則勝附健運椒目善消水腫可塞耳聾。椒黑純陽之氣乃除寒溼散風邪溫脾胃燉命門之聖药。按命門火衰中氣寒冷者宜之。若陰虛火旺之人在所

人忌

胡椒味辛大熱者善下氣溫中消風去寒。忌用與川椒同烹食加即胡椒之大者乃一顆二種亦易當耳。

木鼈子味苦性平止久利而多功治瘧氣血虛腸胃滑者大戒

按新編本草基旨忌服

蜀木鱉形軟小而色白味苦主咽喉腫痛生肌肉

有大毒但宜外用勿輕內服

水楊柴味苦平止久利而多功治瘧瘧而起發

生於溼沃之旁得水土之氣偏多能散溼熱故久利需之疽癰頭面癰帶不行或風寒所阻者宜水楊枝葉無花用嫩枝五動流水一盞煎易溫浴如今添湯良久始見紫起有牽絲者利行也如不滿再治之虛者只洗頭面手足裏浴不起者死初出及庠塗者宜不可浴若內服助氣無灼其效更速此方有變理之妙

金鑑鍾一動而蟄虫皆去東

風一吹而堅冰解腹之義也

柞木皮味苦平催生聖藥黃疸奇方下行利濕故黃疸與虛家通用

棲櫚皮味苦平吐血鼻紅陽毒病十全奇效崩中帶下赤白痢一切神功

性溫故止血有功然惟血去已多滑而不止者宜之若早服則停瘀為害火炒烟盡存性喜地上出火毒

川槿皮味苦平止腸風與久痢擦頭辟及虫癩

肉厚而色紅者具不宜多服

皂莢味苦性平治溫毒小毒入肺肝脾及生蟲子熱便閉寒開敷通關宣壅通津搜風逐痰辟邪殺鬼

性極尖利無閉不開無堅不破中風傷寒陷相為濟急之神丹石類中風由於陰盛有寒之孕婦亦集子去處少

浸軟煮搗汁食之治大腸虛秘瘰疬惡瘻刺功用與皂莢同第其銳利能直達瘡口為難治奶奶丁腫木齋之神

荳米醋熬微利除癰有效療疽已潰者勿服孕婦亦忌

訶黎勃味苦溫無毒入肺大固腸而少利咸安肺而喘嗽俱止利咽喉而通津液下食積而除腹滿

按其主用冒溫渴收飲之功若肺有寒氣渴則因虛利氣喘因火冲法咸忌之

棟寃味苦性平治三虫利小便

根微殺諸蟲通氣陽

大寒大苦止宜于殺虫若脾胃虛寒者大忌

桔白皮味苦性平治小毒瘡血止驚癇殺虫收產胎

苦寒之性虛寒者禁之醫家真陰虛者亦忌之以其徒燥耳止入丸用不入湯煎 桔白皮主用相仿力稍遜之

部 李仁二味湯平寒清火利大腸潤通幽門而開格有緩急之妙寒通水膀而腫脹無壅遏之嗟

性兼降下善導大腸燥結利周身水氣然下後令人津液虧損燥結食甚乃治標救急之药津液不足者慎勿輕服需丸散

雷丸乃竹之條氣得辟惡而生故名雷丸殺虫之外無他長久服令人陰痿

蘇木味甘性平無毒宣表理之風邪除新舊之瘀血

蘇木理血與紅花同功少用和血多用即破血也其治風者所謂治風先治血血行風自滅也

沒石子味苦溫無毒入督脈忌銳器用以益血生精除癰瘍而還少強陰治癥助陽事以生男避精止遺淋固腸醫泄痢

栗谷生之氣東金水之性春為發生之令故有功於種玉金主收肅之用故有功於止瀉然亦不宜獨用多用也

木瓜味酸性平無毒入筋筋急者得之即舒筋緩者遇之即利溼毒可以兼攻脚氣惟此最要

得東方之疏故入厥陰治筋非他藥所能備而通筋時但念木瓜二字數十聲立知東坡云氣脫能收氣滞能和故

於筋急筋緩兩相宜耳 按孟诜云多食損齒及骨竟間所謂陰之所營傷在五味五味太過則有增勝之意也

葉部

蓮子味甘平無毒入心脾心腎交而君相之火邪俱清腸胃厚而濡利之滑脫均收煩用能溫精多服令人善睡鴻臚
肺木甘平入心肺火熱生用則涼熱除煩散熱而還為新血熟用則補中和胃消食而變化精微 蓮花味甘平無毒入心
肺二經忌熱生用則涼熱除煩散熱而還為新血熟用則補中和胃消食而變化精微

清心而諸竅之出血可止固腎而升丹田之精氣無遺無變寒熱利能除

蓮子脾家寒也久服益人石蓮子凡九月挖根剝葉如石灌水入尼首今肆中石蓮子甘味太苦生質中樹上不宜入药 痘性帶溢止血有功寒家忌生冷惟獨不忘去能去瘀故也 蓮頭溫而不熱血家渴家專本上利

蓮房清心解熱不宜多服 葵可助胃消食 常治寒熱風取其有震仰直之義物從之義也

橘皮味辛溫無毒入肺脾二經忌熱生用則涼熱除煩散熱而還為新血熟用則補中和胃消食力能去寒熱而有中和之性清寒理氣却無峻烈之嫌留白者補

胃偏宜去白者

真草

言

告能泄氣又經燥坐半能散氣溫能和氣同補約則潤而鴻約則濡同升約則升同降約則降夫脾乃元氣之母肺乃攝氣之竅故獨入二經氣雖中和然草服久服亦損真元橘皮下氣消寒橘肉生痰聚散一物也而相反如此青皮榔榔之小破寒氣愈用愈烈則堅積愈下愈良引諸約至厥陰之分下飲食入太陰之倉青皮莫能發汗性雖猛銳不宜多用如人年少壯未免躁暴及長大而為橘皮如人至老年烈性折減經久而為說皮則多歷寒暑而橘氣全消也核正陽尤甚一未為末酒服五錢徐主師藥乳雞喙汁飲之

香櫞

味苦溫甘辛無毒久者良去白者

二理上焦之病止呕宜求進中州之食健脾宣問

性雖中和單用多冗亦損正氣脾虛者顧與久沉同用乃有相成之益耳

大棗

味甘性平無毒

人名

和脾胃具生津止渴之功潤養肺經攝助厥強神之用

經言氣血脾寒脾病宜食之又曰脾病人母多食甘母乃相戾耶不知言宜食者指不足之脾也如脾虛泄屬之病母久食者指有餘之脾也如中滿脹脹之類凡用药者能隨其虛寒而變通之雖尋常品味必獲神功苟執而泥之雖有良利莫若其長沒學者以格致為正也按棗雖補中然味過于甘中滿者忌之小兒疳病及齒癩瘦熱之人俱不宜食生者尤為不利紅棗功用相仿差不及耳

艾葉

味苦性平無毒

醫

本草

歸根

固精而遺濁有補益脾養氣而泄為無處

梔水土之氣以生獨子脾得力小兒不宜多食難消故也

烏梅

味酸性平無毒定收定滯皆由肺之熱止血止利氣是固腸之力清音去疾延安蛇蠍頭熱蝕惡肉而止連消酒

毒以清神

白梅

味酸性平無毒開閉根延止便能開刀箭傷膿研細燒之血即止

烏梅白梅皆以酸收為功疽創傷有肉突起烏梅燒傳一日減半兩日而平真奇方也夫梅生於春曲直作酸病有當發散者大忌酸收誤食必為害石遇食而為鐵晉胡桃肉解之

柿木

味酸性平無毒潤肺止咳清胃潤腎止火

乾柿能厚腸而止洩主反胃與下血

柿霜清心而退熱生津潤肺而化

痰止嗽

三者主用大同小異。桃之氣清上焦火燒氣有益肺之功也。有人三世死於反覆至攝得一方用柿餅同乾飯食之絕不用水亦勿以他藥雜之旬日而愈。按柿性頗寒肺經無火及風寒作嗽者冷剝滑漫者忌之。與鹽同食令人腹痛作渴。

勃齊味甘寒益氣而消食降火以生津潤燥通便下血宜當

同胡桃食能化銅物為烏有一味尤未能解。堅毒。按孟懿云有冷氣人勿服多食令人患脚氣草脚忌之。

枇杷葉味苦平無毒。橘皮治肺經熱。桃仁味甘走陽明則止嘔下氣入太陰則定欬消痰。

長於降氣氣降則火消痰順但去毛木藥射入肺中作欬難療。按禽寒喘咳及風寒欬嗽者忌之。

甘蔗味甘平無毒和中而下逆氣助脾而利大腸。

棗地之冲氣故味甘性平甘為搖搖之物故和中助脾亦能除熱止渴治腰渴解酒毒。按世人以蔗為性雖不知其甘寒為火王摩詰詩云飽食不須愁內熱大官運有蒸製寒營詳于本草者耶惟宵寒夜噉中滿滑渴者忌之。白沙糖味甘無毒生津解渴除陳致消痰。紅沙糖功用與白者相同和血乃紅者獨長。紅白二種皆薄汁兼血。

多食使口齒生虫作湯下小兒丸散者慎矣中滿者禁用。

桃肉味甘平無毒入肝大腸二經者破諸經之血於潤大腸之血燥肌有血凝而燥庠除熱入血室而增言可止苦重於甘氣薄味厚沉而下降為陰中之陽苦以推陳甘以生新故血疾恒需之桃為五木之精故能辟邪殺鬼亦可殺虫。桃更是桃蠹在樹經冬不落者正月採之。王辟邪去案。按桃仁破血血瘀者相宜若用之不當大傷陰氣。

杏仁味苦甘溫有毒入肺大腸二經者寒者利胸中氣逆而喘嗽潤大腸氣閉而導通之。按陰虛久嗽者忌之。杏仁者能殺人有毒。蓋指此耳。錫毒有故消狗肉如神。

杏仁性溫散肺經風寒而利喉。按陰虛久嗽者忌之。杏仁者能殺人有毒。蓋指此耳。

梨味甘酸性寒無毒。外宣風熱內滌狂痰消痰有奇效。酒最冷。

人知其清火消痰不知其散風之妙。生之可清六腑之熱熟之可滋五臟之陰。按丹溪曰梨者利也流利下行之。

謂心脾虛瀉滿者某之

拔根入肺腎二經清咽喉而止渴。清酒海毒解毒更異。

跡其主用約與阿黎勒同誤中河豚毒惟微燒煮汁可服諸魚破骨而效。櫻汁咽之如無以核研和急流水調服亦殊。

胡桃味甘平無毒安補骨而治痿強筋。東胡粉而拔白癧。久服潤腸胃。恒用悅肌膚。

三焦者元氣之別使。命門者三焦之本原益一原一委也。命門指所居之腑而名。乃藏精係胞之物。三焦指分治之部而名。乃出納敷厲之司。一以體名。一以用名。在兩臂之間上通心肺為生帝之原。相火之主。腹腔已詳言而弗擇。不知原委體用之分。以右腎為命門。以三焦為有名無狀承訖至今莫能正也。故桃仁頗類其狀。而外之皮汗皆黑。故入北方。通命門。命門既通。則三焦利。故上通於別耳。一幼兒痰喘五日不乳。其母夢觀者令服人冬胡湯數口。喘即定。明日去胡桃衣喘復作。仍連皮服。遂愈。蓋皮有飲肺之功也。但用一味空腹時連皮食之最能固氣。

按肺有痰熱。命門火熾者勿服。

龍眼肉甘平無毒。補心虛而長智。悅胃氣以培脾。除健忘。健中能安神而興寐。

不熟不寒和平可貴。別名益智者。為其助心生智也。歸脾湯用為向導者。五味入口。甘先歸脾也。道家角龍眼肉。謂千餘粒滿口津生。和津汨汨而此即服玉泉之法也。

山楂味酸甘性平。入殺百種之虫。手到而痊。療五般之瘧。煩渴則飴。清殺食而治欬。助筋骨而壯陽。

東坡詩云。驅除三彭虫。已我心腹疾。指其殺虫也。不問何虫。但空腹食山楂二十一枚。七日而虫下。輕者兩日即下矣。

按丹溪云。山楂子。肺家果也。多食則引火入肺。大腸受傷。

石榴皮味酸性平。入殺百種之虫。手到而痊。

清殺食而治欬。助筋骨而壯陽。

善去腥羶陳臘之積。與麥芽之消穀積者不同也。核主確空疝氣。按胃中無核及脾虛惡食者忌服。

榧子味甘平性平。入殺百種之虫。手到而痊。療五般之瘧。煩渴則飴。清殺食而治欬。助筋骨而壯陽。

東坡詩云。驅除三彭虫。已我心腹疾。指其殺虫也。不問何虫。但空腹食榧子二十一枚。七日而虫下。輕者兩日即下矣。

按丹溪云。榧子。肺家果也。多食則引火入肺。大腸受傷。

石榴皮味酸性平。入殺百種之虫。手到而痊。清殺食而治欬。助筋骨而壯陽。

善去腥羶陳臘之積。與麥芽之消穀積者不同也。核主確空疝氣。按胃中無核及脾虛惡食者忌服。

接觸味酸濃故入帶下崩中之劑若服之太早反為害也

穀部

胡麻子甘平無毒入肝脾胃三經養血潤腸燥結通便易過補中益氣風溼癰瘍宜堅筋骨明耳曰輕身不老色如黑漆味如黑漆九蒸熟食可治久病

長肌膚填髓堅骨延年

補陰是其本職又去風者治風先治血血行風自滅心李延飛云風病人久服步履端正語言不塞神農收為上品仙經載其功能洵奇物也但服之令人腸滑得白朮並行為勝

麻仁木甘平無毒入脾胃二經潤土燥白朮破瘀逐寒化置沸湯潤五臟通大腸宣風利潤止催生發產難

劉完素曰麻仁木殺心而治風同氣相求也潔士良言多食損血脈滑精氣壅陽事婦人多食即發帶疾以其滑利下行走而不守也

麻油甘平無毒利大腸下胞衣生者摩擦肚生光澤

生者遇飮能發冷痢脾虛作瀉者忌之熟熱不可輕信經宿即助熱動氣也

饴糖甘溫無毒止嗽化痰千金方每嘉神效脾虛痛連中湯裏蓋奇功瘀血散集加酒服腸鳴須用水煎當

按饴糖雖能補脾潤肺然遇用“反能動火生痰凡中滿吐逆酒病牙疳咸忌之醫病尤不可服”

黑豆甘平無毒活血散熱除熱解毒能消水腫可補虛羸

嬰兒十歲以下者炒豆與豬肉同食煙氣致死十有八九凡服蓖麻子忌炒豆犯之服死服厚朴者亦忌之最動氣故也

赤小豆甘平無毒利水去熱一味磨吞決焱散血排膿研末醋傅神良止瀉行津流清氣除煩蒸涌乳汁下胞衣

產科要矣除利疾止嘔吐脾胃宜之

赤豆心之穀也其性下行入陰分進小腸治有形之病消癰散腫雖瀉爛幾絳者為末傅之無不立效按久服赤豆令人枯燥則瘦身重以其行降令太過也

菜豆甘平無毒利水解熱而止渴去浮風而潤膚利小便而治腸澼腹脹以和脾

菉豆屬木通于厥陰解毒之功過於赤豆但功在菉豆若去殼即與赤豆矣。若面寒者不宜食。
菟豆味甘性平無毒入肺脾二經燔入補脾胃而止吐瀉發瘧而清溼熱解諸毒大良治帶下頗效。
色黃味甘得乎中和脾之性也能升清降濁故有消暑之用皮如栗色者不可入藥。按傷寒邪氣者禁用。
淡豆豉味甘性寒無毒入肺脾二經解肌發汗頭痛與寒熱同除下氣清煩滿悶與溫疟並妙。疫氣瘴氣皆可用也。利疾瘧疾無不宜之。

荳經兼善能升能散得葱則發汗得益則止吐得酒則治風得薑則止利得蒜則止血炒熟又能止汗亦要药也。連政法黑豆一斗六月間水浸一宿蒸熟搗芦席上微溫高張五六日後黃衣遍滿為度不可太過取節候涼水拌得中。案寔是中藥葉盛厚三寸泥固取出晒半日又入甕如是七次再蒸晒乾。按傷寒宜中三陰與傳入陰經者勿用。熱結煩悶宜下不宜汗亦忌之。

麥蘖味甘性平無毒入胃大腸熱屬五經消導而無偏壅行三焦宣通而不滞寒勝陽興發化亦催生而豐胎。
古人惟取穀麥為劣今人多用大麥者非也以殺消殺有類從之義無推蕩之峻胃虛停殺食者宜之然有殺化殺無擣消腎氣墮胎。

神麴味甘性平無毒入胃大腸健脾消食停腹痛無虛下氣行氣泄胃翻有指。

五月或六月六日以白麴百斤青蒿蒼耳野菊各取自然汁六大碗赤小豆杏仁泥各三升以配白虎青龍茶崔玄武勾陳勝蛇用諸汁和麴甚布包作饼堵篋包甚如活火黃法待生黃衣曝乾收之。按脾陰本質火成者勿用能損胎孕。

穀芽味甘性平無毒消食與麥芽同氣溫中乃殺蟲偏品。

味甘氣和具生化之性故為消食健脾開胃和中之要药。
酒味甘辛有大寒通血脉而破癥逐腸胃而潤肌宣心氣以忘憂助胆經以發寒。行氣可禦風寒。
少秋則和血行氣壯神消愁過伏則補胃耗血生痰動火故夫沉酒無度醉以為常者雖則致病重則亡。此大寒所以疎儀欲周公所以著酒誥也。燒酒散寒破結損人尤甚。

醫案說此之謂也。人病正鴻利而收脫，正鴻精氣而固遺，世知虛守之故，捕小便之矣。

卷之三

小禁中苦寒有小理上脫之病或水滯或食積總堪平治去胸中之邪或在脾或在胃或致安寧水泛皮中得喘而發溼家頭痛嘔鼻而愈

白芥子味辛性温，能消食，化痰，散寒，通利肺气，除湿中而冷滞，水消肿胀而紫黑，逐恶血，通经脉，服而反胃宜生醋煮而酒毒等症。瘦在膈下及皮裡膜外者，非白芥子不能除。煎汤不可太热，便减力量。按肺裡有熱，除虛火亢者勿服。蓋茶、山藥、動氣有瘧，為痔疾，使血益俱忌。

米服一兩，下氣定喘，消食除脹。研末，吐風寒痰，調和消腫毒。

丹溪曰：「善服子治疫，有推腸倒胃之功，其性烈也。」按虛弱人服之，氣沈難布息。

新美心脉脉二物破血消癰腸治可服酒中下熟地黃補脾益陰間胃扶脾有食去滿生行則藥力更著

乾姜本辛燥之則苦守而不移非若附子行而不止也其止血者在血分則散熱則妄行慘寒則收引而止血者入陰分血得補則陰生熱退且黑為水色故血不妄行也然血寒者可多用血熱者不過用三四分為向導而已

歌家述用

凡中國中暑中氣中毒中惡症狀一以草果之液用姜汁和量便服之姜汁能開痰竇便能降火止苦乃以姜茶治

病氣留風冷寒素皮大妙 忌服同乾姜

葱白半升入肺潤中發活頭疼風溼癰癧利便聞關臍氣奔豚通解能跌打金瘡止血砂糖研陳敷行火利
為破船粉丸桑葉攻喉源亦可安胎

葱為最老肺之药也故解散之用居多 按多食令人神

大蒜味辛溫有毒能消殺化食辟惡氣破癰癧久功足惡瘧

引之矣

大蒜用最易功至捷外宜皮內熟泡作丸則其入腸胃而搜刮

唇即宜用者亦勿過用生痰動火損目耗血謹之

韭味辛溫精氣燥脾躁強腎之功也止渴利散涼溫脾之力

免矣 按性烈氣臭凡虛弱有熱之人切勿沾

蒜 古方用韭烹治癰癧雖入肺辛散溫下心火食神昏目暗

金石部

金箔絲絲安壅竇古神祕先於銀屑除惡氣滅附按其伏根

東西方之寶為五金之主最能制木故中風驚癇皆需之銀箔功同桂枝 按金有大毒磨屑煩服不過三錢而效

宜可多服平惟生者用之

白蜜銅絲等平續筋接骨折傷者依然復舊消炎破瘀止痛者碌爾消除

按白蜜細研有神用頗能補人不可過用

銅青絲等平婦科理血氣之藥服料主風熱之疾內科吐氣疾之藥外科止金瘡之血或虫有故用置亦宜

黃丹味辛平止癥生肌宜於外傷燒心妄想可作丸吞下服後如鐵燒止

按黃丹乃炒鉛所作味性沉降通補陽氣

急點胸前落格膏外攻之益研塗足底火熱有下

急症氣上衝

蜜陀僧本平生有劍是鎮心主滅羅刹五兵金將同偕聖徒家都護共尋求

即前銀爐底感銀鵝之氣而成其性重安故鎮火不疾湧水飛用食之令人寒中

紫石英
木甘
無毒
火煅
淬水研
子上通君主
下達將軍
助胎宮而有功

紫石英南方之色故功在血分火熱者忌之

硃砂黑星水石硫黃丹青鹽心而定顛狂辟邪而殺鬼祟解胎妖痘毒藥目漏牙疼

色赤應離為心經主火獨用多用令人瘡悶

男陽陽痿無氣惟以赤土條治處水銀自出楊梅瘡服輕粉毒脣骨髓毒發殺人輕粉主殺虫生肌

雄黃味苦平，具殺水氣，每服一錢，治毒瘧，解瘧藥，力不少。血寒風溼，起于尻尾，注依方製服，效偏奇。化痰涎之積，塗蛇虺

之傷

獨入厥陰及諸經殺毒之藥亦能化血為水

石膏甘草生地黃入肺胃二經能清火而止渴。傷於風寒者龍收佐使之熱同傳因於火熱白虎定為君之劑頭皮煮肉肌膚入胃而搜逐有溫陽狂逆氣逆入肺以驅除。

氣味俱薄體重而冗少壯火熱之人功如反掌老弱虛寒之人禍不旋踵東垣云立夏前服白虎湯令人小便不禁降令太過也極能寒胃使人腸滑不能食非有大數者切勿輕投

滑石味甘淡，性平，利小便，行精血。宜久煎，通六腑之结。

滑石利尿不獨小便也。上能利毛竅，化能利精，然其甘淡先入胃家，上輸於肺，下通膀胱，肺主皮毛，水源膀胱司津液，氣化則能出。故上利後表，下則利水為焉哉。燥熱之劑，按多服使人精滑脾虛，下陷者禁之。
赤石脂，性大溫，味甘，無火，無毒，無大毒，人脾經，止渴，止血，止水，止泄，三主生肌長肉，可理癰瘍，瘡瘍，漏脫，能除腸澼。

按石脂固涩，制酸家忌用。

爐甘石水飛最風熱而腫消破瘀，氣而翦退。金銀之氣所結於眼科要妙。

止嗽解渴上部之虛傷宜蜜

其氣燄燭令陽氣暴充飲食倍進昧者得此肆淫則精竭火炎發為癧瘍淋濁宣鍾乳之罪那大抵命門火衰者相宜不商便有害矣

海浮石味甘性平，清金降火止渴。治久病精竭，老瘦，逢便化痰，结核，属肺，消

海石水未得成體質輕則肝之氣也氣味如寒下之用也故治證如上
據多服損人氣血
此一物性味溫無毒入胃陰降消為清火藥性平而力大有清火之功

陽起石此壯陽也。然子之草血以當水氣，固精而壯元陽益氣而止崩漏者，其功尤大。七味地黃丸，亦可服食。

此不見有大病者。久服則氣和神安，無病者亦能無病也。

鎮益腎故礞礞丸用之可暫用不可久也

本草平水經化祖處并積行食積停滯，腹見青礞即化為水解虛者大忌。

花蕊石末水服一錢，止吐血如神。消瘀血，去水。
血見花蕊石即化為水，過用損血，不可不謹。

食鹽末入鼻通氣而止病。皮日而去風二便門結，肺寒隨心腹煩，服吐即愈。治疝與辟邪有益。麻子仁散，利大便。

4

少病名瘧東南人舊稱少無多病資益功用相同人并敬風

標硝入膏大解寒氣，去破血攻癰，消食解結，法製之明粉，功緩力稍慢，明目清燥，推陳致新。

朴硝在下最粗而蜀硝在上其质稍清之明粉再经煎炼尤属精粹方士益考玄明粉却病延年不根之说心若

施之於有虛無火之人及陰毒沉寒之証殺人慘於刀劍矣

蓬砂水者取之無退墮陰晝間考內消渴止散口舌生瘡宜服此藥俱得之勿失骨硬通宜

性能不五金鼎治丸可失但有偏重不足者宜加此官
硫黃朱砂大熟石膏入心腎二經根細辛甘淡鹽茱萸桂枝
生熟大黃大黃炭大黃炭大黃炭大黃炭大黃炭大黃炭
壯陽助筋骨陰氣全消殺虫燥寒溼瘡癩河蟹標老年風

經半夏而立通泄利壅寒煩渴而速止。艾湯投一切陰毒回春溫酒送三丸而寒再遣。

東北陰之精能補君火可救頭昏。煩渴真可延年然須製煉得宜淫房斷絕者能之。

有不當胎楊桂輕

白雲散
水銀石英共八味研一酒浸止痢滌熱祛風收肚陰理筋腰溼。

礬之用有四吐風熱痰涎取其酸苦涌洩也。諾血脫肛陰挺瘻漏取其酸澀而燥溼也。長輝散蛇傷藥取其解毒也。多服傷心肺。

土部

伏龍肝
生地黃熟地黃各半分人參一錢大黃一錢女人崩中帶下。丈夫尿血遺精助火心黃土去溼有專長。

黑柏子
水銀研末酒服止血以苦酒送下。消癰用猪胆調塗

墨者北方之色血者南方之色止血者火見水而伏也內有鹿角膠非煅紅不可用。

百草霜
研末清咽治痢解熱定血。黑奴丸用以療陽毒發狂亦從治之義也。

人部

髮
味苦溫性入去瘀血補真陰。父髮與雄子同煎竟日鵝鴨性已髮真川椒共煅令本體烏頭吐血細紅取效勝崩帶宜求。

髮者血之條也故於血証多功入確中盐泥固脣以存性。

牙齒
水銀研末酒服治齧倒屬齧加少許酒調吞。麻丸雖穿缺拌貼之旋發潰內訛陰疽不起外敷急漏多膿。

諸者骨之餘得陽剛之性。痘家刮剝心若伏毒在心。痘不省氣虛自瘡或兼紫之症宜補虛解毒。誤用牙齒者不治。

乳
甘草三錢人大補真陰最清煩熱補盛分潤喉膈大方之玉液也。祛膜亦止淚澁眼証之金華散。

乳乃血化生於脾胃攝於衝任未受孕則下為月水既受孕則留而養胎。產後則變赤為白上為乳汁此造化玄微之妙鄰病延年之均也。按虛寒消泄之人禁服乳與食同進即成積滞發澁。

津唾無聲脾氣虛而消腫。目明眼目而悅肌膚。

津乃精氣所化五更未寤之時空腹漱拭目去障咽入丹田則固精而制火養容無違謂之清水灌滿人能終日不嘔收視返聽則精氣常凝客顏不槁若頻嘔則損精神成肺病仙家以白水成活字惟津液不死之方藥紅鉛心

蕭子真云一等旁門性好淫慳陽復去保他陰口含天癸稱為尚以慾加沮杜心此言金丹大道惟虛極無采先天裡氣而已且不着沮四大安可處於清質哉若大却病延年未有過於紅鉛者也女子二七天癸至任脉通太衝脈盛月事以時下謂之天癸乃天一所生之水古人用之應全瘡節并女力後皆崇其養陰之力也童女奇經尤為神品女子自受胎以及長成算積五千四百之期即於是日經至更為難得回垂絕之陽有生命之根若三日小足之時未約接命即得服所載精仙是也絕非文構亦非口服故成仙道按服紅鉛而熟者惟童便乳湯可以解之

人溺肺臟物三點清天行狂亂解勞弱遍煩行血而不傷於峻止血而無患其屬吐衄瘧家稱要药擅傷跌仆是仙方。

經云飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通膈水道下輸脾膀胱小便入胃仍尋舊路而出故降火甚速然迫致其真氣尚在其行更泛鍊成秋石直至之氣漸失不及童便矣矣按童便性寒若陽虛無火食不消腸不寒者已之人中白主治與弱相同兼治口舌瘡

金汁如人中黃也止陽毒發狂清豆蔻細研解百毒有妙傳疔腫無虞按傷寒非陽明寒熱痘瘡非生童乾枯均某

人胞丸甘草五錢川芎一錢半細辛一錢半細葛根三錢半細白芍一錢半細補心除煩滋腎理虛劣

崔氏云胎衣宜藏吉方若為虫獸所食令人兒多病此亦銅山西崩洛鍾東應之理蒸煮而食不顧損人長瘡者不忍聞也

天靈益氣丸平崩漏吞膏傳尸成影引羸羸消瘦鬼祟

仲農未嘗收載後世每每用之嗟乎誠相食且人惡之而人相食慘忍極矣必不得已或取年深絕屍氣者然亦不