

百代医宗

四



南京中医药大学图书馆版权所有

開鑽太醫院頒行内外諸科方論百代醫宗卷之四

太醫院醫官 金谿

省吾 淳紳 著述  
振吾 張文英 參訂

金陵 少泉 李潮 刻行

瘧論

夫瘧者曰外感風寒暑溫內傷飲食勞倦或飲食饒飽色慾過度而成也。其始發之時有欠伸戰慄或頭疼渴飲或先熱後寒或先寒後熱或單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少其爲患不一宜審經治之若在足太陽經爲寒瘧法當汗之在足陽明經爲熱瘧法當下之在足少陽經爲風瘧法當和之此三陽受病謂之暴瘧發在夏至之後處暑之前乃傷之淺也其在三陰經者總云濕瘧發在處暑之後冬至之前乃傷之重也其三陰經之瘧發於子午卯酉日者足少陰之瘧也發於寅申巳亥日者足厥陰之瘧也發於戌辰丑未日者足太陰之瘧也其治之法當

發散外邪有汗無汗者要有汗散邪爲主有汗者要無汗正氣爲先然散邪正氣病不見退者必須分利陰陽以柴芩湯最捷又有云風瘧者自感風而得惡風自汗煩燥頭痛轉而爲瘧寒陽氣也故先熱後寒可以解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫瘧一証亦先熱後寒此爲傷寒瘧病與風瘧大畧相同熱多寒少小柴胡湯加官桂寒瘧自感寒而得無汗惡寒掣痛而慘轉而爲瘧寒陰氣也故先寒後熱可以發散寒邪生料五積散倍桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則附子理中湯薑附湯暑瘧者暑勝熱妄得之一名瘧瘧陰氣獨微陽氣獨盛但熱不寒裏實不洩煩渴且嘔肌肉消鍛可用小柴胡湯香薷散嘔者用縮脾飲加生薑煎服濕瘧者冒襲雨濕汗出澡浴得之身體重痛嘔逆腹滿用五苓散除濕湯加蒼朮茯苓薑昇良壯瘧者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而洩悽慄振振宜柴胡桂薑湯減苓芩加以半夏施之爲當食瘧一名

瘡飲食加

飽有傷所致凡

生冷甘肥入於中脘而生瘀轉爲愈

瘡其狀既

能食食則中溝嘔逆腹痛宜用青皮陳皮草果半夏砂

仁白豆蔻作

劑或用四獸湯下紅丸子自有奇功瘡瘍者挾山嵐溪毒

之氣燥濕不當人多瘡瘍其狀血乘上焦令人迷困甚則發躁狂妄亦

有啞不能言此由敗血瘀於心毒涎聚於脾坡僂指爲脾胃實熱所致

須用涼膈疎通大腸小柴胡湯加大黃治瘡瘍木香丸觀音丸主之選

而施用或以截藥而收功其截又不愈者因氣血太虛必當扶胃氣爲

本益瘡之在陰分者難治在陽分者易治瘡之在陰分者又當提起陽

分用升麻柴胡川芎蒼朮之類升起其氣方可用截法所以人之一身

木衛晝行二十五度脊與背也夜行二十五度胸與腹也以其食積痰

飲稽脣胸膈久而膠固致使氣血滯碍或寒而無熱或熱而無寒或無

汗者宜開鬱豁痰爲主用人參養胃湯草果飲子之類以發散爲主或

熱多而寒少或有熱而無寒或有汗者宜清熱補虛爲主宜白虎加桂

枝湯小柴胡湯之類以發散之則用截法須逐一審詳慎不可孟浪也  
柴平湯 治諸瘧神効此方小柴胡合平胃散是也

柴胡

半夏

人參

黃芩

陳皮

厚朴

蒼朮

甘草

右切一劑薑煎宜五更服

清脾飲 治脾瘡脉來弦數寒多熱少或熱多寒少口苦咽乾小便赤

青皮

厚朴各七分

白朮

半夏各一分

黃芩

草果

柴胡一錢

茯苓

甘草五分

右切一劑煎服

有汗加白朮茯苓

渴加知母麥門冬天花粉

熱多加柴胡黃芩

寒多加半夏草果

人參養胃湯

治久瘧虛瘧或間一日一發或三五日一發寒多熱少

人參

一錢

半夏

八分

陳皮

八分

甘草

五分

茯苓

八分

藿香

一錢

厚朴

八分

蒼术

八分

草果

七分

烏梅

一枚

右切一劑薑棗前宜通口進之忌生冷

草果飲

治寒熱之瘧初愈宜服此進食理脾

紫蘇

草果

良薑

炒各等分

川芎

青皮

甘草

陳皮

白芷

各等分

右切一劑煎服

白虎桂枝湯

治濕瘡

知母

四錢

甘草

一錢

石膏

二錢

桂枝

二錢

糯米

一錢

右切一劑宜先煎米

祛瘡飲

治瘡熱多寒少

前胡

半夏

各三兩

柴胡

兩

各四

桂心

桔梗

各二兩

厚朴

右切每服一兩薑棗前進

四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發爲瘧疾

人參

白朮

茯苓

陳皮

草果

半夏

紅棗

生薑

烏梅肉

各等甘草三分

右切一劑宜未發前進藥

散邪湯

治瘧無汗當發汗散邪爲主

川芎

五分

白芷八分

麻黃

五分

白芍八分

防風八分

荆芥

八分

紫蘓

五分

羌活

五分

甘草一分

右切一劑薑煎露一宿次早溫服

有痰加南星陳皮

濕加蒼朮

夾食加香附

正氣湯

治瘧有汗當止汗正氣爲先

柴胡

六分

前胡

六分

川芎

三分

白芷

六分

半夏

八分

麥門冬

八分

檳榔

七分

草果

七分

青皮

七分

茯苓

七分

桂枝

五分

甘草

一分

右切一劑薑裹煎服

柴芩湯

治瘧分利陰陽和解表裏

柴胡

六分

黃芩

七分

人參

七分

半夏

七分

甘草

一分

猪苓

六分

澤瀉

六分

白朮

七分

茯苓

七分

肉桂

五分

右切一劑薑裹煎服

無汗者加麻黃

有汗者加桂枝

寒多者加官桂

熱多者加黃芩

紅丸子

治食瘧食積氣滯腹脹

三棱

二兩

莪朶

青皮

陳皮

各五兩

胡椒

一兩

乾薑

二兩

右爲末醱煮米粉丸梧桐子大篆紅爲衣每服五十九丸用二陳湯下四

獸湯任下

木香治瘧丸



牽牛一斤

瓦頭末  
商房包  
藥用

檳榔

陳皮各一兩

青木香

人參

三稜

羌活

獨活

甘草

川芎

大黃

白芍

肉豆蔻

炮

右爲末磁器密封臨用審牽牛末一兩諸藥末共一兩研和煉密爲丸梧桐子大每服二十九丸陳皮湯下以通利爲度

觀音丸 耳下暑毒瘴毒

圓白半夏

生用  
十枚

烏梅肉

十  
枚

母丁香

十  
枝

巴豆

不去油  
十枚

右爲末薑湯和麵丸麻子大上下用厚絲盛益貼住一處見絲上下有油且易之於繙暗病所用每服五丸臨卧冷水下如神瓦効此方有一舟人於海角遇一白衣人授之

紳擬是

白衣觀鑒畱下此方救人苦難焚香錄之

不二飲 治一切新久寒熱瘧疾一服截之如神

常山

二錢

檳榔

一雄

知母

二錢

貝母

二錢

右切每用六錢酒煎不可過熟熟則不効露一夕臨發日五更溫服

鮮魚休令婦女煎藥

瘡靈丹截瘡神効

五月五日午時用雄黑豆四十九粒先一日以水泡去皮研細入人言末一錢同搗爲丸如小梧桐子大雄黃一錢爲衣陰乾收貯臨發日早晨面東向用無根水送下一丸忌熱物仍忌鱼腥生冷三日其雄黑豆者取其豆之圓者是雄之名也

神効飲子 治諸瘡神効

肉豆蔻

二個  
生用一  
錢

草果

二個  
生用一  
錢

厚朴

三寸  
生用一  
錢

甘草

二寸  
生用一  
寸

生薑

一  
錢  
生用一  
寸

石切一劑五更服不效再進二服

截瘡丹

雄黃

一兩

人參

五錢

右爲末端午日粽尖丸梧桐子大每服三丸。發日面向東井花水送  
下忌諸熱味

痢論方

夫痢之爲病是濕熱食積三者之所致也古人云無積不作痢信斯言乎有赤有白有赤白相兼者有身熱後重者有腹痛下血者腹痛者因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之後用痢藥後重者積與氣墜下本當利氣兼升兼消之法保和丸木香檳榔丸之類甚者用大黃走而不守之性推蕩之又有發熱不止者屬陰虛用寒涼之藥必兼溫升之劑其下血者宜涼血活血當歸黃芩之類有風邪下陷者宜升提之益風傷肝肝主血故也有濕傷血者行血清熱爲主其赤痢者屬血因濕熱傷於血分故作痢爲赤其白痢者屬氣因濕熱傷於氣分故作痢爲白其赤白相兼者氣血俱傷者食積也黑者濕勝也蓋白者屬氣分自大腸而來赤者屬血分自小腸而來一皆濕熱爲病何嘗以白痢爲寒

赤廁爲熱耶况下迫窘痛小便赤澀而作白廁爲熱明矣其作廁之初元氣未虛必當推蕩之此通因通用之法大承氣湯調胃承氣湯下之再詳氣病血病而用藥焉氣虛用人參白朮血虛用四物湯經五六日者未可遽下恐脾胃氣虛之故如壯實者尤可下之不可熱而論河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除後重宜下腹痛宜和身重則除濕脉弦則去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗脈沉小者以熱藥溫之世有用辛熱之藥而愈者蓋辛熱有發散開鬱之義故廁輕者則鬱結開通氣和而愈者有之矣廁之重者鬱結不開其病反劇而久不可也以辛熱之藥爲式故善治者必用寒以勝熱苦以燥濕微以辛熱佐之可也以爲發散開通之意前所云元氣未虛以推蕩爲要久廁之作脾胃氣衰當行升散消導爲主所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血爲本又有廁久挾虛者又當補血收澀滑脫甘溫之藥兼用濕熱傷氣成白廁者宜調氣理濕兼乎清熱之藥濕熱傷血成

赤痢者宜涼血清熱兼理乎濕也氣血俱傷而成赤白痢者相兼前二法而治丹溪曰痢疾乃外感內傷之候須分表裏治之在表者必惡寒發熱身首俱痛宜用小柴胡湯去人參棗子加蒼朮陳皮川芎芍藥桂汗以散之在裏者必後重窘迫腹痛有積宜以大小承氣湯下之餘邪未盡更以芍藥湯香連丸之類以徹其邪穢積已盡而滑脫不止者此大腸不行收令宜以固腸丸以止之丹溪又曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎尅我爲賊邪難愈先膿血而後水瀉者此腎傳脾尅邪易愈脈經曰微小沉者生浮洪數者死不可不察也又有一等噤口不進飲食者雖曰脾虛亦因熱氣閉塞胸膈胃口不開之所致也俗用木香則失之溫用山藥則失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲末陳倉米湯調下或加人參白朮苓石蓮肉菖蒲末與之胸次一開自然思食何噤口之有哉大凡下痢純紅者如塵腐水者如屋漏水者大孔如竹筒者唇如硃紅者俱死証也爲醫者須用心焉毋得因循視爲小病耳

參苓白

治脾胃虛弱飲食不進嘔吐瀉痢補助脾胃極効

白朮

白茯苓

山藥

白扁豆

甘草

桔梗

薏苡仁

石蓮肉

以上各一兩

右爲末每服二錢陳米湯送下

噤口痢方

家傳驗過

石蓮肉末

石菖蒲一兩

有氣加木香

右爲末每服三錢棗湯或粳米湯調下

休息痢者砂糖調下一方加砂仁一兩

青六丸

治血痢神効

六一散一兩加紅麪五錢是青六丸也

右研麪糊爲丸如梧桐子大每服八十九茶清送下

溫六丸

治痢及水瀉皆効

六一散加乾薑五錢是溫六丸也

右爲末打糊爲丸每服六十九茶



清送下

芍藥湯 行血則便膿自愈 和氣則後重自除 是也

白芍

二錢

當歸尾

黃連

黃芩

各一錢

大黃

七分

甘草

檀柳

木香

桂心

各五分

右切一劑煎服

後重者迫甚者倍大黃芒硝 痘滿加枳實 腸毒下血加黃柏  
益元散 治痢之聖藥

滑石

六兩水米

粉甘草

一兩

右爲末用井花水調下

神効三香散 治痢日久穢積已盡腹中微痛無窘迫証有滑瀦不止此  
乃收功之後藥也

栗壳

去殼醋煮一兩

陳皮

一兩

肉豆蔻

煨

茯苓

一兩

扁豆

炒各四錢

木香

五分一錢

右爲末每服一錢五分食遠清米飲下

固腸

下泄

樗根白皮

胃臭樗不拘  
多少切

右爲細末米糊丸梧桐子大每服五十九白朮湯送下

祖傳和中飲 治痢不分赤白新久無不應効但發熱噤口者不可進此

陳皮

白朮

茯苓

白芍

草果

甘草

倉米

陳者二錢用

砂糖

三錢

栗壳

醋煮一錢五分

烏梅

一枚

右切一劑薑棗煎服

斷下湯 治赤白痢

茯苓

白朮

甘草

五分

草果

連皮半個

栗壳

七個去核切開浸酒

木香

五分

烏梅

二枚用肉

右切一劑薑棗煎服

治痢保方

丁香

沉香

木香

白术

白芷

白茯苓

白芍

甘草

枳壳

柯子

地榆

石榴皮

厚朴

半夏

陳皮

右各一錢分作五服白加生薑煎赤加烏梅煎食前服

噤口痢神效名曰石蓮散

石蓮肉不拘多少去壳心爲末每月二錢陳倉米調服多進瓦効  
經驗三根飲治休息痢年久者其効如神

五倍木根

蒼耳草根

臭樗木根

俱瓦皮各等分

右切每服七錢薑棗黑豆三十六粒糯米四十九粒煎服

香連丸治下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連

二十兩吳茱萸十兩同炒去茱萸用黃連

木香

四兩八錢不見火

右爲末醋糊丸梧桐子大每服三十九米湯送下一方加石蓮肉