

疝 痲

同淋附胞癰

遺精

赤白濁

陰痿

附陰硬 陰縮 陰

陰汗臊臭 陰瘡

陰腫

附陰吹

痔

附行癰

著癰

痛癰

金匱啟鑰 第八冊

瀛江黃朝坊妙山輯著

金匱啟鑰卷八

澆江黃朝坊妙山輯著

麻論 附胞痺

嘗觀病源候論。謂麻之作。由腎虛而膀胱熱也。膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸與胞。行於陰則爲溲便。若飲食不節。喜怒不時。虛寒不調。臟腑不和。致腎虛而膀胱熱。腎虛則小便數。膀胱熱則下水澀。數而且澀。故謂之麻。其狀小腹弦急。痛引於臍。小便出少而數。乃分石麻、勞麻、血麻、氣麻、膏麻、冷麻等候。夫石麻有如沙石。勞麻者勞倦卽發。血麻者心主血。氣通小腸。熱甚則搏於血脈。血得熱則流行入

於胞中。與漚俱下。故爲痲也。膏痲者。肥掖若脂膏。又名肉痲。氣痲者。胞內氣脹。小腹脹滿。出少喜數。尿有餘瀝。冷痲者。冷氣客於下焦。邪正交爭。滿於胞內。水道不宣。先寒戰而後病數成痲。考之內經。又不止此。大綱有二。曰濕。曰熱。謂太陰初作氣病。中熱腸脹。脾受積濕之氣。小便黃赤。甚則痲。少陽作二氣。風火鬱於上而熱。其病痲。且五臟六腑十二經脈。氣皆相通相移。故足太陽主表。上行則統諸陽之氣。下行則入膀胱。又肺者通調水道。下輸膀胱。脾胃消化水穀。或在表在上在中。凡有熱。則水液俱熱。轉輸下之。然後膀胱得之而熱矣。小

者以其小腸熱遂胞受其熱經所謂胞移熱於膀胱者則癰瀝血者
是也。由此而言。初起之熱不一。其因皆得傳於膀胱而成痲。若不治
其所起之本。但從末流胞中之熱施治。未爲善也。更有人服金石藥
者。入房太甚。敗精流入胞中。及飲食痰積滲入者。亦皆成痲。丹溪嘗
治一小兒。在胎久服金石之餘。痲病痲一十五載。以紫雪治愈。由此
觀之。凡治病不求其本可乎。是故小便澁痛。常急欲溺。及去点滴。莖
中痛不可忍。此痲病。以生料五苓散。加阿膠。或車前子末。或五苓散。
益元散等分和服。並可吞火府丹。佐以導赤散。石葦散。若熱極成痲。
服藥不效者。宜減桂五苓散。加木通。滑石。燈心。瞿麥各少許。仍研麥

門冬草連根。用車前草、白龍草各取自然汁。和蜜水調下。氣麻、氣壅、不通、小便麻結、臍下悶痛、瞿麥湯、石葦散、榆枝湯、木香流氣飲、氣虛麻者、八珍湯加杜仲、牛膝、黃芩汁煎服。老人氣虛亦作麻。參朮中加木通、山枝、血麻用側柏葉、生藕節、車前草等分搗汁調益元散立效。散瞿麥散、小薊飲子、柿蒂散、當歸湯、羚羊角散、雞蘇飲子、金黃散、髮灰散。隨宜擇用。戴氏云：血麻一証須看血色。分冷熱。色鮮者是心與小腸寔熱。色瘀者是腎與膀胱虛冷。若的是冷麻及下元虛冷。血色紫者並宜漢椒根剉碎以白水煎候冷服。按血麻多有熱極化水而

作麻牛膝膏妙千金云用牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛
及治婦人血積堅痛如神但虛人當用補葯監制之不然恐損胃耳
膏麻鹿角霜丸沉香散沉香丸磁石丸海金沙散兔絲子丸戴云有
似麻非麻小便色如米泔或便中有如鼻涕之狀此乃精溺俱出精
塞溺道故便欲出不能而痛宜大兔絲子丸鹿茸丸之類按此卽膏
麻也沙石麻乃是膀胱蓄熱而成正如湯瓶久在火中底結白而不
能去理宜清徹積熱以神效琥珀散如聖散石燕丸獨聖散石首煎
雄鵲燒灰取汁飲之石卽下有石麻其氣上攻頭面腫痛重則四肢
八節俱腫其石大如梅核堅硬如有稜角石小者碎石相連宜服取

石方劫石散。導水丹。勞瘵地黃丸。黃芪湯。白芍藥丸。冷麻肉。從蓉丸。
澤瀉散。沉香散。檳榔散。生附散。戴氏云。進冷劑愈甚者。此是熱麻。宜
地髓湯。下八味丸。有因服五苓散不效。用生料鹿茸丸却愈。此皆下
元虛冷之故。乃河間則謂亦由熱客膀胱。非真冷也。小便麻。莖中痛。
相引脇下痛。宜參苓琥珀湯。有小便如麻。不痛而癢者。虛証也。宜八
味丸。生料鹿茸丸之類。若因思慮過度。致麻者。宜歸脾湯。或神砂妙
香散。吞威靈丸。或妙香合五苓散。汗多而小便赤澀。暑月多有此証。
亦宜五苓散。虛勞汗多而赤澀者。是五內枯燥。宜十全大補湯。養營

宣前法治之仕材三書云按五痲極難見效惟用生牛膝一兩人乳
香少許水煎連進數劑即安但滑發遺精者在所當禁景岳云痲之
爲病小便痛澁滴瀝是亦便濁之類但濁出於暫久不已則爲痲証
其証嚴氏有五痲之辨曰氣石血膏勞也氣痲病小便澁常有餘瀝
石痲莖中痛溺如沙石不得卒出膏痲溺如膏出勞痲者勞倦即發
痛引氣衝血痲遇熱即發甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大
抵此証多由心腎不交積蘊熱毒或酒后房勞服食燥熱七情鬱結
所致然痲之初病無不由乎熱劇但有久服寒涼而不愈者又有痲
久痛澁皆去而膏液不已痲如白濁者此中氣下陷命門不固之証

故以脈以証察其爲寒爲熱爲虛爲不致有誤如熱蓄膀胱熱甚而或痛或澀者必當專去其火宜先用抽薪飲大分清飲七正散之類若小水不利而煩熱難解者惟綠豆飲最妙若兼大便燥結者宜八正散若微熱不甚或熱勢稍退者宜加減一陰煎或導赤散清心蓮子飲火府丹若小水不利者宜清肺飲子至之若溺白証凡如泔如漿者亦多屬膀胱水道之熱宜導赤散徒薪飲之類若無內熱而溺白者多由飲食濕滯宜小分清飲或苓朮二陳煎減去乾薑大抵濕在脾胃或在膀胱者宜二陳湯半下丸或固元丹之類皆可擇用若

丹以固之。有痰在精分者。必因相火妄動。或逆精而然。以至精竭。正至者。若兼澀痛之甚者。亦宜抽薪飲。大分清飲之類。先去其火。然後再安精氣。若已久而痛澀俱去。惟精濁不止者。當用寧神清心固腎等劑。秘元煎。菟絲煎。或人參丸。定志丸。若命門虛寒不固。則精濁時見而久不愈者。宜右歸丸。八味地黃丸。益智湯。右刻安腎丸之類。若虛不甚。胞氣微寒者。宜革薺分清飲。主之。大抵血淋。若在男子。凡血來不痛者。及爲溺血之來而痛者。卽爲血淋。無非逆血証耳。治俱詳血証門。惟婦人之血淋。多由衝任經脈之病。與男子不同。婦人門有正條。茲不贅列。**血淋**。抑有胞癰。何爲者。小腹膀胱按之內痛。若沃以湯。

澀於小便。上爲清涕。夫膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今風寒濕邪。氣客於胞中。則氣不能化出。故胞滿而水道不通。則澀於小便。以足太陰經其直行上交。頭入絡腦。下灌鼻竅。則爲清涕也。宜腎著湯。茯苓丸。巴戟丸。腎瀝湯。治者須詳察之。

証治歌

痲由腎虛膀胱熱。腎虛小便數無疑。膀胱熱則水下澀。小腹弦急痛引臍。石膏勞血氣與冷。六証皆由濕熱罹。試爲詳辨分門治。因時變化莫差池。搗治便澀痛難忍。生料五苓散。阿膠宜。益元散。車前子。五

風痲治不效。滅桂五苓。木通。石需。燭心。畢麥各少許。麥。

白龍草和蜜飴。分治諸痲。原有法。更詳証治。為君。披氣痲。便結臍下。

痛瞿麥。湯石葦。散合榆枝。湯或用木香流氣飲。氣虛湯用八珍奇杜。

仲牛膝黃芩汁。加入濃煎。服一卮。若是老人氣虛病。參朮木通與山。

枝。血痲側柏生藕節。車前。草均取汁。痲滴。調下益元。散當立效。散瞿。

麥。散小薊。飲子合當歸。湯雞蘇。飲子羚羊角。飲金黃散與髮灰。散隨。

血有瘀鮮。分冷熱。痲用椒根白水施。血傷宜補兼行血。若作痲治定。

多危。死血作痲。牛膝。膏美。或用。牛膝根莖葉酒醱。治痲並治婦人血。

積。虛人傷胃補相依。膏痲鹿角。霜九兼磁石。九沉香九散與兔絲。九子。

全書卷八 痲

或用海金砂散妙。醫人須善用心機。似痲非痲。米泔色。狀如鼻涕。便
中羈此精與溺而俱出。大龜絲。九鹿茸。九治石痲。熱蓄而成病。神效
琥珀散。石燕。九棲獨聖散。石首煎。功如聖。散雄雀燒灰。莫笑癡。石痲
取石兼劫石。丹投導水。莫遲遲。癰地黃。九最好。九投芍藥。復黃芪。
湯肉菴蓉。九能治冷。沉香散。澤瀉散。莫相離。生附散。與檳榔散。冷藥
無功。熱可知。地髓湯。吞九入味。五苓散。不效。生料鹿茸。九醫苦痛。宜
參苓琥珀。湯不痛而癢。必多虧。生料鹿茸。九入味。九古人治法。不予
欺。過慮。威喜。九五苓妙。吞以辰砂。妙香散。或歸脾。湯暑月。汗多便澀。

赤。五苓散。治瘕。幾虛。勢干。冬小更。赤。上合。人。有。易。易。

便赤同法治。仕材摠治亦無訾。五淋須用生牛膝。少入乳香可轉秘。

更考景岳治淋法。辨清寒熱或虛疲。熱甚痛澀專去火。抽薪飲大分。

清飲七正散。齊順。便燥結入正散。資微熱加減一。

陰煎或導赤散。陰煎。小水不利清肺飲。子溺白。

導赤散。徒薪煎。分清飲。蒼朮二陳湯。亦良規。濕在膀。

眇合脾胃二陳湯。半夏丸。固元丹。基液濁秘元煎。可用水陸二仙丹。

莫辭精溺並至抽薪飲。大分清飲古方垂。精濁不止秘元煎。合兔絲。

煎人參丸。定志丸。怡命門虛寒右歸丸。治八味地黃丸。解頤益腎湯。

安腎丸。皆堪選斟酌。而施路莫歧。胞氣微寒何以治。草薢分清飲主。

之抑有胞痺須分別邪淫胞中氣不嬉治宜腎着

湯

或巴戟

丸

茯苓

腎瀝湯

法毋遺

脈

少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣痲盛大而寔者生虛小而澁者死下焦氣血乾者死鼻頭色黃者小便難

方

紫雪

治內外煩熱不解狂易叫走發斑發黃口瘡脚氣瘡毒蠱毒

蕪毒及小兒驚癇

民水

石膏

滑石

磁石

水煎三斤搗煎

十味

元香

元參片 麥冬心 犀角 桑螵蛸 杜仲 薑水炒 桔梗

前藥汁中煎 朴硝 硝石 各二斤提淨入前藥汁中微火煎

去渣入後藥 辰砂 研細 射香 兩二斤初細

後藥 辰砂 研細 射香 兩二斤初細

右合成退火氣冷水調服一二錢

腎懸湯

麥冬心 五加皮 犀角 桑螵蛸 杜仲 薑水炒 桔梗

赤芍 木通 各一 桑螵蛸 各一

右藥入羊腎少許水煎食前服

蒼朮二陳煎 治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等証

全書文編 卷八 蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

猪苓

半

白朮

三

澤瀉

半

陳皮

一

法夏

二

茯苓

半

炙草

八分

乾薑

二

右水煎服如肝腎兼寒者加肉桂一二

瞿麥湯

瞿麥穗

黃連

大黃

蒸

只壳

去瓢炒

當歸

羌活

木通

牽牛

玄胡

桔梗

大腹皮

射干

各一兩半

桂心

五

右每服四錢薑七片水煎不拘時溫服

石葦散