

孫23
825

內科新說

統清貞



南京中医药大学图书馆版权所有

序

余自道光己亥來中土施診今已二十年療治病證歲以萬計略悉華人體質且知西國醫理有足訂中土之謬者因著全體新論略言其概書中所述每與中土歧異然華人頗有信者蓋確實有據之理人無異辭也近歲來上海因華友管茂才喜談醫學遂與商酌復著西醫略論婦嬰新說及內科新說三書皆發明全體新論以廣其用內科新說所論審證用藥之法皆取歐羅巴醫書擇其要議譯以唐文適余將返英國再來之期未能豫定西人在滬貿易者取余前後所著各書彙印千本廣爲流布方今中外一家共敦和好學問技藝互相

師教我西國苟有裨益中土之事無所秘惜醫學其一
端也至此書要旨讀者觀例言自見云是爲序

咸豐八年歲次戊午十月合信氏識於上海仁濟醫院



南京中医药大学图书馆版权所有

內科新說例言

一中土醫書有同一病源見證小異別立病名者徒亂人意今以臟腑爲綱領較有端緒

一分卷之意上卷專論病證下卷備載方劑藥品

一分篇之意先總論次血次臟腑各病證悉以類從如水證熱證黃證瘡證皆全體累血病故篇第相連頭痛癲狂皆腦病故篇第相連勞證欬嗽皆肺病故篇第相連餘可類推此外有已詳西醫略論者如腦炎中風癱瘓之類今不更述

一藥劑以中土所產爲主有必須備用而中土所無者間用番藥以補中土之不及但番藥品味甚多不能詳述今所選用皆易購之品近日上海粵東各港口有番藥房華人購買甚易或有相識番友託其寄資至泰西購致價尤廉也本館另刊醫學英華字譯所列藥名皆各港番藥房現有者華人不難據此指買也

一泰西權量與中土不同、今皆改從中土、概用兩錢分釐字樣、以免舛誤、惟中國權衡不及西國製造靈活、用以試秤釐毫、每多不準、洋製小天平、專爲醫家稱藥之用、價不甚昂、所宜購備也。

一身體、病證、方劑、藥品、皆用中土醫書名稱、欲便華人解識也、間有中土醫書所無、或名實不符者、不得不用西國名稱、仍用華文、或譯取其意、或譯取其聲、閱者詳之。

一諸篇每多互相發明、讀者須通閱全書、方能融貫、或別詳全體新論、西醫略論、婦嬰新說、須合數書參觀、泰西醫理及治療之法、雖不全備、然亦略見梗概矣。

一西國藥品、經歷代醫士、愈講愈明、故後代本草、精過古昔、此書所述、係近年西國通行之本、皆屢經試用、確有效驗、所望中國醫官知古昔本草、不盡可憑、或免墨守貽誤、

一此書所述藥劑皆取用新美真材故分兩輕而效驗速每見市販藥材以僞亂真更多陳朽霉蛀毫無功力雖多服亦未必取效此醫者病者所當知也

一病有宜緩治者則藥應少服多次有宜急治者則藥應一次多服又散末精製功力大概勝過藥水平日須講明此理臨證確有把握勿因一服不應遽思改投他藥也

一余著書之意欲使泰西醫學流傳中土故於字句同異藥劑輕重斟酌詳審不肯苟且誤人觀者諒之

內科新說目錄

卷上

總論病原及治法

血運行論

炎證論

水證論

發黃證論

頭痛

心病證論

勞證

胃病證論

肝膽病證論

論飲食消化之理
醫理雜述

血證論

熱證論

瘡證論

癲狂

肺病證論

欬血

吐血

小腸病腹痛論



南京中医药大学图书馆版权所有

痢證論

大便秘結論

蛔蟲論

卷下

東西本草錄要

藥劑	補劑	收斂之劑	補火之劑	之發表之小兒
藥品	酸 明	收斂 散	之補	之小兒
明	水 粉	之割	火 之發	暖胃之劑
水 粉	蘇 角	之去	之剷	瀉胃之劑
蘇 角	金 石	疾 之去	表皮	之潤皮
金 石	木 油	之法	之強	之潤皮
木 油	元 油	之法	氣	之潤皮
元 油	明 脂	之去	水	之潤皮
明 脂	檣 櫟	疾 之去	之潤	之潤皮
檣 櫟	嫩 嫩	之法	之潤	之潤皮
嫩 嫩	哪 哪	之法	之潤	之潤皮
哪 哪	松 松	之去	之潤	之潤皮
松 松	花 花	疾 之去	之潤	之潤皮
花 花	巴 白	之法	之潤	之潤皮
巴 白	豆 豆	之法	之潤	之潤皮
豆 豆	野 菊	之去	之潤	之潤皮
野 菊	麻 麻	疾 之去	之潤	之潤皮
麻 麻	花 花	之法	之潤	之潤皮
花 花	尤 尤	之去	之潤	之潤皮
尤 尤	草 草	疾 之去	之潤	之潤皮
草 草	荷 荷	之法	之潤	之潤皮
荷 荷	石 石	之去	之潤	之潤皮
石 石	蜜 蜜	疾 之去	之潤	之潤皮
蜜 蜜	油 油	之法	之潤	之潤皮
油 油	沒 沒	之去	之潤	之潤皮
沒 沒	子 子	疾 之去	之潤	之潤皮
子 子	丁 丁	之法	之潤	之潤皮
丁 丁	大 大	之去	之潤	之潤皮
大 大	嘴 嘴	疾 之去	之潤	之潤皮
嘴 嘴	乳 乳	之法	之潤	之潤皮
乳 乳	黃 黃	之去	之潤	之潤皮
黃 黃	嘶 嘶	疾 之去	之潤	之潤皮
嘶 嘶	香 香	之法	之潤	之潤皮
香 香	沒 沒	之去	之潤	之潤皮
沒 沒	桂 桂	疾 之去	之潤	之潤皮
桂 桂	茶 茶	之法	之潤	之潤皮
茶 茶	醉 醉	之去	之潤	之潤皮
醉 醉	橄 橄	疾 之去	之潤	之潤皮
橄 橄	仙 仙	之法	之潤	之潤皮
仙 仙	煙 煙	之去	之潤	之潤皮
煙 煙	糖 糖	疾 之去	之潤	之潤皮
糖 糖	魏 魏	之法	之潤	之潤皮
魏 魏	白 白	之去	之潤	之潤皮
白 白	水 水	疾 之去	之潤	之潤皮
水 水	桃 桃	之法	之潤	之潤皮
桃 桃	油 油	之去	之潤	之潤皮
油 油	草 草	疾 之去	之潤	之潤皮
草 草	攀 攀	之法	之潤	之潤皮
攀 攀	大 大	之去	之潤	之潤皮
大 大	椒 椒	疾 之去	之潤	之潤皮
椒 椒	大 大	之法	之潤	之潤皮
大 大	鹹 鹹	之去	之潤	之潤皮
鹹 鹹	茯 茯	疾 之去	之潤	之潤皮
茯 茯	黃 黃	之法	之潤	之潤皮
黃 黃	斑 斑	之去	之潤	之潤皮
斑 斑	樟 樟	疾 之去	之潤	之潤皮
樟 樟	麥 麥	之法	之潤	之潤皮
麥 麥	石 石	之去	之潤	之潤皮
石 石	朴 朴	疾 之去	之潤	之潤皮
朴 朴	芥 芥	之法	之潤	之潤皮
芥 芥	連 連	之去	之潤	之潤皮
連 連	蟹 蟹	疾 之去	之潤	之潤皮
蟹 蟹	腦 腦	之法	之潤	之潤皮
腦 腦	生 生	之去	之潤	之潤皮
生 生	冰 冰	疾 之去	之潤	之潤皮
冰 冰	粉 粉	之法	之潤	之潤皮
粉 粉	硝 硝	之去	之潤	之潤皮
硝 硝	臺 臺	疾 之去	之潤	之潤皮
臺 臺	慧 慧	之法	之潤	之潤皮
慧 慧	兒 兒	之去	之潤	之潤皮
兒 兒	嚙 嚙	疾 之去	之潤	之潤皮
嚙 嚙	齷 齷	之法	之潤	之潤皮
齷 齷	腮 腮	之去	之潤	之潤皮

瀉泄論

霍亂證論

腎病證論



中國藥大學圖書館版權所有

內科新說卷上

英國醫士合信氏著

江甯管茂材同撰

總論病原及治法

中土醫書方論浩繁、有一病而列方數十者、有一方而藥品十餘味者、有
臆造病證、妄列治法、而實爲理之所無者、每論一病、必浮舉陰陽五行、纏
繞不休、每用一藥、必以色香形味、分配臟腑、更或高談脈理、妄事神巫、臟
腑功用、茫然不知、甚矣醫學之衰也、蓋中土風俗、平日視醫學爲末技、待
醫士如曠工、及病時則又倚之太切、責之太厚、服藥偶效、則曰、此神醫也、
一服不應、則曰、此醫者之過也、因此醫者虛偽巧飾、心愈勞而術愈拙、羅
列十數味平淡無功力之藥、遇病輒投、以期無咎無譽、有矜奇自表者、略
用猛力之藥、則爲害更甚、總由不識病原、以病試藥、非能以藥治病也、嘗
試論之、醫之功能有三、一識致病之故、令人於未病時、防護禁戒、可以免



病所謂上工治未病也。二審察病狀，確知受病之處，取用良法，變通施治，期以奏效而止。三病有不能療治者，設法減其病勢，使病者安然無所患苦。此醫者本分事也。受病之故，非一端可竟。今略舉數條，以見梗概。一因身體虛弱，虛弱之故，或因食物少，或因失臥，或因房勞，或因汗出太多，或因情志不遂，或病後失調，或水土不合，或居室過密，不通風氣，或不通光，或光太濃，皆能令身虛弱。二因感受寒暑，或觸冒東風，或爲戶牖縫中冷風所襲，或居穢溼之地，或本體電氣爲外熱所引。雷將作時人每無精神以此故也皆能致病。三因飲食不合，蓋飲食精液，由吸管遞運化血，運養身體，食少則血弱，或食物不合，或食時無定，皆能致病。四因勞心過多，如思慮經營，或讀書過久，皆是。五因外傷，如傾壓跌打，湯火刀刃諸傷，皆是。六因中毒，或誤食毒物，及服信石水銀等毒藥入胃，或癩狗蛇蟲之毒吮噬皮肉，或腐草朽木諸物霉爛化氣有毒，傳染於人，皆能令毒氣入血致病。七因臟腑有

病互相牽累、如胃不消化、則心跳腦不安、肝病則累胃、肺病則累血、腦病則累各部位之類。

治病有三法、一審其致病之由、令改變習氣、如因於房勞者、使之節慾、因於胃不消化者、使之戒口、因於屋宇狹暗、不通風氣者、使之開通戶牖、因於愁鬱者、使之暢遂、他如鼓琴可以怡情、飄藥可以補腦、呼叫可以醒迷、皆良醫妙用也、二、外治法、如放血、蜞吮、按摩、熨貼、釣膿之類、三、藥法、或發汗、或令吐瀉、或利小便、或潤臟腑內皮、或令安臥、或開胃補胃、或補精神、補血、或收斂、或瀉血、婦人或調經、或助子宮收縮、令兒易產下、其法不一、但醫者須知一病有一病治法、一藥有一藥功用、某藥治某病、屢試必效者、僅十數種耳、病在內部、變化多端、即使藥劑對症、未必一投輒應、原不能如醫治瘡瘍折骨等症、確有把握、中土醫書、每病必列一定方藥、宜乎、臨證不驗也。

論飲食消化之理

造化主造萬物，靈奇莫如人。變化亦莫如人。試觀大地終古圓轉，不生不死，塊然成形耳。植物有生死矣，然無所知覺，不能運動。禽獸蟲介，能行動矣，有知覺矣。然一物止一用，如蠶止能作繭，蜂止能釀蜜，鳥雀止能結巢。牛馬止能負重之類，惟人靈性全備，自生至死，知識愈增，愈展，能事愈習，愈多，聰明技巧，不可限量。蓋腦爲靈魂之器，耳目口鼻爲靈魂出入之門，人有靈魂，故能聰明技巧。靈魂有門出入，故能四通八達，推廣擴充也。就人形體而論，則飲食爲最要。一身精血，日有消耗，全賴飲食精液補其缺乏。人生二十年以前，身體日增日長，故食量亦大。壯年經營勞慮，不覺疲倦者，因食物所補，足以償其所耗也。五十以後，則胃經消化功用漸減，日食多而耗少，則肥；食少而耗多，則瘦。所食適償其所耗，則不肥不瘦。試觀

病人胃不消化肥者倏忽即瘦可知肥瘦係乎飲食也。有飲食不減而亦瘦者大概汗溺瀉泄太多之故耳。凡食物入口齒牙咀嚼六核出津液以勻和之用舌卷制遞至喉嚨吞入後人卽不能自主胃之上口曰費門。食物由費門而入胃中胃卽舒縮擁動以勻轉食物使近胃津胃津者胃週圍小穴所生津液主消化食物者也。食物經胃津融和後略似濃粥卽出胃之下口名幽門。至小腸頭與膽汁甜肉汁會合榨出精液衆液管吸之於總液管運至頸會管卽混爲血小腸下口大腸上迴與之橫接者曰關門。食物經過關門後在大腸上中兩迴時猶有液管吸其餘液及抵下迴則精液竭盡但存渣滓矣此食入於胃化血化糞之理也。飲入於胃卽有微絲血管多條吸入迴血管過肝入心運行周身由肺升出爲汽由皮膚滲出爲汗由微絲血管導入內腎復有微絲管攝入溺管匯達溺囊經溺水總管斜入膀胱此爲汽爲汗爲溺之理也是故胃無津液不能消化食

物胃無食物則亦不生津液且助消食物者非獨胃津也未入胃以前則有口津既出胃以後則有膽汁甜肉汁皆必不可少者但消化之功畢竟專屬於胃耳凡食物易消化者惟肉熟肉之法三置水瓶內以火熟之曰煮專用火燔炙曰燒置斧內以油熟之曰煎論入胃後消化難易又以煮爲易煎爲難也肉在胃內即消化已盡蔬菜有時入小腸而後消化故知肉消化易過蔬菜也凡人食物太多太少或食時經營思慮或食後辛勞太急或殗飯不時皆有妨於消化不可不知

血運行論

人身最要者無過於血血發源於心左下房上入總管散佈小支愈分愈多愈多愈微名之曰微絲血管通行偏體其色赤人身精津液汗溺膽汁無不賴之以生迨由微絲管尾通於迴血管其色頓變爲紫其性有毒中
有炭氣故也於是返入迴血總管抵心右上房轉落右下房上入於肺呼

出炭氣、吸入養氣、復變爲赤、迴心左上房、卽落左下房、往來如環、晝夜不息、心之功專主運行衆血、其用有二、一逼赤血流佈周身、一逼迴血、土入於肺、改換毒氣、上下左右四房、此舒則彼縮、其出入之數、互相盈縮、每房恒以七八錢爲率、兩房常存之血、共重一兩六錢、全身血多少、視體之壯弱、男多過女、大概十斤至二十斤、多或二十五斤爲度、血之質重於水、設水重一千、血重一千五十五爲率、其熱當比寒暑鍼九十六度、若患熱證、則有多至一百四度者、其在管內流佈運行、不結不實、若運行不如常度、則其人身體有病矣、若夫氣管呼吸之用、則專屬於肺、蓋肺體中管竅甚多、纏絡如網、匯爲左右二管、合爲氣喉、每管之末、皆有氣胞、紫血入肺、運至氣胞、炭氣散洩、氣管遞出、是爲一呼、養氣遞入抵胞內、血隨攝之、是爲一吸、西醫細較、每一晉眠、吸入生氣十八筒、管大小以容水十二兩爲度
生氣者合養氣淡氣而名

之也設百分計之養氣
二十一談氣七十九

呼出毒氣亦如之、計一晝夜一千四百四十晉眠、

呼出毒氣、當有一萬五千九百二十笛、吸呼生氣之數亦如之。若居處密室、不啟戶牖、或多人聚居一室、則呼出炭氣、彌滿屋內而養氣漸微、人亦喘憊將死矣。

醫理雜述

病證紛繁、通各國計之、內外諸證不下二千種、審察療治、醫者之職、大要分別體質功用二端、蓋人有皮肉筋骨合成軀殼、其中實以臟腑、貫以血脈各管、所謂體質也、一物有一物之用、無虛設、無假借、所謂功用也、試以鐘表譬之、其體質則有函篋輪軸機擺、其功用則或主旋轉、或節遲速、令人一望而知時刻、良工修理鐘表、必先審察函篋毀壞否、輪軸機擺折斷否、若俱未也、則更考究旋轉何以不靈、遲速何以不準、或損其有餘、或補其不足、或拭其垢滯、務使復其常度、醫者亦然、有體質之病、有功用之病、有體質功用兼病、必先細心認明、方能施治、西國有醫院、聽人學習、剖驗

死人。醫師指授，助以圖書，先講明部位功用，次論病證，次究藥性，分別內科外科、婦科兒科，考試其能否，品第其高下。所以西國醫術，精過中土。嘗見歐羅巴洲，如古之羅馬埃及希臘等國，二千年以前醫書，不及近代精詳。然所論大概確鑿有據。惟中土醫書，悉皆游移影響，欲將西國醫法流傳中土，大是難事。蓋華人偏信本國古書，西國醫理，非所習聞，每多不信。此一難也。泰西所用藥品，各國皆同，中土未能通行，此二難也。西國醫書，未經翻譯唐文，中土人不能徧讀，此三難也。中土醫學，官吏不加考察，人皆墨守古法，不知集思廣益，此四難也。

萬類壽夭不同，昆蟲禽獸，有朝生暮死者，有經月或經年死者，獸類莫壽於象，有逾百年者，然亦甚少。惟人壽最長，合古今較量，則壽夭迥異，此理殊不可解。上古人壽有逾數百年者，中古百年爲度，近世人壽愈短，大概四五十死者最多，逾七十已難得，間有八十九十一百者，更少。幼壯死者，