


圖書集成醫部全錄

第三十三冊  
淋濁遺精  
血



欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第二百八十八卷目錄

醫部彙考二百六十八

淋濁遺精門一

黃帝素問 六元正紀大論 生氣通天論

靈樞經 本神篇

張機金匱要略 淋 失精

華佗中藏經 論淋 溺小便不利

王叔和脈訣 遺精 淋病 脈

孫思邈千金方 淋 閉

劉完素六書 淋 小便渾濁 虛勞爲白淫

李杲十書 小便淋閉論

朱震亨心法 淋 赤白濁 夢遺

戴思恭證治要訣 淋 白濁 遺精

樓英醫學綱目 遺精

王綸明醫雜著 夢遺 精滑

李梴醫學入門 五淋 赤白濁 夢遺

李中梓醫宗必讀 諸淋證治 脈候 遺精 濁

王肯堂證治準繩 淋 赤白濁 遺精

趙獻可醫貫 夢遺 精滑論

張介賓景岳全書 淋濁論證 論治 遺精論證 論治

陳士鐸石室秘錄 石淋 夢遺



黃帝素問 五臟生成篇 平人氣象論 五藏刺逆從論 大奇論 五藏六腑大論 氣交變大論 六元正紀大論 至要大論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 玉版篇 熱病篇 五禁篇 百病始生篇

孫思邈千金方 吐血 鼻衄

朱肱活人書 傷寒吐血 傷寒鼻衄

嚴用和濟生方 吐血

劉完素六書 上溢 鼻衄 便血

李杲十書 吐血

朱震亨心法 吐血 嘔血 痰咯血 衄血 溺血 下血 腸風藏毒

張機金匱要略 吐血 衄血 尿血 下血

傷寒論 吐血 衄血 便血

華佗中藏經 吐血 衄血 便血 衄血 證脈 便血 證脈

王叔和脈訣 危脈

平治會萃 下血 血屬陰難成易虧論

戴思恭證治要訣 總辨 吐血 咯血 嗽血 鼻衄 舌衄 血 小便血 瀉血 牙宣 汗

樓英醫學綱目 總論 衄血 鼻衄 溺血 下血 腸風辨

博物彙編藝術典第二百九十二卷目錄

醫部彙考二百七十二

血門二 李梴醫學入門 總論 嘔血 痰血 鼻衄 牙宣 舌衄 肌衄 九竅出血 腦血 溺血

王綸明醫雜著 血病論

李中梓醫宗必讀 吐血 咳嗽咯血

王肯堂證治準繩 總論

趙獻可醫貫 論血證

博物彙編藝術典第二百九十三卷目錄

醫部彙考二百七十三

血門三

喻昌醫門法律 虛勞血證

張介賓景岳全書 總論 吐血證治 衄血證治 齒衄證治 舌衄證治 瀉血

陳士鐸石室秘錄 法 治血必須理氣 妄溢 吐血治法 齲齒出血治法 舌衄治法 瀉血便血治

博物彙編藝術典第二百九十四卷目錄

醫部彙考二百七十四

血門四

方一 堅中湯 又方 勞嗽吐血方 又方 欬血方 又方 咯血方 又方 當歸湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 花煎 治血散 必勝散 又方 人參飲子 又方 團參雲咬子 又方 金雞散 又方 蘇丸 又方 龍腦湯 又方 清熱滋陰湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 九當 天一丸 膠九 瀉心湯 大阿膠九 四生丸 生地黃丸 干金雞散 又方 蘇丸 又方 龍腦湯 又方 清熱滋陰湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 茸當 歸地 雲驅紅散 甲乙餅 四物湯 生地黃丸 干金雞散 又方 蘇丸 又方 龍腦湯 又方 清熱滋陰湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 芪芍 藥湯 雲驅紅散 甲乙餅 四物湯 生地黃丸 干金雞散 又方 蘇丸 又方 龍腦湯 又方 清熱滋陰湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 散 麥門冬汁 雲驅紅散 甲乙餅 四物湯 生地黃丸 干金雞散 又方 蘇丸 又方 龍腦湯 又方 清熱滋陰湯 又方 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 解血方 古天 膠九 磨雲散 義肺丸 參湯 紅花湯 杏仁散 阿膠散 苦蕪犀角湯 黃連藥皮湯 又方 竹茹湯 又方 散 失血方 文蛤散 綠袍散 桃黃丸 刺刺散 陳槐散 如神散 鹿茸散 又方 蘆薈丸 下血方 歌 參柏 糊黃 文蛤散 綠袍散 桃黃丸 刺刺散 陳槐散 如神散 鹿茸散 又方 蘆薈丸 下血方 歌 散 川芎 三黃散 止鉅散 黃散 滿黃丸 牡蠣散 如神散 鹿茸散 又方 蘆薈丸 下血方 歌

博物彙編藝術典第二百九十五卷目錄

醫部彙考二百七十五

血門五

血門五



黃帝素問

六元正紀大論

陽明司天之政初之氣小便黃赤甚則淋

陰凝於外則陽鬱於內故民病便赤及淋等證

生氣通天論

陰者藏精而起亟者也陽者衛外而爲固者也風客淫氣精乃亡邪傷肝也

風爲陽邪客於膚表則淫傷於氣矣陽氣傷則陰寒精自出矣風木之邪內通肝氣肝主藏血肝氣

受邪則傷其血矣

靈樞經

本神篇

恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣

恐傷腎故恐懼不解則傷腎臟之精腎主骨故精傷則骨痠痿厥精時自下者臟氣傷而不能藏也神氣生於精故五臟之精不可傷傷則失守而陰虛陰虛則神氣絕而死矣

漢張機金匱要略

淋

五臟篇曰熱在上焦者因欬爲肺痿熱在中焦者則爲堅熱在下焦者則尿血亦令淋祕不通

淋病篇曰淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中

淋家不可發汗發汗則必便血

失精

血痺篇曰勞之爲病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘡陰寒精自出酸削不能行

男子脈浮弱而濇爲無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半產漏下男人則亡血失精

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

華佗中藏經

論淋瀝小便不利

諸淋者五臟不通六腑不和三焦痞澀榮衛耗失胃熱飲酒過醉入房竭散精神勞傷血氣或因色興而敗精不出或因迷寵而真髓多輸或驚惶不定或憂思不甯或饑飽過時或奔馳不定或隱忍大小便或寒入膀胱或發泄久興或暑中胞囊傷茲不謹慎致起斯疾狀候變異名亦不同則有冷熱氣勞膏砂虛實之八種耳冷者小便數而色白如泔熱者小便澀而赤色如血氣者臍腹滿悶小便不利而痛勞者小便淋瀝不絕如水滴漏而不斷絕膏者小便中出物如脂膏砂者臍腹隱痛小便難其痛不可忍須臾如小便中下如砂石之類有大如皂角子或赤或白色澤不定此因腎氣弱食於女色閉而不泄泄而不止虛傷真氣邪熱漸深結聚成砂又如水煮鹽火大水少鹽漸成石之類蓋腎者水也鹹歸於腎鹹積於腎水畱於下虛熱日甚煎結而生又非一時之作也蓋遠火乃淫成五歲敗卽三年壯人五載禍必來宜乎急攻八淋之中惟此最爲危矣其脈盛大而實者可治虛小而濇者不可治虛者腎與膀胱俱虛精滑夢泄小便不禁者也實者謂經絡閉塞水道不利莖痛腿酸者也又諸淋之病與脈相從者活反者死治療之法亦在詳酌耳

腎脈歌曰實滑小便澀淋痛瀉驛  
脈瀉精頻漏恍惚夢魂多

孔脈歌曰指下尋之中且虛邪風透入小腸居病時淋瀝兼疼痛大作湯圓必自除  
尺部見芤虛在腎小便遺瀝血凝膿  
唐孫思邈千金方

### 淋閉

熱結中焦則爲堅下焦則爲溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下焦客熱所爲亦有自然下焦熱者但自少可善候之凡氣淋之爲病溺難澀常有餘瀝石淋之爲病莖中痛溺不得卒出膏淋之爲病尿似膏自出勞淋之爲病勞倦卽痛引氣衝下熱淋之爲病熱卽發甚則尿血治之皆與氣淋同  
金劉完素六書

### 淋

淋是小便澀痛乃熱客膀胱鬱結不能滲泄故也或曰小便澀而不通者爲熱遺尿不禁者爲冷豈知熱甚客於腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痹而神無所用故液滲入膀胱而澀溺遺失不能收禁經曰目得血而能視耳得血而能聽手得血而能攝掌得血而能握足得血而能步臟得血而能液腑得血而能氣夫血隨氣運氣血宣行則其中神自清利而應機能爲用矣又曰血氣者人之神不可不謹養也故諸所運用時習之則氣血通利而能爲用閉塞之則氣血行微而其道不通利故劣弱也若病熱極甚則鬱結而氣血不能宣通神無所用而不遂其機隨其鬱結之微甚焉是故目鬱則不能視色耳鬱則不能聽聲鼻鬱則不能聞香臭舌鬱則不能知味至如筋痿骨痹諸所出不能爲用皆熱甚鬱結之所致也故仲景論少陰病熱極曰澀便遺失狂言目反直視者腎先絕也

靈樞經曰腎主二陰然水虛衰而怫熱客其部分二陰鬱結則痿痹而神無所用故澀便遺失而不能禁止是熱證明矣是故世傳方論雖曰冷淋復用榆皮黃芩瞿麥茯苓通草雞蘇柳杏仁梔子之類寒藥治

之而已其說雖妄其方乃是由不明氣運變化之機宜乎認是爲非也或謂患淋而服茴香益智滑石醇酒溫藥而愈者然則非冷歟殊不知此皆利小便之要藥蓋醇酒益智之性雖熱而茴香之性溫滑石之性寒故能開發鬱結使氣液宣通熱散而愈也

### 小便渾濁

小便渾濁天氣熱則水渾濁寒則清潔水體清而火體濁故也又如清水爲湯則自然濁也

### 虛勞爲白淫

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚筋縱發爲筋痿及爲白淫太過者白物爲淫隨洩而下故爲勞弱祕眞丸主之

元李杲十書

### 小便淋閉論

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之謂皆邪熱爲病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辯之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大燥小便不通也熱閉於下焦者腎與膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其上流易老云寒在胃中遏絕不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生太苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎

淋

淋有五皆屬乎熱解熱利小便山梔子之類山梔子去皮一合白湯送下

淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也

諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間則令人悶絕矣大凡小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澀小腸有熱則小便痛痛者爲血淋不痛者爲尿血敗精結者爲沙精結散者爲膏金石結者爲石小便澀常有餘瀝者爲氣揣本揆原各從其類也執劑之法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱其於調平心火又三者之綱領焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可用補氣之藥氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水竇不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澀其狀先寒戰而後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣盛則寒戰而成淋正氣盛則寒戰解而得便溺也又有胞系轉戾之不通者是不可不辯胞轉證臍下急痛小便不通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入房使水氣上逆氣迫於胞故屈戾而不得舒張也胞落則殂

癰者罷也不通爲癰不約爲遺小便滴瀝澀痛者謂之淋小便急滿不通者謂之閉宜五苓散燈心湯調服若臍下脹滿更加琥珀末一錢甚效

有淋病下諸通利藥不能通者用木香流氣飲或別用通氣香劑纔愈者此氣淋出於冷熱淋之外也血淋一證須看血色分冷熱色鮮者心小腸實熱色瘀者腎膀胱虛冷若的是冷淋及下元虛冷血色瘀者並宜漢椒根剉碎不以多少白水煎候冷服

若熱極成淋服藥不效者宜減桂五苓散加木通滑石燈心瞿麥各少許蜜水調下

諸淋皆屬於熱余每用黃蘗滋腎丸每百丸用四物湯加甘草梢杜牛膝木通桃仁滑石木香煎湯空心

吞服兼灸三陰交如鼓應桴累試累效者

赤白濁

濁主濕熱有痰有虛赤屬血白屬氣痢帶同治  
寒則堅凝熱則流通

大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳加蒼朮白朮燥去其濕赤者乃是濕傷血也加白芍藥仍用  
珍珠粉九加臭椿根白皮滑石青黛作丸藥

虛勞用補陰藥大槩不宜熱一作藥

肥白人必多痰以二陳湯去其濕熱

胃弱兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣丸藥用黃蘗炒褐色乾薑炒微黑滑石蛤粉青黛糊丸服

胃中濁氣下流爲赤白濁用二陳加柴胡升麻蒼朮白朮丸藥用梲皮末蛤粉炒乾薑炒黃蘗胃中濁氣  
下流滲入膀胱青黛蛤粉肝脉弦者用青黛以瀉肝又方用炒黃蘗一兩生藥一兩滑石三兩神麴半兩  
爲末滴水丸

燥濕痰南星半夏蛤粉青黛爲末神麴糊丸青黛爲衣

有熱者青黛滑石黃蘗之類水丸

人之五臟六腑俱各有精然腎爲藏精之腑而聽命於心貴乎水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不  
節嗜慾過度水火不交精元失守由是而爲赤白濁之患赤濁是心虛有熱因思慮得之白濁腎虛有寒  
過於淫慾而得之其狀漩白如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊治法赤者當清心調氣白者溫補下元  
又當清上使水火既濟陰陽協和精氣自固矣

二陳湯治濁能使大便潤而小便長

濁氣只是濕痰又有白濁人服元兔丹不愈服附子八味丸卽愈者不可不知亦有小便如常停久纔方  
旋濁者

夢遺一專主乎熱與帶下。脬精同治法用青黛海石黃藥四份。氣血虛不能固。常服此丸。每服一丸。白開水送下。  
樗樹根丸

思想成病其病在心安神丸帶補藥

熱則流通宜用知母黃藥蛤粉青黛爲丸服蓋精滑專主濕熱黃藥知母降火牡蠣粉蛤粉尿濕故也然得病之因有四有用心過度心不攝腎以致失精者有因思色慾不遂精乃失位輸精而出者有慾太過滑泄不禁者有年高氣盛久無色欲精氣滿泄者然其狀不一或小便後出多不可禁者或不小便而自出或莖中出而癢痛常如欲小便者並宜先服辰砂妙香散或威喜丸或分清飲別以綿裹龍骨同煎又或分清飲半貼加五倍子牡蠣粉白茯苓五味子各半錢煎服

夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁炒茯神各半錢  
明戴思恭證治要訣

淋

五淋者血石氣膏勞是也血淋溺中有血石淋溺中有砂石之狀其溺於盆也有聲此卽是精氣結成砂石與溺俱出氣淋氣鬱所致小腹有若膀胱氣之狀膏淋溺與精混或沉在漩下如糊狀或浮在漩上如脂膏狀勞淋病在多色下元虛憊清濁不分腎氣不行鬱結而爲淋或勞心過度火不得其養小腸爲心之腑臟病而腑與俱病或心腎不交腎氣不溫津道閉塞或出汗太過或失血太多津道欲枯竭皆成勞淋五者得名而不及熱與冷何哉蓋五者皆有冷有熱血有熱血有瘀血氣有熱氣有冷氣有虛冷有虛熱若與湯藥過差精不由其道妄行不禁與溺俱出此乃熱劑之傷未可槩以爲冷也

治法除的然虛冷之外其餘諸證若用本題藥不效便宜施以調氣之劑蓋津道之逆順皆一氣之通塞爲之如木香流氣飲却爲的當其中自有木通麥冬腹皮輩此如不效但宜投以益血之方蓋小便者血之餘也血既充滿則滋腴下潤自然流通如火府丹却爲的當其中有地黃輩然此非特言血淋氣淋一應淋皆可用獨不可用之虛冷耳淋病小便之色多是見赤未可便以赤爲熱氣道蘊結故如此爾有淋病下諸通便劑愈不通用木香流氣飲或別用通氣香劑纔愈者此乃氣淋出於冷熱淋之外

有似淋非淋小便色如米泔或有如鼻涕之狀此乃精尿俱出精塞竅道故便欲出不能而痛宜大菟絲子丸鹿茸丸之類然此即膏淋謂其非淋亦不可

血淋一證須看血色分冷熱色鮮者心小腸實熱色瘀者腎膀胱虛冷若的是冷淋及下元虛冷血色瘀者並宜漢椒根剉碎不拘多少白水煎候冷服

小便澀痛常急欲溺及去點滴莖中痛不可忍者此五淋病生料五苓散加阿膠七分或五苓散加車前子末少許或五苓散和益元散等分或五苓散並可吞火府丹佐以導赤散

若熱極成淋服藥不效者宜減桂五苓散加木通滑石燈心瞿麥各少許仍令其研麥門冬草連根車前草白龍草蜜水調下

若淋瀝有血者宜加味五苓散或生料五苓散和五淋飲或導赤散仍研地錦草水解服進冷劑愈甚者此是冷淋宜地髓湯下附子八味丸有因服五苓散等藥不效者用生料鹿茸丸却愈此證病於下元虛冷之故

有小便艱澀如淋不痛而癢者此亦屬虛宜八味丸生料鹿茸丸之類若因思慮用心過度致淋辰砂妙香散吞威喜丸或妙香散和五苓散

白濁

有白濁人服元兔丹不愈服附子八味丸即愈者不可不知

有小便如常停久纔方浞濁有小便出即如泔若小兒疳病者並宜分清飲加白茯苓半錢

如服藥未效宜四七湯吞青州白丸子及辰砂妙香散吞元兔丹及小菟絲子丸山藥丸如白濁甚下浞如泥或稠粘如膠頻逆而澀痛異常此非是熱淋此是精濁窒塞竅道而結宜五苓妙香散吞八味丸小菟絲子丸精者血之所化有濁去太多精化不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也何以知之有人天癸未至強力好色所泄半精半血

若溺不赤無他熱證縱雖赤濁不可以赤爲熱只宜以治白濁施之

遺精

遺精得之有四有用心過度心不攝腎以致失精者有因思色欲不遂精已失位輸瀉而出者有欲太過滑泄不禁者有年壯氣盛久無色欲精氣滿泄者然其狀不一或小便後去多不可禁者或小便而自出或莖中出而癢痛常如欲小便者並宜先用辰砂妙香散吞玉華白丹佐以威喜丸或分清飲別以綿裹龍骨同煎或分清飲半貼加五倍牡蠣粉白茯苓五味子各半錢

失精夢泄亦有經絡熱而得者若以虛冷用熱劑則精愈失本事方清心丸用黃皮腦子者最良然亦必恍惚脇熱乃驗其熱證也以此見赤濁亦有自熱而得亦可用此若是用心過度得之宜遠志丸用交感湯加蓮子肉五味子吞下仍佐以靈砂丹若審是思色欲不遂得之且以四七湯吞白丸子甚者耳聞目見其精即出名曰白淫妙香散吞玉華白丹若審是色欲過度下元虛憊泄滑無禁宜正元飲加牡蠣粉肉苁蓉各半錢吞養氣丹或靈砂丹仍佐以鹿茸丸山藥丸大菟絲子丸固陽丸之類審是壯盛滿溢者本事方清心丸仍服黃芪六一湯便雖非對緣精髓滿溢姑以此燥之

遺瀝比之遺精稍少小便有數點稠粘莖頭微痛或小便已停止時方有一二滴沾襯其病不出前所因宜審用前藥

夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉棗仁茯神各半錢吞玉華白丹並固陽丸夢遺亦備前四證宜審其所感用前藥

治小便注悍甘澹用腦子二錢半雁爪黃連一錢半蘆甘石一錢葱頭七箇陳荷葉一片花椒一撮先以葱頭荷葉花椒煎湯二碗待溫時畱瓶內浸洗小便乾淨將前蘆甘石用火煨紅於煎黃連水內浸濕又燒又浸燒煇爲度安於冷地上以梳鬚之候冷研末入腦子和勻將前湯洗淨用藥不過二三度即愈樓英醫學綱目

遺精

白淫夢遺先賢治法有五其一古法用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮游是也

其二思想結成痰飲迷於心竅而遺者許學士用猪苓丸之類導引其痰是也  
其三思想傷陰者潔古珍珠粉丸用蛤粉黃蘗降火補陰是也

其四思想傷陽者謙甫鹿茸從蓉菟絲子等補陽是也

其五陰陽俱虛者丹溪治一形瘦人便濁夢遺作心虛治用珍珠粉丸定志丸服之定志丸者遠志菖蒲  
茯苓人參是也

治夢遺有數種下元虛憊精不禁者宜服茴香丸年壯氣盛久節淫欲經絡壅滯者宜服清心丸有情欲  
淫動經謂所願不得名曰白淫宜良方茯苓散正如瓶中煎湯氣盛盈溢者如瓶中沸湯而溢欲動心邪  
者如瓶傾側而出憊虛不禁者如瓶中有罅而漏不可一槩用藥也經曰腎氣閉即精泄素問曰腎者作  
強之官伎巧出焉又曰腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或育或散皆主於腎今腎氣衰則一身  
之精氣無所管攝故妄行而出不時也猪苓丸一方正爲此設

王綸明醫雜著

### 夢遺精滑

夢遺精滑世人多作腎虛治而用補腎澀精之藥不效殊不知此證多屬脾胃飲酒厚味痰火濕熱之人  
多有之蓋腎藏精精之所生由脾胃飲食化生而輸歸於腎今脾胃傷於濃厚濕熱內鬱中氣濁而不清  
則其所化生之精亦得濁氣腎主閉藏陰靜則甯今所輸之精既有濁氣則邪火動於腎中而水不得甯  
靜故遺而滑也此證與白濁同丹溪論白濁爲胃中濁氣下流滲入膀胱而云無人知此也其有色心太  
重妄想過用而致遺滑者自從心腎治但兼脾胃者多須要審察

註按遺精有四有用心過度心不攝腎而致者有因色慾不遂精氣失位輸精而出者有色慾太過滑  
泄不禁者有年壯氣盛久無色慾精氣滿溢者有小便出多不禁者或不出小便而自出者或莖中出  
而癢痛常如欲小便者宜辰砂妙香散或威喜丸

氣淋必澀滯餘瀝不盡沉香散或益元散加茴香木香檳榔

血淋必澀痛遇熱則發白薇赤芍等分爲末酒調服二錢或犀角地黃湯單車前飲四物湯加知藥選用  
色鮮者心與小腸虛熱也導赤散去甘草加黃芩色如豆汁者腎與膀胱火也五淋散又有一種小便見  
血而不痛者爲溺血非淋也四物湯加山梔滑石牛膝或單苦黃菜飲單髮灰散單琥珀散

石淋則溺有砂石莖強痛甚單牛膝膏單龜甲爲末酒調服

膏淋者血淋如膏用黑豆一百二十粒甘草一寸水煎臨熟入滑石末一錢空心調服或海金沙散

勞淋者痛引氣衝遇勞則發痛墜及尻透膈散勞傷四物湯加知藥滑石琥珀虛甚者鹿角霜丸

熱淋者暴淋痛甚八正散或五苓散合敗毒散加味石膏湯急痛者六一散二錢加木香檳榔小茴各一  
錢爲末服

冷淋必先寒慄而後溲便澀數竅中腫痛生附散二朮散

淋皆屬熱間有冷者外因當風取涼冒暑濕熱鬱滯胞內痠痹神不應內因七情心腎氣鬱小腸膀胱  
不利或忿怒房勞忍溺酒肉濕熱下流膀胱干於肝經挺孔鬱結初則熱淋血淋久則火爍爲砂石淋如  
湯確煎久則生礫

熱在上焦氣分渴而小便不利者肺中伏熱水不能降宜氣薄淡滲之藥清金瀉火以滋水之上源清肺  
飲子熱在下焦血分不渴而小便不利者腎與膀胱無陰而陽氣不化水枯火升宜氣味俱陰之藥除熱  
瀉閉以滋水之下源滋腎丸腎氣丸其消渴以渴爲主而分氣血故血分亦有渴者此以淋爲主而分氣  
血故血分有不渴者但渴而多汗亡津又未可以輕滲也

治暑淋熱淋血淋山梔仁一味足矣若發汗則死

治膏淋石淋鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣蒲黃牛膝破血黃蘗生地滋陰東垣用藥凡例小腹痛用青  
皮疎肝黃蘗滋腎蓋小腹小便乃肝腎部位

小腹脹滿甚者瀉腎湯火府丹凡小腸有氣則脹有血則澀有熱則痛又土燥火瀉宜四君子湯加滑石