

醫學正傳卷之八目錄

小兒科

論

又變蒸論

小兒脈法總論

三關脈法形狀

湯氏察形色總斷

面上諸候形證歌七首

內八段錦四首

外八段錦十首

急慢驚風門一

論

脈法

丹溪方法凡二條

東垣治驚風論

東垣黃芪湯

東垣益黃散

錢氏安神丸

錢氏白朮散

又治驚風方

又急慢驚風方

又急慢驚風方

又治慢驚風方

鎮驚丸

奪命丹

利驚丸

瀉青丸

抱龍丸

千金龍膽湯

宣風散

五福化毒丹

金箔丸

釣藤飲

溫白丸

涼驚丸

發搐門二



男發搐

女發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風發搐

傷食發搐

百日内發搐

補腎地黄丸

瀉青丸

導赤散

涼驚丸

益黃散

大青膏

牛黃膏

甘露飲

白餅子

塗顙法

浴體法

五癇門三

論五癇形證

五色丸

諸疳門四

論

地黃丸

安神丸

益黃散

又名補脾散

木香丸

胡黃連丸

蘭香散

白粉散

如聖丸

香蟾丸

蘆薈丸

治疳積腹大方

又治小兒疳方

祖傳經驗秘方



吐瀉門五

論

脉法

方法

錢氏方法

木瓜丸

兒生三日內吐瀉

兒生三日至十日吐瀉

五月二十五日已後吐瀉

玉露散

六月十五日已後吐瀉

七月七日已後吐瀉

八月十五日已後吐瀉

吐瀉泄黃傷熱乳病

溫中丸

虛弱脾胃不和

吐瀉調脾平胃散

治吐瀉黃疸方

夏月吐瀉用益元散極效說

附證

腹脹論

腹脹搗氣丸

小兒腹虛脹方

又治腹脹方

腹痛傷食法

又腹痛方法

白餅子

白朮散

消積丸

心腹痛方法

安虫散

集効丸

治虫痛方

治蛭虫痛方

小兒吃粽腹痛方

又治小兒腹痛

小兒夜啼方

治夜啼花火膏

治小兒驚啼方

小兒風痰壅盛

小兒痰熱骨蒸方

又治前證方

小兒解顱方法

小兒吃泥方法

小兒脫囊方

小兒脫肛方

又治脫肛方

又治前證方

小兒赤瘤方法

白玉散

臍中汁出方

小兒癩頭方

又治癩頭方

丹溪醫按一條

小兒尾間骨痛

小兒弄舌

瀉黃散

小兒龜胸

瀉白散

龜背

重舌木舌

又治前證方

又治木舌方

小兒口瘡方

鵝口瘡方

又治鵝口瘡方

又治小兒口瘡方

又口瘡方

小兒頰上生瘡

小兒走馬牙疳

又治牙疳方

小兒臍風撮口方

痘疹門六

論

丹溪方法總論

丹溪方法凡三十二條

痘瘡初發五藏形證一

痘瘡五藏形色二



斑痘所發之源三

辨內外因四

王氏惺惺散

升麻葛根湯

木香參蘇飲

四君子湯

和中散

紫霜丸

辨形氣病五

補肺散

解毒防風湯

當歸丸

十奇散

辨三陰三陽經候六

荊芥甘草防風湯

連翹防風湯

升麻葛根湯

升麻湯

理中湯

木香散

異功散

辨三陽證治七

連翹升麻湯

犀角地黃湯

解毒丸

宣風散

百祥丸

龐氏地黃膏

黃柏膏

玉露散

甘露飲子



猪心龍腦膏

辨三陰證治法八

調中丸

辨形氣不足九

芎歸湯

辨表裏虛實十

消毒飲

葛根升麻加芍藥湯

活血散

勻氣散

二物湯

百花膏

平治諸方十一

三豈湯

油飲子

鳳龍膏

錢氏惺惺散

解毒防風湯

四物解肌湯

瘡出不快十二

活血散加防風湯

龐氏紅花湯

紫草湯

四聖散

樺皮飲子

五積散

正氣散

調解散

辰砂五苓散



小柴胡湯

人參白虎湯

人參竹葉湯

肉苳蔻丸

絲瓜湯

阮氏萬全散

湯氏安斑湯

透肌散

如聖湯

辨外證逆順十三

辨外證輕重十四

辨初末形證十五

辨不藥而愈十六

辨五不治證十七

辨疹有陰陽二証十八

傷寒時氣發斑附十九

玄參升麻湯

荆防敗毒散

化斑湯

龐氏石膏湯

陽毒升麻湯

辨瘡後餘毒二十

消毒飲

十六味流氣飲

必勝膏

蜆子水

五福化毒丹

如聖湯



雄黃解毒丸

黃連阿膠丸

駐車丸

決明散

密蒙花散

撥雲散

蛤粉散

祖傳經驗秘方

又痘後不大便方

古人拯治痘瘡要法方論二十一

陷伏倒靨黑陷證

不換金正氣散

辟穢丹

再甦散

猪尾膏

白龍散

敗草散

馮氏天花散

單胎散

猶聖散

安胎散



醫學正傳卷之八

花溪恆德老人虞搏天民編集

小兒科

論

嘗聞小方脈科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以嬰之流難問證難察脈耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻寒峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也內無七情六慾之交戰外無大風大寒之相侵奚其幼科之疾若是之繁且甚與抑考其證大半胎毒而少半傷食也其外感風寒之證十一而已曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰驚悸曰風癇曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顱曰重舌木舌已上諸證豈非孕母不謹胎毒之所致與夫小兒之在胎也母飢亦飢母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎燂或恣味辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令子受惠其為母者胎前既不能謹節產後又不能調護是以惟務姑息不能防微杜漸或未滿百晷而遂與醎酸之味或未穀週歲而輒與肥甘之物百病由是而生焉曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水腫曰瘡曰痢曰痰喘豈非吃食過傷調養失宜之所致與先正所謂古者婦人妊子寢不側座不邊立不蹕不食邪味等語厥有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之

法必深得造化生生不息之意故古人多壽考兒少夭折者即此之由也嘗見今有稟性溫良之婦有娠不嗜慾縱口生子少病而痘疹亦稀亦可以為師法矣為兒醫者臨證之際宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知為心熱鼻紅知為脾熱左腮青知為肝有餘右腮白知為肺不足顏白知為腎虛之類更參之以虎口三關之脈其小兒之病情斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼仁人之心斯言其可忽諸

又論變蒸

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之候每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不食此為長血脈全智意之常候不須治而自愈按諸家所論皆謂乃小兒長骨脈臟腑與神志也自生之日始每三十二日一變凡人有三百六十五骨除手足四十五碎骨外止有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日乃為一變骨氣始全一變生一臟或一腑十變則臟腑始足每變發為虛熱諸證亦有胎氣壯實暗變而無發熱證者此骨節臟腑由變而全胎毒亦因變而散也為兒醫者可不審乎

脈法總論

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脈診如一歲至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脈以為驗病輕重死生之訣第一節名風關無脈則無病有脈則病輕第二

節名氣關脈見則病重尚可以藥治而已第三節名命關脈見則病劇乃九死一生之惡候也多不可治七歲八歲曰鬣九歲十歲曰髻始可以一指探掌後尺寸三部之脈而以一息七八至為無病之常脈十一歲至十四歲曰童稚而以一息五六至為常脈也數則為熱遲則為寒浮則為虛為風沈則為實為積為痛浮而數者為乳癰驚悸虛而軟者為慢驚癆瘵緊而實者為風癰牢而革者為便秘沈而弦者為食積為腹痛緊而弦者為氣急為風寒洪數者為熱伏結為傷食軟細者為虫疳若氣促脈代散亂無倫次者死在須臾而不治也業幼科者其可不盡心于此乎

今將手指三關之脈繪圖分註開列于後



一風關易治

二氣關病重

三命關死候

三關青是四足驚

三關赤是水驚

三關黑是人驚

如有此三關通度脈候是極重之證必死餘並可治

山風關青如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關青如魚刺主疳勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

風關青黑色如懸針主水驚易治

氣關赤色如懸針主瘡病兼肺臟積熱尤可為治

命關凡有此脈不問五色皆是死候

又三關通度如懸針者主慢驚風難治

川風關如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣關如水字主膈上有涎并虛積停滯

命關如水字主驚風瘡極夾驚候不拘五色三關通度者不治

乙風關如乙字主肺臟驚風易治

氣關如乙字主驚風病重

命關如乙字青黑色主慢驚風難治

乙風關如曲虫主瘡病積聚胸前如橫推筭子肚皮如吹胖瘡將

氣關如曲虫主大腸有穢積

命關如曲虫主心痛傳肝難治

乙風關如環主肝臟有瘡積聚



氣關如環主疳入胃吐逆不治

命關如環惡候不治

繇此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

此紋若在手上或面上或左右腹脇上或在左右臉邊皆死候

脈曲向裏者是氣疳

脈曲向外者是風疳

脈斜向右者是傷寒身熱不食無汗

脈斜向左者是風傷身熱不食有汗

雙鉤脈者是傷寒

三曲如長虫者是傷硬物

兩曲如鉤者是傷冷物

脈一頭如環有獨脚者是傷冷

面上有此點子必是再發之候

凡頭面上或肚腹上有大脈併青筋如此者並是食毒物及驚積難治

脈如亂虫是常疳亦有虫疳蛇疳食積之疳皆可治



凡脈微細不足者並是風氣俱宜消疳然後取虫積肥孩兒是良法也

附湯氏察小兒神色總斷

凡看小兒病宜先觀形證神色然後察脈假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形證次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

面上諸候形證歌

凡七首

痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤毒熱眼朦朧

又一首

山根若見脈橫青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停

又

青脈生于左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱黑青知是乳多傷

又

右邊青脈不須多有則頻驚怎奈何紅赤為風抽眼目黑青三日見閻羅

又

指甲青兼黑暗多唇青惡逆病將瘥忽作鴉聲心氣急此時端的命難過



又

蛇虫出口有三般口鼻中來大不堪如或白虫兼黑色靈丹縱服病難安

又

四肢瘡痛不為祥下氣沖心兼滑腸氣喘汗流身不熱手拿胸膈定遭殃

內八段錦 凡四首

紅淨為安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青尤甚取下風痰病立輕
赤色輕微是外驚若如米粒勢難輕紅散多因乘怒亂更加搐搦實難平

小兒初誕月腹痛兩眉顰此號盤腸氣啼哭又呻吟 如反目仰視者天吊風也

小兒初誕月肌體瘦疳羸髮禿毛稀少元因鬼王胎

外八段錦 凡十首

先望孩兒眼色青次看背上冷如水陽男搐左無妨事搐右令人甚可驚女搐右邊猶
可治若逢搐左疾非輕歪斜口眼終為害縱有仙丹也莫平

眼中赤脈實難量大數元來一不祥最怕亂紋鋪目下更嫌赤脈貫瞳光
顙門腫起定為風此候應知最是凶忽陷成坑如盞足未過七日命須終
鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋俱惡候更嫌腹有直身紋

忽見眉間紫帶青看來立便見風生青紅碎雜風將起必見疳癥膈氣形
亂紋交錯紫嫌青急急求醫免命傾盛紫再加身體熱須知臟腑惡風生
紫少紅多六畜驚紫紅相等即疳成紫點有形如米粒傷寒夾食證堪評
紫散風傳脾臟間紫青口渴是風癰紫隱深沈難治療風痰祛散命須還
黑輕可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風邪證青黑脾風作慢驚
紅赤連兮赤紋輕必然乳母不相應兩手忽然無脈見定知衝惡犯神靈

急慢驚風一

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲以前曰純陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金
受制而無以平木故肝木常有餘而脾土常不足也為父母者而有失于保養其或衣服
寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣
夫惟急驚屬肝木風邪有餘之證治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候
治宜中和甘溫補中之劑若夫急驚之候因聞不常之聲或遇驢馬禽獸之號以致面青
口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃
赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱



龍丸宣風散五福化毒丹等藥慢驚之證多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足痠癱筋脈拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏鉤藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安神丸之類錢氏謂急驚為無陰之證因心經實熱而陰不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之證因脾土虛甚而陽不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之證其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗醫多不諳此理混為一途而治誤人多矣業幼科者宜推幼幼及人之心為心庶免斯世無夭折之亦子矣幸甚

脈訣

並見前總章

方法

丹溪方法凡二條

丹溪曰錢氏方乃小兒科之祖其立例極妙若能增損而用之無不驗也

又曰驚風有二慢驚屬脾虛所主多死宜溫補一云當養脾用參朮煎湯下安神丸急驚屬痰熱宜涼瀉一云用養血藥作湯下降火清痰九子抱龍丸之類世以一藥通治二證甚謬

東垣治驚論曰外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風