

瘍醫大全目錄

卷六

論辨純陽瘡瘍法

論辨純陰瘡瘍法

論辨半陰半陽瘡瘍法

論陽瘡毒似陰瘡

論陰瘡毒似陽瘡

論陰陽法

論瘡瘍分五方治法不同



論肥人瘡瘍

論瘦人瘡瘍

論嬰孩瘡瘍

論痘後瘡瘍

論妊娠瘡瘍

論產後瘡瘍

論師尼孀婦處女瘡瘍治法不同

論瘡瘍二因受病主治法不同

論醫者膽大心小



論分經絡部位氣血多寡

論諸經向導藥隨經引使

癰疽危陷部位

脾胃虛實傳變論

論瘡瘍虛實

論瘡瘍五善七惡救援法

論瘡瘍發熱惡寒煩躁頭痛

論瘡瘍痛癢麻木

論瘡瘍作渴



論瘡瘍欲嘔作嘔呃逆

論瘡瘍喘急

論瘡瘍大便瀉利

論瘡瘍大便秘結

導大便秘結法

論瘡瘍小便淋漓頻數不利

論瘡瘍無寐肉瞤筋惕

論瘡瘍出血

論瘡瘍類破傷風



論瘡瘍散走流注

論瘡瘍攣急牽陰入腹

論瘡瘍目斜視上

論瘡瘍發瘰

論瘡瘍四肢逆冷

論瘡瘍胸痞

論瘡瘍陽氣脫陷

論瘡瘍僵肉

論瘡瘍瘡口黑暈瘡內無血色



論瘡瘍瘡毒入內鬲

論瘡瘍面赤不得攻下

論瘡瘍治法當分緩急

論瘡瘍補瀉不可倒施

論瘡瘍輕症用重劑

論瘡瘍寒熱逆從用藥法

論瘡瘍用汗下藥

論瘡瘍附子不可輕用

論瘡瘍當舌時從症



寧夏中藥大學圖書館版權所有

論瘡瘍用香散藥

論瘡瘍泥用止痛藥

論瘡瘍輕投十宣散等劑

論瘡瘍未潰不宜槩用敗毒之藥

論煎藥必得其法

論雜忌須知

論醫者宜避瘡毒侵襲

論藏揩膿水穢紙法



瘍醫大全卷六

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

涇錢之栢東陽
男 楓燮用和 全校

論辨純陽瘡瘍法

純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒頂如尖字高凸

起腫似彎弓根有盤七日之間多焮痛二七之期

膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消

膿潰精神爽腐脫新生氣血完五善自然臻並至

七惡全無半點干痛隨膿減腫退肌寬此屬純陽



俱易治百人百可保全安

正宗

初起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸高腫者順
已成焮痛皮薄光亮飲食如常二便調和身溫者
順已潰膿稠色鮮不臭腐肉自脫焮腫易消身輕
者順潰後膿厚稠黃新肉易生瘡口易斂飲食漸
進者順

論辨純陰瘡瘍法

純陰初起不知瘡粟米之形疙瘩僵不紅不腫不知
痛少熱少炊少隄防七朝之後身體倦瘡根平大
喜燒湯頂不高今根不活色不光今腐不穰軟陷
無膿空結聚脉浮數大細飛颺飲食不食身戰戰
嗜湯止許意茫茫瘡上生衣如脫甲孔中結子似
含芳膿多臭穢身難便舉動愴惶韻不長瘡形成
紫黑面色變青黃精神昏憤多鼾睡言語無人自
發揚口乾多舌強痰喘定身亡此屬純陰俱不治

百人百可到泉鄉 正宗

初起頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者陰
已成腫堅色紫不作膿不腐潰惟口乾多煩躁者
逆已潰皮爛內堅不腐腫仍不消痛仍不減心煩
者逆潰後膿水清稀腐肉雖脫新肉不生色敗臭
穢者死

論辨半陰半陽瘡瘍法

陰陽之症兩相交生死相兼事可昭微熱微寒微汗
腫半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖冷
便不調腫而不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒大便
多溏小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡
未全迺口渴喜茶腸腹痛面浮厭飲足心高心煩
不穩睡神亂怕音焦投方應病方爲妙陰轉爲陽
漸可調逢之任是神仙手半死餘生定莫迺

正宗

澄

曰癰疽之候純陽固多純陰原少惟半陽半陰之

證最多全在醫者留心不可忽畧蓋陰陽兼半之
證若以辛溫之劑內服外敷則陰氣潛消轉爲陽
證若以清涼外敷或用冷蜜蛋清調藥塗敷內投
苦寒敗毒之劑則陽氣冰伏變爲純陰之證吉凶
反掌醫家病家均宜警省

論陽瘡毒似陰瘡

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火但亦有初起色紫赤而腫痛脉沉細數而惡寒喜煖非真寒也乃火極似水陽極生陰亢則害承乃制之理或平時富貴享用厚味服金石等藥致之故陽極似陰始熱終寒之變宜順其時而內服疎托瀉心等劑治之則愈矣

澄

曰假寒者火極似水也凡瘡瘍初起熱甚失於汗解以致陽邪亢極鬱伏於內則邪自陽經傳入陰

分故爲身熱發厥神氣昏沉或是畏寒狀若陰證
凡真寒本畏寒而假寒亦畏寒此熱深厥亦深熱
極反兼寒化也大抵此證必聲壯氣粗形強有力
或唇焦舌黑口渴飲冷小便赤濇大便秘結或因
多飲藥水以致下利純清水而其中仍有燥糞及
失氣極臭者察其六脉必皆沉滑有力此陽證也
若雜證也假寒者亦或爲畏寒或爲戰慄此以熱
極於內而寒侵於外則寒熱之氣兩不相投因而
寒慄此皆寒在皮膚熱在骨髓所謂惡寒非寒則

是熱證但察其內證則或爲喜冷或爲便結或
水之熱濇或口臭而躁煩察其脉必滑實有力凡
見此證卽當以涼膈芩連之屬助其陰而清其火
使內熱旣除則外寒自伏所謂水流濕者亦此義
也故凡身寒厥冷其脉滑數按之鼓擊於指下者
此陽極似陰卽非寒也



南京中医药大学图书馆版权所有