

古方熱陣
古方固陣
古方用陣

景岳全書
卷五十六



古方八陣

古方熱陣
古方固陣
古方因陣

氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參

白朮炒

乾薑炒

炙甘草

白四味搗篩為末蜜丸雞黃大以沸湯數合和之左研碎溫

治太陰即病自利



南京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書卷之五十八甫集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

江寧 朱見一 金甫氏訂

熱陣

仲理中丸一 卽名人參理中湯○治太陰卽病自利不渴

寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘡疾瘴
氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參

白朮炒

乾薑炒

炙甘草各兩

右四味搗篩爲末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫



中醫藥大學圖書館版權所有

服之曰三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依數切用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服○原論加減法詳在霍亂門述古條中賓按右方兩數方漢時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯二

治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房

腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

卽前方加制附子一二三錢隨宜用之其有寒甚勢急者

不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯

有芍藥茯苓各無甘草乾薑

附子理中丸三

治陰寒腎氣動者

卽前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯四 治中脘停寒喜辛物入口即吐即噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢

若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯五

治脾肺俱虛欬嗽不已

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味等分

石阻每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局胡椒理中湯六

治肺胃虛寒氣不宜通欬喘逆氣虛痞噎

悶腹脇滿痛氣短不能飲食嘔吐痰水不止



白朮 五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

草撥

陳皮

細辛

款冬花

去梗名四兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服或煉蜜

九桐子大每服三五十九白湯溫酒米飲任下無時每日服

選八味理中丸

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶

或嘔吐泄瀉

人參

乾薑

炒各一兩

白朮

四兩炒

白茯苓

麥芽

炒二兩

甘草

炙

神麴

炒

砂仁

炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一丸薑湯嚥下

枳實理中丸

治傷寒寒實結胸



人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑 各二兩 枳實 十六片

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一九熱湯化下連進二服

理中化痰丸

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不

實飲食難化坎唾痰涎此中氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑 炮

茯苓 各二兩

炙甘草 一兩 半夏 制三兩

薑湯者麤糊丸桐子大每服四五十九白湯送下

治中湯

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉○此即

理中湯加青皮陳皮也

人參

白朮炒

乾薑炮

炙甘草

青皮

陳皮等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香溫中湯十一

治同前

即前治中湯加丁香去半夏

良溫胃湯十二

治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損六腸與胃

氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊滿

附子制

厚朴

當歸

白芍藥

人參

甘草炙

陳皮各一錢乾薑炮一錢

川椒又去合口炒出汗三分

水一鍾半薑二片煎一鍾食遠服

東溫胃湯十二

治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛



白豆蔻

人參

澤瀉各二分 益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃各四分

黃芪

陳皮

各七分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

^{仲景}四逆湯十四

又名通脉四逆湯○治傷寒陰症自利裏寒

外執脉沉身痛而厥

甘草炙二兩

乾薑

炮三兩

附子一

枚破入片生用

右咬咀以水三升煮取一升二合分二次溫服其脉即出者

愈○面色赤者加葱九莖○腹中痛者去葱加芍藥二兩○

嘔者加生薑二兩○咽痛者加桔梗一兩○
利止脉不出者
加人參一兩



南京中医药大学图书馆版权所有

仲景四逆加人參湯 十五

治傷寒惡寒脈微而復利

即於前方內加人參一兩

四逆加猪膽汁湯 十六

治傷寒吐下後利出而厥四肢厥者

即於四逆湯內加人猪膽汁半合

仲景茯苓四逆湯 十七

治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

茯苓 六兩

人參 一兩

甘草 炙二兩

乾薑 一兩半

附子 一枚生用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去渣溫服七合日三服

葉黃四逆湯 十八

治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸湯 泡附子 規

乾薑 各二錢 炙甘草 錢半



水一鍾半煎七分熱服

韓茵陳四逆湯十九

治發黃脉沉細遲肢體逆冷

腰已上

茵陳二兩

炙甘草一兩

乾薑

炮兩半

附子

一作八片

右分四貼水煎服

仲景當歸四逆湯二十

治傷寒手足厥寒脉細欲絕者或下利

脉大腸鳴者虛也及其入內有久虛者

宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

當歸

桂枝

芍藥

細辛

各三兩

甘草

通草

各二兩

大棗

二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆散二

力在散陣二八



治陽邪亢熱血脈不通四肢厥逆

仲景附子湯 二二

治少陰病得之二三日口中和其背惡寒者

當灸之附子湯主之并治少陰病身體病手足寒

身節痛其沉者大

附子

二枚去皮入片人參 二兩

白朮 四兩

芍藥

茯苓 各三兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

三因附子湯 二二

治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁

肌肉重著四肢痠痛

附子生

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參

乾薑

各三兩白朮 一兩

右以咀每服四錢水煎服



生附湯二四 治寒濕腰痛

附子生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾薑

炙甘草各一錢

蒼朮

杜仲甚妙各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯二五

力在補陣三八

治元陽不足喘急呢逆嘔惡厥冷等證

仲朮附湯二六

方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯二七

方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

金匱要略卷五十八

古今醫方

六



南京中医药大学图书馆版权所有

生術附湯二八

方在補陣四三

治寒濕腰冷重痛小便自利

金桂枝附子湯二九

治傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不

能轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者

桂枝四兩去支

生薑三兩切

附子三枚炮去皮各切八片

甘草三兩炙

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

金白朮附子湯三十

治傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不

能轉側不嘔不渴脈虛浮而澁若大便堅

小便自利者去桂枝此方生之

白朮二兩

附子一枚酒去皮

甘草炙一兩

生薑一兩半切

大棗六枚



中國醫藥大學圖書館版權所有

右五味以水三升煮取一升去滓分温三服一服覺身痺半
日許再服三服都盡其人如胃狀勿怪卽是木附並去皮中
逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯三一

治風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快惡風不欲去衣
或身微腫者此主之

甘草炙

白朮

各二兩

附子

二枚炮

桂枝

四兩

去皮

右四味以水六升煮取三升去渣温服一升日三服初服得

微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服

六七合爲妙

良薑附湯三二

治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

金匱要略卷五

五方熱痺

二



用此藥救之

此即仲景乾薑附子湯

乾薑一兩

附子一個生用

右每服半兩水煎

外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯三三

治嶺南瘴厲內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤

兼上辛中風

附子一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微溫服

乾薑附子湯三因

治瘡毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻尖冷

身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐汗出惡嵐

大附子一

枚製分四服

右每服加炮乾薑二錢同煎溫服熱甚者冷服

寶鑑
羌活附子湯三
治呃逆

羌活

附子

乾薑炮

茴香各一錢

木香五分

水鍾半棗二枚煎服

三因方木香作丁香

仲景
芍藥甘草附子湯三六

治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥

甘草炙各三兩

附子

一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去渣分溫服

活人
附子八味湯三七

治氣虛中寒脚氣等症

附子炮去皮

人參

乾薑炮

芍藥

茯苓

甘草炙

桂心各二兩白朮四兩